




વિદ્યુતરાસાયણિક કોષ (ગેલ્વેનિક કોષ) : રાસાયણિક ઊર્જાનું વિદ્યુતઊર્જામાં રૂપાંતર કરતા ઉપકરણ અથવા સાધનને વિદ્યુતરાસાયણિક કોષ (ગેલ્વેનિક કોષ) કહે છે.

વિદ્યુતરાસાયણિક કોષ (ગેલ્વેનિક કોષ)નો સિદ્ધાંત : રાસાયણિક ઊર્જાનું વિદ્યુતઊર્જામાં રૂપાંતર.

વિદ્યુતરાસાયણિક કોષમાં રેડોક્ષ પ્રક્રિયા થાય છે. જેમકે, કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાં ઝિંક ધાતુની પટ્ટીને ડૂબાડવાથી નીચે પ્રમાણેની રેડોક્ષ પ્રક્રિયા થાય છે :



આ બંને અર્ધ-પ્રક્રિયાઓ એક જ પાત્રમાં થાય છે. પરંતુ આ બંને અર્ધ-પ્રક્રિયાઓ બે અલગ-અલગ પાત્રમાં થાય તેવી રચના નીચે પ્રમાણે કરી શકાય છે :



દ્રાવણમાં ડૂબાડેલી ધાતુઓની પટ્ટીઓને વિદ્યુતધ્રુવ કહે છે.

જે પટ્ટી પર ઓક્સિડેશન-પ્રક્રિયા થતી હોય તેને એનોડ અને જે પટ્ટી પર રિડક્શન-પ્રક્રિયા થતી હોય તેને કેથોડ કહે છે.

બંને વિદ્યુતધ્રુવોને કોપરના તાર વડે જોડતાં ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ એનોડ (Zn)થી કેથોડ (Cu) તરફ (ઋણ ધ્રુવથી ધન ધ્રુવ તરફ) બાહ્ય પરિપથમાં વહે છે.

દ્રાવણમાં વિદ્યુતનું વહન આયનો દ્વારા થાય છે અને બાહ્ય પરિપથમાં વિદ્યુતનું વહન ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા થાય છે.

બાહ્ય પરિપથમાં વિદ્યુતપ્રવાહનું વહન કેથોડ (Cu) તરફથી એનોડ (Zn) તરફ (ધન ધ્રુવથી ઋણ ધ્રુવ તરફ) થાય છે.

ક્ષાર-સેતુ (Salt-bridge) : વિદ્યુતરાસાયણિક કોષનાં બે દ્રાવણોને જોડતી અને યોગ્ય વિદ્યુતવિભાજ્ય ક્ષાર (NH₄NO₃)નું જલીય દ્રાવણ ધરાવતી U-આકારની કાચની નળીને ક્ષાર-સેતુ કહે છે.

ક્ષાર-સેતુનું કાર્ય : ક્ષાર-સેતુ વિદ્યુતરાસાયણિક કોષનાં બે દ્રાવણોને જોડવાનું અને તેની વિદ્યુતીય તટસ્થતા જાળવી રાખવાનું કાર્ય કરે છે. આ ઉપરાંત તે કોષનો વિદ્યુત-પરિપથ પણ પૂર્ણ કરે છે.

વિદ્યુતપ્રવાહના મુખ્ય ત્રણ પ્રકાર આ પ્રમાણે છે :

(1) ધાતુના સક્રિય વિદ્યુતપ્રવાહ : દા.ત., Zn, Cu, Ag, Al વગેરે.

(2) ધાતુ કે અધાતુના નિષ્ક્રિય વિદ્યુતપ્રવાહ : દા.ત., Pt (ધાતુ), સ્ટીલ (મિશ્ર ધાતુ), ગ્રેફાઈટ (અધાતુ) વગેરે.

(3) વાયુ વિદ્યુતપ્રવાહ : દા.ત., H₂, Cl₂ વગેરે.

અર્ધ-કોષ : વિદ્યુતપ્રવાહ અને જે દ્રાવણમાં તેને ડૂબાડ્યો હોય, તે દ્રાવણ સંયુક્તપણે અર્ધ-કોષ તરીકે ઓળખાય છે.

પ્રમાણિત અર્ધ-કોષ : જો અર્ધ-કોષના દ્રાવણની સાંદ્રતા 1.0 M હોય અથવા વાયુનું દબાણ 1 વાતાવરણ હોય અને તાપમાન 25° સે (298 K) હોય, તો તે પ્રકારના અર્ધ-કોષને **પ્રમાણિત અર્ધ-કોષ** કહે છે.

પ્રમાણિત કોષ : બે પ્રમાણિત અર્ધ-કોષને જોડવાથી પ્રમાણિત કોષ બને છે.

કોષના સાંકેતિક નિરૂપણમાં એક પ્રણાલિકા પ્રમાણે એનોડ ડાબી બાજુ અને કેથોડ જમણી બાજુ દર્શાવાય છે.

દા.ત., Zn | Zn²⁺_(C₁) || Cu²⁺_(C₂) | Cu અને પ્રમાણિત કોષનું સાંકેતિક નિરૂપણ Zn | Zn²⁺_(1.0 M) || Cu²⁺_(1.0 M) | Cu
(T = 25° સે) Pt | H₂(1 વાતાવરણ) | H⁺_(C₁) || Cu²⁺_(C₂) | Cu અને પ્રમાણિત કોષનું સાંકેતિક નિરૂપણ
Pt | H₂(1 વાતાવરણ) | H⁺_(1.0 M) || Cu²⁺_(1.0 M) | Cu (T = 25° સે)

કોષ-પોટેન્શિયલ : વિદ્યુતરાસાયણિક કોષમાંના બે વિદ્યુતપ્રવાહોને જોડતાં ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ રાસાયણિક પ્રક્રિયાથી ઉપજેલા વિદ્યુતદબાણ હેઠળ એનોડથી કેથોડ તરફ બાહ્ય પરિપથમાં વહે છે. આ વિદ્યુતદબાણને કોષ-પોટેન્શિયલ E⁰_{cell} કહે છે.

જો કોષ પ્રમાણિત હોય, તો તેને **પ્રમાણિત કોષ-પોટેન્શિયલ E⁰_{cell}** કહે છે.

વોલ્ટમિટર સાધન દ્વારા માપવામાં આવતો કોષ-પોટેન્શિયલ વાસ્તવમાં કોષનો ચોક્કસ પોટેન્શિયલ હોતો નથી.

કોષનો સાચો પોટેન્શિયલ માપવા પોટેન્શિયોમિટરનો ઉપયોગ થાય છે.

કોષ-પોટેન્શિયલ ખરેખર તો બે વિદ્યુતપ્રવાહોની ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાની અથવા (સ્વીકારવાની) વૃત્તિની તીવ્રતાના તફાવતનું માપ છે.

કોઈ એક વિદ્યુતપ્રવાહની ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાની વૃત્તિની તીવ્રતાનું નિરપેક્ષ મૂલ્ય માપી શકાતું નથી. કારણ કે એક અર્ધ-કોષ વિદ્યુતપ્રવાહ ઉત્પન્ન કરી શકતો નથી અને એક અર્ધ-કોષથી રેડોક્ષ પ્રક્રિયા પણ પૂર્ણ થતી નથી.

ઈ.એમ.એફ. (E.M.F.) શ્રેણી : જ્યારે કોઈ વિદ્યુતકોષનો પોટેન્શિયલ પ્રમાણિત હાઈડ્રોજન વિદ્યુતપ્રવાહના સંદર્ભમાં માપવામાં આવે, ત્યારે બીજા વિદ્યુતપ્રવાહના પોટેન્શિયલને ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ (E.M.F.) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

વિવિધ પ્રમાણિત અર્ધ-કોષના રિડક્શન-પોટેન્શિયલનાં મૂલ્યોને ઊતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાથી રચાતી વિદ્યુતપ્રવાહોની શ્રેણીને ઈ.એમ.એફ. (E.M.F.) શ્રેણી કહે છે.

ઈ.એમ.એફ. (E.M.F.) શ્રેણી પરથી નીચેની માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે :

- (1) આ શ્રેણીમાં ઓક્સિડેશન-પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ, ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાની વૃત્તિ અને રિડક્શનકર્તા તરીકેની પ્રબળતા ઉપરથી નીચેની દિશા તરફ વધે છે.
- (2) આ શ્રેણીમાં રિડક્શન-પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ, ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકાર કરવાની વૃત્તિ અને ઓક્સિડેશનકર્તા તરીકેની પ્રબળતા ઉપરથી નીચેની દિશા તરફ ઘટે છે.
- (3) આ શ્રેણીને આધારે કોઈ પણ બે અર્ધ-કોષને જોડવાથી બનતા સંપૂર્ણ કોષનો પ્રમાણિત પોટેન્શિયલ ગણી શકાય છે.
- (4) આ શ્રેણીના આધારે કયો વિદ્યુતપ્રવાહ એનોડ બનશે અને કયો વિદ્યુતપ્રવાહ કેથોડ બનશે તેની માહિતી પણ મેળવી શકાય છે.

વિદ્યુતરાસાયણિક કોષનો પોટેન્શિયલ વિદ્યુતપ્રવાહોની પ્રકૃતિ, કોષનું તાપમાન અને કોષની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલાં દ્રાવણોની સાંદ્રતા પર આધાર રાખે છે.

- તાંબાની પટ્ટીને સિલ્વર નાઈટ્રેટના જલીય દ્રાવણમાં ડુબાડતાં.....
 (A) દ્રાવણ રંગવિહીન બને છે. (B) વાદળી રંગની તીવ્રતા વધે છે.
 (C) વાદળી રંગની તીવ્રતા ઘટે છે. (D) રાસાયણિક પ્રક્રિયા થતી નથી.
- કોપરસલ્ફેટ (CuSO_4)ના જલીય દ્રાવણમાં ઝિંક (Zn) ધાતુનો સળિયો ડુબાડવાથી કયું અવલોકન મળે છે ?
 (Cu કરતાં Znનું પરમાણ્વિયદળ વધારે છે.)
 (A) દ્રાવણના વાદળી રંગની તીવ્રતામાં ઘટાડો થાય છે. (B) ઝિંક ધાતુના સળિયાનું વજન વધે છે.
 (C) દ્રાવણના વાદળી રંગની તીવ્રતામાં વધારો થાય છે. (D) આપેલ એક પણ નહિ.
- ઝિંક (Zn) ધાતુના સળિયો કોપરસલ્ફેટ (CuSO_4)ના જલીય દ્રાવણમાં ડુબાડવાથી કયું અવલોકન ના મળે ?
 (Cu કરતાં Znનું પરમાણ્વિયદળ વધારે છે.)
 (A) ઝિંક ધાતુના સળિયાની સપાટીનો રંગ બદલાય છે. (B) ઝિંક ધાતુના સળિયાનું વજન ઘટે છે.
 (C) ઝિંક ધાતુના સળિયાનું વજન વધે છે. (D) દ્રાવણના વાદળી રંગની તીવ્રતામાં ઘટાડો થાય છે.
- કોપરસલ્ફેટ (CuSO_4)ના જલીય દ્રાવણમાં ઝિંક (Zn) ધાતુનો સળિયો ડુબાડવાથી કયું અવલોકન મળે છે ?
 (Cu કરતાં Znનું પરમાણ્વિયદળ વધારે છે.)
 (A) દ્રાવણના વાદળી રંગની તીવ્રતામાં ઘટાડો થાય છે. (B) ઝિંક ધાતુના સળિયાનું વજન વધે છે.
 (C) દ્રાવણમાં SO_4^{2-} આયનની સાંદ્રતામાં વધારો થાય છે. (D) દ્રાવણમાં SO_4^{2-} આયનની સાંદ્રતામાં ઘટાડો થાય છે.
- સિલ્વર નાઈટ્રેટ (AgNO_3)ના દ્રાવણમાં કોપર (Cu) ધાતુનો સળિયો ડુબાડવાથી કયું અવલોકન મળે છે ?
 (Cu કરતાં Agનું પરમાણ્વિયદળ વધારે છે.)
 (A) Cu ધાતુના સળિયાના વજનમાં ફેરફાર થતો નથી. (B) Cu ધાતુના સળિયાનું વજન ઘટે છે.
 (C) દ્રાવણ ધીમે ધીમે વાદળી રંગનું બને છે. (D) Cu ધાતુના સળિયાની સપાટીનો રંગ બદલાતો નથી.
- સિલ્વર નાઈટ્રેટ (AgNO_3)ના દ્રાવણમાં કોપર (Cu) ધાતુનો સળિયો ડુબાડવાથી કયું અવલોકન નથી મળતું ?
 (Cu કરતાં Agનું પરમાણ્વિયદળ વધારે છે.)
 (A) Cu ધાતુના સળિયાના વજનમાં વધારો થાય છે. (B) Cu ધાતુના સળિયાનું વજન ઘટે છે.
 (C) દ્રાવણ ધીમે ધીમે વાદળી રંગનું બને છે. (D) Cu ધાતુના સળિયાની સપાટી પર Ag ધાતુ જમા થાય છે.
- Znની પટ્ટીને $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ જલીય દ્રાવણમાં ડુબાડતાં.....
 (A) Znનું રિડક્શન થશે. (B) Znનું ઓક્સિડેશન થશે. (C) Cuનું રિડક્શન થશે. (D) Cuનું ઓક્સિડેશન થશે.
- 0.1M CuSO_4 ના 1.5 લિટર જલીય દ્રાવણમાં Zn ધાતુનો સળિયો ડુબાડેલો છે, તો તેના સંદર્ભમાં સૈદ્ધાંતિક ગણતરીને આધારે આપેલાં વિધાનો માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો.
 (પરમાણ્વિય ભાર : Zn = 65 ગ્રામ·મોલ⁻¹ અને Cu = 63.5 ગ્રામ·મોલ⁻¹) T = સાચું વિધાન અને F = ખોટું વિધાન
 (i) સળિયાના દળમાં 0.3 ગ્રામનો ઘટાડો થાય ત્યારે 13 ગ્રામ Zn ધાતુ દ્રાવણમાં ઓગળે છે.
 (ii) 1.95 ગ્રામ Zn ધાતુ દ્રાવણમાં ઓગળે ત્યારે Cu^{2+} ની સાંદ્રતા 0.08 M થાય.
 (iii) Cu^{2+} અને Zn^{2+} ની મોલારિટી દ્રાવણમાં સમાન થાય ત્યારે દ્રાવણમાં Zn^{2+} આયનોની સંખ્યા 4.5165×10^{24} થાય છે.
 (iv) 3.6132×10^{22} Cuના પરમાણુઓ જમા થાય ત્યારે દ્રાવણમાં Zn^{2+} ની મોલારિટી 0.04M થાય.
 (A) TTTF (B) FFFT (C) TTFT (D) FFTT

9. $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ ના જલીય દ્રાવણમાં Zn ધાતુની પટ્ટી મૂકતાં નીચેનામાંથી કયાં અવલોકન સાચાં છે ?

(i) દ્રાવણનો વાદળી રંગ ધીમે ધીમે આછો બને છે.

(ii) દ્રાવણમાં નાઈટ્રેટ આયન (NO_3^-)ની સાંદ્રતા ધીમે ધીમે ઘટે છે.

(iii) દ્રાવણમાં ઝિંક આયન ($\text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})}$)ની સાંદ્રતા વધે છે.

(iv) દ્રાવણમાં ક્યુપ્રિક આયન ($\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})}$)નું વિસ્થાપન ઝિંક આયન ($\text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})}$) દ્વારા થાય છે.

(A) (i), (ii) (B) (ii), (iii) (C) (i), (iii), (iv) (D) (i), (iv)

10. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે થતી તત્ત્વયોગમિતિય પ્રક્રિયા માટે કયો વિકલ્પ ખોટો છે ?


(પરમાણ્વિય ભાર : Al = 27 ગ્રામ·મોલ⁻¹ અને Ag = 108 ગ્રામ મોલ⁻¹)

(A) દ્રાવણમાં રહેલા બધા જ સિલ્વર આયનોનું સંપૂર્ણ રિડક્શન કરવા માટે 90 ગ્રામ Alની જરૂર પડે છે.

(B) 54 ગ્રામ Al વડે 648 ગ્રામ સિલ્વર આયનો રિડક્શન પામે છે.

(C) જો 81 ગ્રામ Alનું ઓક્સિડેશન થાય, તો દ્રાવણમાં પ્રક્રિયાને અંતે 972 ગ્રામ સિલ્વર આયનો પ્રક્રિયા પામ્યા વગરના રહેશે.

(D) 2 મોલ Alનું ઓક્સિડેશન થાય તે દરમિયાન 3.6132×10^{24} Ag^+ નું રિડક્શન થશે.



11. 0.1 Mના CuSO_4 ના 1.5 લિટર જલીય દ્રાવણમાં Zn ધાતુનો સળિયો ડૂબાડેલો છે, તો તેના સંદર્ભમાં આપેલાં વિધાનોમાંથી સાચાં વિધાનો પસંદ કરો. (પરમાણ્વિય ભાર : Zn = 65 ગ્રામ·મોલ⁻¹ અને Cu = 63.5 ગ્રામ·મોલ⁻¹)

(i) 13 ગ્રામ Zn ધાતુ દ્રાવણમાં ઓગળે ત્યારે 12.7 ગ્રામ Cu ધાતુ છૂટી પડે અને સળિયાના દળમાં 0.3 ગ્રામનો વધારો થાય.

(ii) Cu^{2+} ની સાંદ્રતા 0.02 M ઘટે, ત્યારે 1.3 ગ્રામ Zn ધાતુ દ્રાવણમાં ઓગળે.

(iii) Cu^{2+} અને Zn^{2+} ની મોલારિટી દ્રાવણમાં સમાન થાય, ત્યારે દ્રાવણમાં Zn^{2+} આયનોની સંખ્યા 3.011×10^{22} થાય છે.

(iv) 3.6132×10^{22} Cuના પરમાણુઓ જમા થાય, ત્યારે દ્રાવણમાં Zn^{2+} ની મોલારિટી 0.04 M થાય.

(A) (iv) (B) (ii) (C) (ii), (iv) (D) (i), (iv)

12. મિથાઈલ એસિટેટ ($\text{CH}_3\text{COOCH}_3$ અથવા $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2$)માં આપેલમાંથી કયો ઓક્સિડેશન આંક ધરાવતો કાર્બન નથી ?

(A) +3 (B) -2 (C) +4 (D) -3

13. આપેલમાંથી કયા સંયોજનમાં ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન આંક શૂન્ય છે ?

(A) HOCl (B) HOF (C) HOI (D) HOBr

14. Xe અને Fના સંયોજનમાં Xe (પરમાણ્વિય ભાર Xe = 133 u, F = 19 u) વજનથી 53.85 % છે, તો તે સંયોજનમાં Xeનો ઓક્સિડેશન આંક જણાવો.

(A) +2 (B) 0 (C) +4 (D) +6

15. $\text{Ag}_2\text{S} + \text{CN}^- + \text{O}_2 \rightarrow \text{Ag}(\text{CN})_2^- + \text{S}$ (બેઝિક માધ્યમ) રેડોક્ષ પ્રક્રિયામાં 1.93×10^6 કુલંબ વિદ્યુતભારનો જથ્થો સંકળાય ત્યારે સૈદ્ધાંતિક રીતે કેટલા મોલ Ag_2S પ્રક્રિયામાં વપરાયા હશે ?
(1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન = 96500 કુલંબ વિદ્યુતભાર)
(A) 10 (B) 2 (C) 8 (D) 4
16. ઈ.એમ.એફ. શ્રેણીના સંદર્ભના આપેલ વિધાનો માટે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો :
(A) ઉપરથી નીચે તરફ જતાં ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકાર કરવાની વૃત્તિ વધે છે.
(B) નીચેથી ઉપર તરફ જતાં ઓક્સિડેશનકર્તા તરીકેની પ્રબળતા ઘટે છે.
(C) ઉપરથી નીચે તરફ જતાં ઓક્સિડેશનકર્તા અનુભવવાની વૃત્તિ વધે છે.
(D) શ્રેણીમાં નીચે આવતી ધાતુના સળિયાને શ્રેણીમાં ઉપર આવતી ધાતુના ક્ષારના દ્રાવણમાં ડુબાડવામાં આવે, તો તે દ્રાવણમાં ઓગળતી નથી.
17. $\text{Fe} | \text{Fe}^{2+}_{(1.0 \text{ M})} || \text{Ag}^{+}_{(1.0 \text{ M})} | \text{Ag}$ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષના ક્ષારસેતુમાં કયા વિદ્યુતવિભાજ્યનો ઉપયોગ ના કરી શકાય ?
(A) KNO_3 (B) NaCl (C) NH_4NO_3 (D) NaNO_3
18. $\text{X}^{2+} | \text{X}, \text{Y}^{2+} | \text{Y}, \text{Z}^{2+} | \text{Z}, \text{W}^{2+} | \text{W}$ અર્ધકોષના પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલનાં મૂલ્યો ચઢતા ક્રમમાં હોય, તો આપેલ વિધાનો માટે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો. (સાચાં વિધાન માટે T અને ખોટાં વિધાન માટે F છે.)
(i) Y^{2+} ના દ્રાવણમાં ધાતુ Xનો સળિયો ઓગળે છે.
(ii) ધાતુ Zના પાત્રમાં X^{2+} નું દ્રાવણ ભરી શકાતું નથી.
(iii) $\text{W}_{(s)} + \text{Y}^{2+}_{(\text{aq } 1.0 \text{ M})} \rightleftharpoons \text{W}^{2+}_{(\text{aq } 1.0 \text{ M})} + \text{Y}_{(s)}$ પ્રક્રિયા પૂરોગામી દિશામાં આપમેળે થાય છે.
(iv) ધાતુ Zના પમાણુઓ Y^{2+} ના દ્રાવણમાંથી $\text{Y}^{2+}_{(\text{aq})}$ આયનનું વિસ્થાપન કરી શકતાં નથી.
(A) TFFT (B) FTTF (C) FTFT (D) TFTF
19. ધાતુ Yના ક્ષારનું જલીય દ્રાવણ ધાતુ Xના પાત્રમાં ભરી શકાય છે અને ધાતુ Zની ક્ષારનું જલીય દ્રાવણ ધાતુ Yના પાત્રમાં ભરી શકાય છે, તો X, Y અને Zનો રિડક્શનકર્તા તરીકેની પ્રબળતાનો ઊતરતો ક્રમ આપેલમાંથી કયો સાચો છે ?
(A) $X > Y > Z$ (B) $X > Z > Y$ (C) $Z > Y > X$ (D) $Z > X > Y$
20. 25° સે તાપમાને પ્રમાણિત સ્થિતિનો (i) ધાતુ Aનો સળિયો $\text{B}^{2+}_{(\text{aq})}$ માં ડુબાડવાથી ધાતુ A ઓગળતી નથી. (ii) ધાતુ Aના પાત્રમાં ધાતુ Cના ક્ષારનું જલીય દ્રાવણ ($\text{C}^{2+}_{(\text{aq})}$) ભરી શકાતું નથી. (iii) ધાતુ Cની ચરમચીને ($\text{D}^{2+}_{(\text{aq})}$)માં ડુબાડવાથી ધાતુ (iv) ચમચી પર જમા થાય છે. ધાતુઓનો રિડક્શનકર્તા તરીકેની પ્રબળતાનો સાચો ક્રમ જણાવો.
(A) $A > B > C > D$ (B) $D > B > C > A$ (C) $D > C > A > B$ (D) $B > A > C > D$
21. જો $\text{M} | \text{M}^{2+}, \text{N} | \text{N}^{2+}, \text{Q} | \text{Q}^{2+}$ અને $\text{R} | \text{R}^{2+}$ અર્ધ-કોષના પ્રમાણિત ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલનાં મૂલ્યો ચઢતા ક્રમમાં હોય, તો આપેલ કયું વિધાન સાચું છે ?
(A) ધાતુ Nના પાત્રમાં M^{2+} ના ક્ષારનું દ્રાવણ ભરી શકાય. (B) ધાતુ Qના પાત્રમાં R^{2+} ના ક્ષારનું દ્રાવણ ના ભરી શકાય.
(C) R^{2+} ના ક્ષારનું દ્રાવણ ધાતુ Nના પાત્રમાં ભરી શકાય. (D) આપેલ ત્રણેય વિધાન ખોટા છે.
22. વિદ્યુત રાસાયણિક કોષના કોષ પોટેન્શિયલનો આધાર શેના પર નથી ?
(A) કોષની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલ દ્રાવણની સાંદ્રતા (B) ક્ષારસેતુમાં રહેલ પદાર્થ
(C) તાપમાન (D) વિદ્યુતધ્રુવોની પ્રકૃતિ

23. $\text{Fe} | \text{Fe}^{2+}_{(C_1)} || \text{Cu}^{2+}_{(C_2)} | \text{Cu}$ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ કાર્યરત હોય ત્યારે
- (A) L.H.S. અને R.H.S. અર્ધ-કોષના ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ ધીમે ધીમે વધે છે.
 (B) L.H.S. અને R.H.S. અર્ધ-કોષના ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ ધીમે ધીમે ઘટે છે.
 (C) L.H.S. અર્ધ કોષનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ ધીમે ધીમે ઘટે છે અને R.H.S. અર્ધ-કોષનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ ધીમે ધીમે વધે છે.
 (D) L.H.S. અર્ધ-કોષનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ અને R.H.S. અર્ધ-કોષનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ ધીમે ધીમે ઘટે છે.
24. કોષ પોટેન્શિયલનું ચોક્કસ મૂલ્ય કયા સાધનથી માપી શકાય છે ?
 (A) એમિટર (B) વોલ્ટમિટર (C) ગેલ્વેનોમિટર (D) પોટેન્શિયોમિટર
25. એક પ્રમાણિત અર્ધકોષને પ્રમાણિત હાઈડ્રોજન અર્ધકોષ સાથે ક્ષારસેતુ દ્વારા જોડી પોટેન્શિયોમિટર દ્વારા તેનો પોટેન્શિયલ માપવામાં આવે છે. જો પ્રમાણિત હાઈડ્રોજન વિદ્યુતધ્રુવ કેથોડ તરીકે હોય, તો માપેલ પોટેન્શિયલ શેના બરાબર હોય છે ?
 (A) બીજા વિદ્યુતધ્રુવનો E^0_{red} (B) બીજા વિદ્યુતધ્રુવનો E^0_{ox}
 (C) બીજા વિદ્યુતધ્રુવનો E_{ox} (D) બીજા વિદ્યુતધ્રુવનો E_{red}
26. વિદ્યુતરાસાયણિક કોષના સંદર્ભમાં આપેલાં વિધાનો માટે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.
 જ્યાં, T = સાચું વિધાન અને F = ખોટું વિધાન
 (i) બાહ્ય પરિપથમાં વિદ્યુતપ્રવાહનું વહન એનોડથી કેથોડ તરફ થાય છે.
 (ii) દ્રાવણમાં વિદ્યુતનું વહન આયનો દ્વારા થાય છે.
 (iii) એનોડ વિદ્યુતધ્રુવ તરફના દ્રાવણમાંથી ઋણ આયનો ક્ષારસેતુ દ્વારા કેથોડ વિદ્યુતધ્રુવ તરફના દ્રાવણમાં જાય છે.
 (iv) ઇલેક્ટ્રોનનું વહન બાહ્ય પરિપથમાં કેથોડથી એનોડ તરફ થાય છે.
 (A) FFTF (B) FTFF (C) TFTF (D) FTTF

જવાબો : 1. (B), 2. (A), 3. (C), 4. (A), 5. (C), 6. (B), 7. (B), 8. (C), 9. (C), 10. (C),
 11. (A), 12. (C), 13. (B), 14. (D), 15. (A), 16. (C), 17. (B), 18. (A), 19. (C),
 20. (D), 21. (C), 22. (B), 23. (C), 24. (D), 25. (B), 26. (B)

નર્નસ્ટ સમીકરણ : નિયત તાપમાને બિનપ્રમાણિત વિદ્યુતરાસાયણિક કોષનો પોટેન્શિયલ અને કોષની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલાં દ્રાવણોની સાંદ્રતા વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતા સમીકરણને નર્નસ્ટ સમીકરણ કહે છે.

આ સમીકરણની તારવણી ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતોના આધારે થઈ શકે છે.

$\Delta G = \Delta G^0 + RT \ln Q$ પણ $\Delta G = -nFE_{\text{cell}}$ અને $\Delta G^0 = -nFE^0_{\text{cell}}$ આ કિંમતો સમીકરણમાં મૂકતા,


$$-nFE_{\text{cell}} = -nFE^0_{\text{cell}} + RT \ln Q \quad \text{આથી } E_{\text{cell}} = E^0_{\text{cell}} - \frac{RT}{nF} \ln Q \quad \text{તેથી } E_{\text{cell}} = E^0_{\text{cell}} - \frac{2.303RT}{nF} \log Q$$

$$298 \text{ K તાપમાને } \frac{2.303RT}{F} \text{ નું મૂલ્ય } \frac{2.303 \times 8.314 \times 298}{96500} = 0.059 \text{ વોલ્ટ થશે.}$$

∴ 298 K તાપમાને નર્નસ્ટ સમીકરણ $E_{\text{cell}} = E^0_{\text{cell}} - \frac{0.059}{n} \log Q$ થશે. જ્યાં n = કોષમાં થતી પ્રક્રિયામાં થતો

ઓક્સિડેશન આંકનો ફેરફાર, $Q = \frac{\text{નીપજોની સાંદ્રતાનો ગુણાકાર}}{\text{પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાનો ગુણાકાર}}$

દા.ત., $\text{Zn} | \text{Zn}^{2+}_{(C_1)} || \text{Ag}^+_{(C_2)} | \text{Ag}$ આ કોષમાં થતી પ્રક્રિયા આપ્યા મુજબ છે.



આ કોષ માટે નર્નસ્ટ સમીકરણ નીચે પ્રમાણે લખી શકાય :

$$E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^0 - \frac{2.303RT}{nF} \cdot \log \frac{[\text{Zn}^{2+}]}{[\text{Ag}^+]^2} \text{ તેથી } 298\text{K તાપમાને } E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^0 - \frac{0.0592}{n} \cdot \log \frac{[\text{Zn}^{2+}]}{[\text{Ag}^+]^2}$$

જ્યાં n = કોષની પ્રક્રિયાના સંતુલિત સમીકરણમાં પ્રક્રિયાના ઓક્સિડેશન-આંકમાં થતો ફેરફાર છે અથવા પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલ

ઇલેક્ટ્રોનની મોલ સંખ્યા. અહીં $n = 2$ છે. તેથી 298 K તાપમાને $E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^0 - \frac{0.0592}{2} \cdot \log \frac{[\text{Zn}^{2+}]}{[\text{Ag}^+]^2}$

બિનપ્રમાણિત અર્ધ-કોષનો પોટેન્શિયલ પણ નર્નસ્ટ સમીકરણનો ઉપયોગ કરી ગણી શકાય છે.

દા. ત., $\text{Ni} \mid \text{Ni}^{2+}$ અર્ધ-કોષનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ અને રિડક્શન પોટેન્શિયલ નીચે પ્રમાણે ગણી શકાય :

$\text{Ni} \mid \text{Ni}^{2+}$ અર્ધ-કોષનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ શોધવા તેમાં થતી ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા નીચે પ્રમાણે લખી તેના માટે નર્નસ્ટ સમીકરણ લખીને તેનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ ગણી શકાય છે.




$$\text{Ni}_{(s)} \rightleftharpoons \text{Ni}_{(aq)}^{2+} + 2e^{-} \quad n = 2 \quad \text{તેથી } E_{\text{Ni} \mid \text{Ni}^{2+}} = E_{\text{Ni} \mid \text{Ni}^{2+}}^0 - \frac{0.0592}{2} \cdot \log [\text{Ni}^{2+}]$$

$\text{Ni} \mid \text{Ni}^{2+}$ અર્ધ-કોષનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ શોધવા તેમાં થતી રિડક્શન પ્રક્રિયા નીચે પ્રમાણે લખી તેના માટે નર્નસ્ટ સમીકરણ લખીને તેનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ ગણી શકાય છે.

$$\text{Ni}_{(aq)}^{2+} + 2e^{-} \rightleftharpoons \text{Ni}_{(s)} \quad n = 2 \quad \text{તેથી } E_{\text{Ni}^{2+} \mid \text{Ni}} = E_{\text{Ni}^{2+} \mid \text{Ni}}^0 - \frac{0.0592}{2} \cdot \log \frac{1}{[\text{Ni}^{2+}]}$$

સાંદ્રતાકોષ : વિદ્યુતરાસાયણિક કોષના બંને વિદ્યુતધ્રુવો એક જ સરખા હોય, પરંતુ વિદ્યુતવિભાજ્યનાં દ્રાવણોની સાંદ્રતા જુદી જુદી હોય તેવા કોષને સાંદ્રતાકોષ કહે છે.

દા. ત. $\text{Ag} \mid \text{Ag}^+_{(c_1)} \parallel \text{Ag}^+_{(c_2)} \mid \text{Ag}$ ($c_1 < c_2$) સાંદ્રતાકોષમાં નીચે દર્શાવ્યા પ્રમાણેની રેડોક્ષ પ્રક્રિયા થવાના કારણે આયનોની સાંદ્રતા બદલાય છે અને સાંદ્ર દ્રાવણના આયનો મંદ દ્રાવણ તરફ જતાં હોવાથી આ પ્રકારના કોષને સાંદ્રતાકોષ કહે છે.



સાંદ્રતાકોષનો કોષ-પોટેન્શિયલ નીચે પ્રમાણે નર્નસ્ટ સમીકરણથી ગણવામાં આવે છે :

$$E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^0 - \frac{0.059}{n} \cdot \log \frac{c_1}{c_2}$$

$$\therefore E_{\text{cell}} = 0 - \frac{0.059}{1} \cdot \log \frac{c_1}{c_2}$$

$$\therefore E_{\text{cell}} = -\frac{0.059}{1} \cdot \log \frac{c_1}{c_2}$$

સાંદ્રતાકોષમાં બંને વિદ્યુતધ્રુવો સમાન હોવાથી $E_{\text{cell}}^0 = 0.0$ વોલ્ટ થશે. અહીં આ સાંદ્રતાકોષ માટે $n = 1$ થશે.

$$\therefore E_{\text{cell}} = 0.059 \cdot \log \frac{c_1}{c_2}$$

સાંદ્રતાકોષનો પોટેન્શિયલ પ્રમાણમાં ઓછો હોય છે. કારણ કે $E_{\text{cell}}^0 = 0.0$ વોલ્ટ હોય છે. કોષ કાર્યરત હોય ત્યારે સાંદ્ર દ્રાવણના આયનો મંદ દ્રાવણ તરફ જતાં હોવાથી બંને દ્રાવણોની સાંદ્રતા સમાન થવા પ્રયત્ન કરે છે અને બંને દ્રાવણોની સાંદ્રતા સમાન થતાં કોષ-પોટેન્શિયલ શૂન્ય ($E_{\text{cell}} = 0.0$ વોલ્ટ) થાય છે.

સાંદ્રતા કોષની પ્રક્રિયાનો સંતુલન અચળાંક “1” હોય છે.

27. નર્નસ્ટ સમીકરણમાં આવતા પદ $\frac{2.303RT}{F}$ નું મૂલ્ય 80° સે. તાપમાને કયું છે ?

- (A) 0.007 V (B) 0.01587 V (C) 0.01857 V (D) 0.07 V

28. નર્નસ્ટ સમીકરણમાં 25° સે તાપમાને મળતા અચળ મૂલ્ય 0.059નો એકમ જણાવો.

- (A) કુલંબ (B) વોલ્ટ (C) ફેરડે (D) એકમરહિત

29. E^0_{cell} શોધવા કયું સમીકરણ યોગ્ય છે ?

- (A) $E^0_{\text{cell}} = E^0_{\text{red(એનોડ)}} + E^0_{\text{red(કેથોડ)}}$ (B) $E^0_{\text{cell}} = E^0_{\text{oxi(કેથોડ)}} + E^0_{\text{oxi(એનોડ)}}$
(C) $E^0_{\text{cell}} = E^0_{\text{oxi(કેથોડ)}} - E^0_{\text{oxi(એનોડ)}}$ (D) $E^0_{\text{cell}} = E^0_{\text{red(એનોડ)}} + E^0_{\text{oxi(કેથોડ)}}$

30. $\text{Al} | \text{Al}^{3+}_{(0.02\text{M})} || \text{Pb}^{2+}_{(0.2\text{M})} | \text{Pb}$ કોષ માટે $n = 3$ લેવામાં આવે, તો Q નું મૂલ્ય કેટલું થાય ?

- (A) 0.05M^{-1} (B) $0.2236\text{M}^{-\frac{1}{2}}$ (C) 0.01M (D) $0.05\text{M}^{\frac{1}{2}}$

31. $\text{Co} | \text{Co}^{2+}_{(C_1)} || \text{Ag}^{1+}_{(C_2)} | \text{Ag}$ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ માટે આપેલ કયું નર્નસ્ટ સમીકરણ સાચું છે ?

- (A) $E^0_{\text{cell}} - E_{\text{cell}} = \frac{RT}{2F} \cdot \ln \frac{[\text{Ag}^+]^2}{[\text{Co}^{2+}]}$ (B) $E^0_{\text{cell}} = E_{\text{cell}} + \frac{RT}{F} \cdot \ln \frac{[\text{Co}^{2+}]^{\frac{1}{2}}}{[\text{Ag}^+]}$
(C) $E^0_{\text{cell}} = E_{\text{cell}} - \frac{RT}{2F} \cdot \ln \frac{[\text{Co}^{2+}]}{[\text{Ag}^+]^2}$ (D) $E^0_{\text{cell}} = E_{\text{cell}} + \frac{RT}{F} \cdot \ln \frac{[\text{Co}^{2+}]}{[\text{Ag}^+]^2}$

32. $\text{Ni} | \text{Ni}^{2+}$ અર્ધ-કોષનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ શોધવાનું નર્નસ્ટ સમીકરણ આપેલમાંથી સાચું કયું છે ?

- (A) $E^0_{\text{Ni} | \text{Ni}^{2+}} = E_{\text{Ni} | \text{Ni}^{2+}} - \frac{RT}{2F} \cdot \ln[\text{Ni}^{2+}]$ (B) $E_{\text{Ni} | \text{Ni}^{2+}} = E^0_{\text{Ni} | \text{Ni}^{2+}} + \frac{RT}{2F} \cdot \ln[\text{Ni}^{2+}]$
(C) $E^0_{\text{Ni} | \text{Ni}^{2+}} = E_{\text{Ni} | \text{Ni}^{2+}} + \frac{RT}{2F} \cdot \ln[\text{Ni}^{2+}]$ (D) $E^0_{\text{Ni} | \text{Ni}^{2+}} - E_{\text{Ni} | \text{Ni}^{2+}} = \frac{RT}{2F} \cdot \ln \frac{1}{[\text{Ni}^{2+}]}$

33. $\text{Zn} | \text{Zn}^{2+}_{(0.005\text{M})} || \text{Ag}^{+}_{(0.04\text{M})} | \text{Ag}$ કોષ માટે n ના મૂલ્યને અનુરૂપ Q ના મૂલ્ય માટે કયો વિકલ્પ યોગ્ય છે ?

- (A) $n = 1, Q = 3.125\text{M}^{-\frac{1}{2}}$ (B) $n = 2, Q = 1.7677\text{M}$
(C) $n = 3, Q = 5.5243\text{M}^{-\frac{3}{2}}$ (D) $n = 4, Q = 0.156\text{M}^{-2}$

34. $\text{Pt} | \text{Br}_{2(l)} | \text{Br}^{-}_{(C_1)} || \text{Au}^{3+}_{(C_2)} | \text{Au}$ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષમાં થતી પ્રક્રિયા માટે n અને Q માટે સાચો વિકલ્પ કયો છે ?

- (A) $n = 3, Q = [\text{Au}^{3+}][\text{Br}^{-}]^3$ (B) $n = 6, Q = [\text{Au}^{3+}]^2 [\text{Br}^{-}]^6$
(C) $n = 6, Q = \frac{[\text{Au}^{3+}]^2 [\text{Br}^{-}]^6}{1}$ (D) $n = 3, Q = \frac{1}{[\text{Au}^{3+}][\text{Br}^{-}]^3}$

35. $\text{Pt} | \text{Cl}_{2(g, 1.0\text{atm})} | \text{Cl}^-_{(0.5M)} || \text{Au}^{3+}_{(0.4M)} | \text{Au}$ કોષ માટે $Q = 20M^{-4}$ હોય, તો $n = \dots\dots\dots$.
 (A) $n = 6$ (B) $n = 2$ (C) $n = 3$ (D) $n = 4$
36. 25° સે તાપમાને $\text{Pt} | \text{H}_{2(g, 1.0\text{atm})} | \text{H}^+_{(\text{pOH} = 11)}$ અર્ધ-કોષનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ જણાવો.
 (A) 0.177 V (B) 0.0282 V (C) 0.616 V (D) 0.649 V
37. જો $E_{\text{Zn}^{2+}(\text{XM})|\text{Zn}} < E^\circ_{\text{Zn}^{2+}|\text{Zn}}$ હોય, તો x ની કિંમત કઈ શક્ય છે ?
 (A) 1.2 M (B) 0.2 M (C) 1.0 M (D) નક્કી ના થઈ શકે.
38. 25° સે તાપમાને $\text{Fe} | \text{Fe}^{2+}_{(\text{XM})} || \text{Ag} || \text{Ag}^+_{(\text{YM})}$ કોષનો વાસ્તવિક પોટેન્શિયલ 1.295 V છે. 25° સે તાપમાને $\text{Fe}^{2+}_{(\text{XM})} | \text{Fe}$ નો પોટેન્શિયલ 0.455 V હોય, તો તે તાપમાને $\text{Ag}^+_{(\text{YM})} | \text{Ag}$ કોષનો પોટેન્શિયલ કેટલો હશે ?
 (A) 0.84 V (B) -2.135 V (C) 3.125 V (D) -0.84 V
39. $\text{Co}_{(s)} + 2\text{Ag}^{2+}_{(\text{aq})} \rightleftharpoons \text{Co}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{Ag}_{(s)}$ પ્રક્રિયાનો $E^\circ_{\text{cell}} = 1.08 \text{ V}$ છે. જો $\text{Co}^{2+}_{(\text{aq})}$ નું સાંદ્રણ બમણું કરવામાં આવે, તો E°_{cell} માં શું ફેરફાર થાય ?
 (A) બમણો થાય. (B) અડધો થાય.
 (C) કોઈ ફેરફાર ના થાય. (D) બમણાં કરતાં થોડો ઓછો વધે.
40. વિદ્યુત રાસાયણિક કોષનો પોટેન્શિયલ ક્યારે શૂન્ય થાય ?
 (A) એનોડનો E_{OX} અને કેથોડનો E_{red} સમાન થાય ત્યારે
 (B) એનોડનો E°_{red} અને કેથોડનો E°_{red} સમાન હોય ત્યારે જ
 (C) એનોડનો E_{OX} અને કેથોડનો E_{OX} સમાન થાય ત્યારે
 (D) બંને અર્ધકોષના દ્રાવણની સાંદ્રતા સમાન થાય ત્યારે જ
41. વિદ્યુત રાસાયણિક કોષમાં આપેલમાંથી કયા વિકલ્પ માટે $E_{\text{cell}} = E^\circ_{\text{cell}}$ થાય ?
 (A) બંને અર્ધકોષના દ્રાવણની સાંદ્રતા સમાન હોય ત્યારે જ (B) $K = 1$ તો જ
 (C) કોષ-પ્રક્રિયા સંતુલનમાં હોય ત્યારે (D) આપેલ એક પણ નહિ.
42. $\text{Zn} | \text{Zn}^{2+}_{(0.04M)} || \text{Ag}^+_{(\text{C}_2)} | \text{Ag}$ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ માટે $E_{\text{cell}} = E^\circ_{\text{cell}}$ હોય, તો C_2 નું મૂલ્ય આપેલમાંથી કયું હોઈ શકે છે ?
 (A) 0.04M (B) 0.02M (C) 0.2M (D) 0.0016M
43. $\text{Fe} | \text{Fe}^{2+}_{(\text{C}_1)} || \text{Cl}^-_{(\text{C}_2)} | \text{Cl}_{2(g)} | \text{Pt}$ કોષ માટે નિયત તાપમાને કેથોડના દ્રાવણની સાંદ્રતામાં વધારો કરતા કોષ-પોટેન્શિયલમાં શું ફેરફાર થશે ?
 (A) વધશે. (B) ઘટશે. (C) કોઈ ફેરફાર ના થાય. (D) $E_{\text{cell}} = E^\circ_{\text{cell}}$ થાય.
44. $\text{Mg} | \text{Mg}^{2+}_{(\text{C}_1)} || \text{Fe}^{2+}_{(0.5M)} | \text{Fe}$ કોષમાં નિયત તાપમાને બંને દ્રાવણોની સાંદ્રતામાં સમાન 0.1 Mનો ઘટાડો કરતાં કોષ-પોટેન્શિયલ વધે છે, તો C_1 નું મૂલ્ય આપેલ મૂલ્યોમાંથી કયું મૂલ્ય હોઈ શકે ?
 (A) 0.7 M (B) 0.5 M (C) 0.4 M (D) આપેલ એક પણ નહિ.
45. $\text{Co} | \text{Co}^{2+}_{(\text{C}_1)} || \text{Sn}^{2+}_{(\text{C}_2)} | \text{Sn}$ કોષ માટે $\text{C}_2 > \text{C}_1$ હોય, તો બંને અર્ધ-કોષનાં દ્રાવણોની સાંદ્રતામાં સમાન 0.1 Mનો વધારો કરતાં કોષ-પોટેન્શિયલમાં શું ફેરફાર થાય ?
 (A) વધશે (B) ઘટશે (C) કોઈ ફેરફાર ના થાય (D) $E_{\text{cell}} = E^\circ_{\text{cell}}$ થાય.

46. $\text{Ni} | \text{Ni}^{2+}_{(C_1)} || \text{Cu}^{2+}_{(0.4M)} | \text{Cu}$ કોષમાં નિયત તાપમાને બંને દ્રાવણોની સાંદ્રતામાં સમાન 0.1 Mનો વધારો કરતાં કોષ-પોટેન્શિયલ વધે છે, તો C_1 નું મૂલ્ય આપેલ મૂલ્યોમાંથી કયું મૂલ્ય હોઈ શકે ?
 (A) 0.8 M (B) 0.1 M (C) 0.4 M (D) આપેલ એક પણ નહિ.
47. $\text{Cd} | \text{Cd}^{2+}_{(C_1)} || \text{Cu}^{2+}_{(C_2)} | \text{Cu}$ કોષ માટે $E_{\text{cell}} > E^0_{\text{cell}}$ હોય, તો બંને અર્ધ-કોષનાં દ્રાવણોની સાંદ્રતામાં સમાન 0.1 Mનો ઘટાડો કરતાં કોષ-પોટેન્શિયલમાં શું ફેરફાર થાય ? (C_1 અને $C_2 > 0.1 \text{ M}$)
 (A) વધશે. (B) ઘટશે. (C) કોઈ ફેરફાર ના થાય. (D) કહી ના શકાય.
48. $\text{Pt} | \text{H}_{2(g, 1.0 \text{ bar})} | \text{OH}^-_{(\text{aq})}$ અર્ધકોષમાં થતી ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા જણાવો.
 (A) $\text{H}_{2(g)} + 2\text{OH}^-_{(\text{aq})} \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}_{(l)} + 2e^-$ (B) $2\text{OH}^-_{(\text{aq})} \rightleftharpoons \text{H}_{2(g)} + \text{O}_{2(g)} + 2e^-$
 (C) $2\text{H}_2\text{O}_{(l)} + 2\text{OH}^-_{(\text{aq})} \rightleftharpoons 3\text{H}_{2(g)} + 2e^-$ (D) $\text{H}_{2(g)} + 2\text{OH}^-_{(\text{aq})} \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}_{(l)} + \text{O}_{2(g)} + 2e^-$
49. 25° સે તાપમાને કોષમાં થતી વાસ્તવિક પ્રક્રિયાને આધારે કયું કોષ-નિરૂપણ યોગ્ય નથી ?
 ($E^0_{\text{Pb}^{2+} | \text{Pb}} = -0.13\text{V}$, $E^0_{\text{Sn}^{2+} | \text{Sn}} = -0.14\text{V}$)
 (A) $\text{Sn} | \text{Sn}^{2+}_{(0.1M)} || \text{Pb}^{2+}_{(0.01M)} | \text{Pb}$ (B) $\text{Sn} | \text{Sn}^{2+}_{(0.02M)} || \text{Pb}^{2+}_{(0.2M)} | \text{Pb}$
 (C) $\text{Pb} | \text{Pb}^{2+}_{(0.01M)} || \text{Sn}^{2+}_{(0.1M)} | \text{Sn}$ (D) $\text{Sn} | \text{Sn}^{2+}_{(0.05M)} || \text{Pb}^{2+}_{(0.5M)} | \text{Pb}$
50. 25° સે તાપમાને $\text{Ag} | \text{Ag}^+_{(0.4M)} | \text{Al} | \text{Al}^{3+}_{(0.1M)}$ અર્ધકોષોને જોડતા રચાતા કોષનો પોટેન્શિયલ 2.456 V હોય, તો કોષનો પ્રમાણિત પોટેન્શિયલ કેટલો હશે ?
 (A) 1.46 V (B) 2.46 V (C) 2.64 V (D) 2.76 V
51. $\text{Ni} | \text{Ni}^{2+}_{(0.001M)} || \text{Ag}^{2+}_{(0.01M)} | \text{Ag}$ કોષના તાપમાનમાં વધારો કરતાં કોષ-પોટેન્શિયલમાં સૈદ્ધાંતિક રીતે કયો ફેરફાર થશે ?
 (A) વધશે. (B) ઘટશે. (C) ફેરફાર ના થાય. (D) કહી ના શકાય.
52. $\text{Zn} | \text{Zn}^{2+}_{(0.05M)} || \text{Co}^{2+}_{(0.08M)} | \text{Co}$ કોષના તાપમાનમાં વધારો કરતાં કોષ-પોટેન્શિયલમાં સૈદ્ધાંતિક રીતે કયો ફેરફાર થશે ?
 (A) વધશે. (B) ઘટશે. (C) ફેરફાર ના થાય. (D) કહી ના શકાય.
53. $\text{Mg} | \text{Mg}^{2+}_{(c \text{ M})} || \text{Fe}^{2+}_{(0.08M)} | \text{Fe}$ કોષના તાપમાનમાં ઘટાડો કરતાં કોષ-પોટેન્શિયલ સૈદ્ધાંતિક રીતે વધે છે, તો c નું કયું મૂલ્ય શક્ય છે ?
 (A) $c = 0.5$ (B) $c = 0.02$ (C) $c = 0.05$ (D) $c = 0.04$
54. $\text{Zn} | \text{Zn}^{2+}_{(C_1)} || \text{Sn}^{2+}_{(C_1)} | \text{Sn}$ ($C_1 < C_2$) કોષના તાપમાનમાં ઘટાડો કરતાં કોષ-પોટેન્શિયલમાં સૈદ્ધાંતિક રીતે કયો ફેરફાર થશે ?
 (A) વધશે. (B) ઘટશે. (C) ફેરફાર ના થાય. (D) કહી ના શકાય.
55. 25° સે તાપમાને $\text{Mg} | \text{Mg}^{2+}_{(0.2M)} || \text{H}^+_{(\text{XM})} | \text{H}_{2(g, 1.0 \text{ bar})} | \text{Pt}$ કોષ માટે E_{cell} અને E^0_{cell} નાં મૂલ્યો અનુક્રમે 2.3629 V અને 2.36 V હોય, તો $X = \dots\dots\dots$
 (A) 0.4 M (B) 0.5 M (C) 0.1 M (D) 0.25 M
56. $2\text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{O}_{2(g, 1.0 \text{ bar})} + 4\text{H}^+_{(\text{aq})} + 4e^-$ પ્રક્રિયાનો પ્રમાણિત પોટેન્શિયલ -1.23V અને 25° સે તાપમાને જો $[\text{H}^+] = 10^{-7} \text{ M}$ હોય, તો આ પ્રક્રિયાનો પોટેન્શિયલ કેટલો હશે ? અથવા 25° સે તાપમાને શુદ્ધ પાણીનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ કેટલો થાય ?
 (A) -0.41 V (B) -2.62 V (C) -0.817 V (D) 0.41 V

57. 25° સે તાપમાને $2\text{H}_2\text{O}_{(l)} + 2e^- \rightleftharpoons \text{H}_{2(g, 1.0 \text{ બાર)}} + 2\text{OH}^-_{(aq, 10^{-7} \text{ M})}$ $E = -0.417 \text{ V}$ હોય અથવા 25° સે તાપમાને શુદ્ધ પાણીનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ -0.417 V હોય, તો આ પ્રક્રિયાનો E^0 કેટલો હશે ?
 (A) -0.83 V (B) -2.62 V (C) -0.817 V (D) 0.41 V
58. 25° સે તાપમાને $\text{Fe}_{(s)} + 2\text{Ag}^+_{(aq, 0.5 \text{ M})} \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}_{(aq, 0.1 \text{ M})} + 2\text{Ag}_{(s)}$ પ્રક્રિયાનો E_{cell} અને સંતુલન અચળાંક અનુક્રમે કેટલા છે ? ($E^0_{\text{Fe}^{2+}|\text{Fe}} = 0.44 \text{ V}$, $E^0_{\text{Ag}^+|\text{Ag}} = 0.80 \text{ V}$)
 (A) 1.25 V , $1.04 \times 10^{21} \text{ M}^{-1}$ (B) 1.23 V , $1.507 \times 10^{12} \text{ M}^{-1}$
 (C) 1.23 V , $1.264 \times 10^6 \text{ M}^{-1}$ (D) 1.25 V , $1.081 \times 10^{42} \text{ M}^{-1}$
59. $E^0_{\text{Cr}^{3+}|\text{Cr}} = -0.74 \text{ V}$, $E^0_{\text{MnO}_4^-|\text{Mn}^{3+}} = 1.51 \text{ V}$, $E^0_{\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}|\text{Cr}^{3+}} = 1.33 \text{ V}$, $E^0_{\text{Cl}|\text{Cl}^-} = 1.36 \text{ V}$, આપેલ માહિતીને આધારે નીચેનામાંથી કયો પ્રબળ ઓક્સિડેશનકર્તા છે ?
 (A) Cr^{3+} (B) Mn^{2+} (C) MnO_4^- (D) Cl^-
- કોષ-પોટેન્શિયલની કેટલીક ઉપયોગિતાઓ નીચે પ્રમાણે છે :
- (1) કોષ-પોટેન્શિયલનાં મૂલ્યોને આધારે કોષમાં થતી પ્રક્રિયાનો સંતુલન અચળાંક ગણી શકાય છે.
 - (2) યોગ્ય કોષની રચના કરી તેના કોષ-પોટેન્શિયલના મૂલ્યોને આધારે અલ્પદ્રાવ્ય ક્ષારોના ગુણાકાર (K_{sp}), એસિડનાં દ્રાવણોની pH અને પાણીનો આયોનિક ગુણાકાર (K_w) ગણી શકાય છે.
 - (3) કોષ-પોટેન્શિયલનો ઉપયોગ કરી કેટલાંક અનુમાપનો થઈ શકે છે.
 - (4) કોષ-પોટેન્શિયલના મૂલ્યોને આધારે પ્રક્રિયાનું પ્રાક્ષયન કરી શકાય છે.
60. 298 K તાપમાને $\text{Cd}_{(s)} + \text{Sn}^{2+}_{(aq)} \rightleftharpoons \text{Cd}^{2+}_{(aq)} + \text{Sn}_{(s)}$ પ્રક્રિયાનો સંતુલન અચળાંક $K = e^{20.2537}$ ($n = 2$) હોય, તો આ પ્રક્રિયાનો પ્રમાણિત પોટેન્શિયલ કેટલો હશે ?
 ($R = 8.314 \text{ જૂલ}\cdot\text{મોલ}^{-1}\cdot\text{કેલ્વિન}^{-1}$, $F = 96500 \text{ કુલમ્બ}\cdot\text{મોલ}^{-1}$)
 (A) 0.52 V (B) 0.26 V (C) 0.13 V (D) 0.48 V
61. 25° સે તાપમાને એક વિદ્યુતરાસાયણિક કોષમાં થતી પ્રક્રિયા માટે $K_c = 1.3141 \times 10^{107} \text{ M}^{-1}$ અને $n = 2$ હોય, તો તે કોષ માટે E^0_{cell} કેટલો થાય ?
 (A) 6.32 V (B) 0.1186 V (C) 0.32 V (D) 3.16 V
62. એક વિદ્યુતરાસાયણિક કોષમાં થતી $K_c = 1.3141 \times 10^{307} \text{ M}^8$ અને $n = 6$ છે. જો કેથોડ વિદ્યુતધ્રુવનો પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ 1.36 V હોય, તો એનોડ વિદ્યુતધ્રુવનો પ્રમાણિત ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ કેટલો હશે ?
 (A) 6.32 V (B) 1.66 V (C) 2.71 V (D) 3.16 V
63. 25° સે તાપમાને એક વિદ્યુતરાસાયણિક કોષનો પ્રમાણિત પોટેન્શિયલ 3.16 V અને સંતુલન અચળાંક મૂલ્ય $1.727 \times 10^{214} \text{ M}^{-2}$ હોય, તો તે કોષમાં થતી પ્રક્રિયા માટે n જણાવો.
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
64. $\text{Pt} | \text{H}_{2(g, 1.0 \text{ બાર})} | \text{H}^+_{(aq, \text{pH} = 4)}$ અર્ધ-કોષનો 25° સે તાપમાન ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ કેટલો હશે ?
 (A) 0.118 V (B) 0.649 V (C) 0.236 V (D) -0.118 V
65. 25° સે તાપમાને અને 1.0 બાર દબાણે હાઈડ્રોજન અર્ધ-કોષનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ 0.118 V છે, તો તેના દ્રાવણની pOH કેટલી હશે ?
 (A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 12
66. 25° સે તાપમાને $\text{Pt} | \text{H}_{2(g, 1.0 \text{ બાર})} | \text{HCl}_{(XM)} || \text{Cu}^{+2}_{(0.01 \text{ M})} | \text{Cu}$ કોષનો પોટેન્શિયલ 0.635 V છે, તો HCl ના દ્રાવણની pH કેટલી હશે ? ($E^0_{\text{Cu}^{2+}|\text{Cu}} = 0.34 \text{ V}$)
 (A) 2.0 (B) 5.0 (C) 6.0 (D) 4

67. 25° સે તાપમાને $\text{Mg} \mid \text{Mg}^{2+}_{(0.01 \text{ M})} \parallel \text{HCl}_{(\text{XM})} \mid \text{H}_{2(\text{g}, 1.0 \text{ બાર})} \mid \text{Pt}$ કોષનો પોટેન્શિયલ 2.09 V છે, તો HClના દ્રાવણની pH કેટલી હશે ? ($E^0_{\text{Mg}^{2+} \mid \text{Mg}} = -2.36 \text{ V}$)
 (A) 6.58 (B) 5.58 (C) 3.58 (D) 4.58
68. $\text{Pt} \mid \text{H}_{2(\text{g}, 1.0 \text{ બાર})} \mid \text{HCl}_{(\text{XM})} \parallel \text{Au}^{3+}_{(0.001 \text{ M})} \mid \text{Au}$ કોષનો પોટેન્શિયલ 1.6655 V છે, તો HClના દ્રાવણની pH કેટલી હશે ? ($E^0_{\text{Au}^{3+} \mid \text{Au}} = 1.40 \text{ V}$)
 (A) 3.5 (B) 4.17 (C) 5.5 (D) 4.83
69. 298 K તાપમાને $\text{Pt} \mid \text{H}_{2(\text{g}, 1.0 \text{ બાર})} \mid \text{OH}^{-}_{(\text{aq}, \text{pH} = 4.5)} \parallel \text{H}^{+}_{(\text{aq}, \text{pH} = 2.5)} \mid \text{H}_{2(\text{g}, 1.0 \text{ બાર})} \mid \text{Pt}$ કોષનો પોટેન્શિયલ કેટલો થાય ?
 (A) 0.118 V (B) 0.205 V (C) 0.08 V (D) 0.124 V
70. 298 K તાપમાને $\text{Pt} \mid \text{H}_{2(\text{g}, 1.0 \text{ બાર})} \mid \text{OH}^{-}_{(\text{aq}, \text{pOH} = 10.5)} \parallel \text{H}^{+}_{(\text{aq}, \text{pH} = 2.0)} \mid \text{H}_{2(\text{g}, 1.0 \text{ બાર})} \mid \text{Pt}$ કોષનો પોટેન્શિયલ કેટલો થાય ?
 (A) 0.5015 V (B) 0.0885 V (C) 0.0452 V (D) 0.05015 V
71. 25° સે તાપમાને કઈ પ્રક્રિયા પૂરોગામી દિશામાં આપમેળે થશે ? $\text{Pt} \mid \text{I}_{2(\text{s})} \mid \text{I}^{-}$, $\text{Cu} \mid \text{Cu}^{2+}$, $\text{Cr} \mid \text{Cr}^{3+}$, $\text{Zn} \mid \text{Zn}^{2+}$, $\text{Sn} \mid \text{Sn}^{2+}$, $\text{Pb} \mid \text{Pb}^{2+}$, $\text{Ag} \mid \text{Ag}^{+}$, $\text{Fe} \mid \text{Fe}^{3+}$ ના પ્રમાણિત ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ અનુક્રમે -0.54 V, -0.34 V, 0.74 V, 0.76 V, 0.14 V, 0.13 V, -0.80 V, 0.037 V છે.
 (A) $2\text{I}^{-}_{(\text{aq}, 0.1 \text{ M})} + \text{Cu}^{2+}_{(\text{aq}, 0.05 \text{ M})} \rightleftharpoons \text{I}_{2(\text{s})} + \text{Cu}_{(\text{s})}$
 (B) $2\text{Cr}^{3+}_{(\text{aq}, 0.001 \text{ M})} + 3\text{Zn}_{(\text{s})} \rightleftharpoons 2\text{Cr}_{(\text{s})} + 3\text{Zn}^{2+}_{(\text{aq}, 0.1 \text{ M})}$
 (C) $\text{Pb}^{2+}_{(\text{aq}, 0.02 \text{ M})} + \text{Sn}_{(\text{s})} \rightleftharpoons \text{Pb}_{(\text{s})} + \text{Sn}^{2+}_{(\text{aq}, 0.2 \text{ M})}$
 (D) $3\text{Ag}_{(\text{s})} + \text{Fe}^{3+}_{(\text{aq}, 0.01 \text{ M})} \rightleftharpoons 3\text{Ag}^{+}_{(\text{aq}, 0.1 \text{ M})} + \text{Fe}_{(\text{s})}$
72. $\text{Fe} \mid \text{Fe}^{2+}$ અને $\text{Fe}^{2+} \mid \text{Fe}^{3+}$ અર્ધ કોષો માટે E^0_{red} અનુક્રમે -0.44 V અને +0.77 V છે, તો $\text{Fe} \mid \text{Fe}^{3+}$ અર્ધ-કોષ માટે E^0_{OX} નું મૂલ્ય આપેલ મૂલ્યો માંથી કયું હશે ?
 (A) 0.037 V (B) 0.33 V (C) -0.33 V (D) -0.11 V
73. $E^0_{\text{Cu} \mid \text{Cu}^{2+}} = -0.34 \text{ V}$ અને $E^0_{\text{Cu}^{2+} \mid \text{Cu}^{+}} = +0.16 \text{ V}$ હોય, તો $E^0_{\text{Cu} \mid \text{Cu}^{+}}$ નું મૂલ્ય કેટલું થાય ?
 (A) -0.12 V (B) -0.48 V (C) +0.48 V (D) -0.52 V
74. $\text{Co} \mid \text{Co}^{3+}$, $\text{Co}^{2+} \mid \text{Co}^{3+}$, $\text{Fe} \mid \text{Fe}^{3+}$, $\text{Fe}^{2+} \mid \text{Fe}^{3+}$ અર્ધ-કોષોના પ્રમાણિત ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ અનુક્રમે -0.4167 V, -1.81 V, 0.0367 V, -0.77 V છે. તો $\text{Fe} \mid \text{Fe}^{2+} \parallel \text{Co}^{2+} \mid \text{Co}$ કોષનો પ્રમાણિત પોટેન્શિયલ કેટલો થાય ?
 (A) 0.72 V (B) -0.11 V (C) 1.0 V (D) 0.16 V
75. 50° સે તાપમાને $\text{Pt} \mid \text{H}_{2(\text{g}, 1.0 \text{ બાર})} \mid \text{OH}^{-}_{(\text{aq})}$ અર્ધ-કોષના E^0_{OX} નું મૂલ્ય +0.83 V હોય, તો 50° સે તાપમાને પાણીના આયોનીય ગુણાકાર (K_w)નું મૂલ્ય કેટલું થાય ?
 (A) 1.12×10^{-13} (B) 1.102×10^{-12} (C) 1.105×10^{-12} (D) 1.0×10^{-14}
76. 25° સે તાપમાને $\text{Sn} \mid \text{Sn}^{2+}_{(0.1 \text{ M})} \parallel \text{Pb}^{2+}_{(0.5 \text{ M})} \mid \text{Pb}$ વિદ્યુતરાસાયણિક કોષમાં સંતુલન સ્થપાય ત્યારે ડા.બા.ના. અર્ધકોષનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ કેટલો હશે ? ($E^0_{\text{Sn}^{2+} \mid \text{Sn}} = -0.14 \text{ V}$, $E^0_{\text{Pb}^{2+} \mid \text{Pb}} = -0.13 \text{ V}$)
 (A) 0.128 V (B) 0.0 V (C) 0.114 V (D) 0.151 V

77. 25° સે તાપમાને $\text{Co}_{(s)} + \text{Ni}^{2+}_{(\text{aq } 0.1 \text{ M})} \rightleftharpoons \text{Co}^{2+}_{(\text{aq } 0.01 \text{ M})} + \text{Ni}_{(s)}$ પ્રક્રિયા સંતુલનમાં આવે, ત્યારે $\text{Ni}^{2+}_{(\text{aq})}$ ની સાંદ્રતામાં કેટલા ટકા ઘટાડો થયો હશે ? ($E^0_{\text{Co}^{2+}|\text{Co}} = -0.28\text{V}$ અને -0.23 V)
- (A) 97.82 % (B) 8.74 % (C) 95.4 % (D) 92.5 %
78. $1.0 \times 10^{-3}\text{M}$ સાંદ્રતા ધરાવતા Fe^{3+} ના દ્રાવણમાં વધુ પડતો પ્રવાહી પારો ઉમેરવામાં આવે છે. 25° સે. તાપમાને 5% Fe^{3+} સંતુલન સમયે બાકી રહે છે. જો ફક્ત નીચે દર્શાવેલી પ્રક્રિયા જ શક્ય બનતી હોય, તો $E^0_{\text{Hg}^{2+}|\text{Hg}}$ ની કિંમત કઈ હશે ? ($E^0_{\text{Fe}^{3+}|\text{Fe}^{2+}} = 0.77 \text{ V}$)
- $$2\text{Hg}_{(l)} + 2\text{Fe}^{3+}_{(\text{aq})} \rightleftharpoons \text{Hg}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})}$$
- (A) 0.793 V (B) 0.643 V (C) -0.793 V (D) -0.643 V
79. $\text{Fe} | \text{Fe}^{2+}_{(0.1 \text{ M})} || \text{Cd}^{2+}_{(0.5 \text{ M})} | \text{Cd}$ વિદ્યુતરાસાયણિક કોષમાં 298 K તાપમાને સંતુલન સ્થપાય ત્યારે એનોડ અને કેથોડના રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો કેટલાં હશે ? ($n = 2$) $E^0_{\text{Fe}^{2+}|\text{Fe}} = -0.44 \text{ V}$ અને $E^0_{\text{Cd}^{2+}|\text{Cd}} = -0.40 \text{ V}$ છે.
- (A) -0.477 V (B) +0.477 V (C) -0.447 V (D) -0.575 V
80. 298 K તાપમાને નીચે આપેલા વિદ્યુતરાસાયણિક કોષમાં થતી પ્રક્રિયા સંતુલન સ્થિતિમાં છે, તો કયો વિકલ્પ યોગ્ય છે ?
- $$\text{Zn} | \text{Zn}^{2+}_{(\text{XM})} || \text{Cu}^{2+}_{(\text{YM})} | \text{Cu}$$
- (A) $E_{\text{Zn} | \text{Zn}^{2+}_{(\text{XM})}} = -E_{\text{Cu}^{2+}_{(\text{YM})} | \text{Cu}}$ (B) $E_{\text{Zn} | \text{Zn}^{2+}_{(\text{XM})}} = -E_{\text{Cu} | \text{Cu}^{2+}_{(\text{YM})}}$
- (C) $E_{\text{Zn} | \text{Zn}^{2+}_{(\text{XM})}} = E_{\text{Cu}^{2+}_{(\text{YM})} | \text{Cu}}$ (D) $E_{\text{Zn} | \text{Zn}^{2+}_{(\text{XM})}} + E_{\text{Cu}^{2+}_{(\text{YM})} | \text{Cu}} = 0.0 \text{ V}$
81. 298 K તાપમાને $\text{Co} | \text{Co}^{2+}_{(1.0 \text{ M})} || \text{Ni}^{2+}_{(\text{XM})} | \text{Ni}$ કોષમાં થતી પ્રક્રિયા સંતુલનમાં છે, તો $x = \dots\dots\dots$
- $E^0_{\text{Co}^{2+}|\text{Co}} = -0.28 \text{ V}$ અને $E^0_{\text{Ni}^{2+}|\text{Ni}} = -0.23 \text{ V}$ છે. ($n = 2$)
- (A) 1.0 M (B) 1.02 M (C) 0.02 M (D) 0.5 M
82. નીચે અર્ધ-કોષ પ્રક્રિયાઓ આપેલ છે :
- $$\text{Mn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Mn}; E^0 = -1.18\text{V}, 2(\text{Mn}^{3+} + \text{e}^- \rightarrow \text{Mn}^{2+}); E^0 = +1.51 \text{ V}$$
- તો $3\text{Mn}^{2+} \rightarrow \text{Mn} + 2\text{Mn}^{3+}$ માટે E^0 કેટલો થાય ? (અને પ્રક્રિયાનું પ્રાક્કથન જણાવો).
- (A) -0.33 V; પ્રક્રિયા થશે. (B) -2.69 V; પ્રક્રિયા થશે નહિ.
- (C) -2.69 V; પ્રક્રિયા થશે. (D) -0.33 V; પ્રક્રિયા થશે નહિ.

જવાબો : 27. (D), 28. (B), 29. (D), 30. (B), 31. (B), 32. (C), 33. (C), 34. (D), 35. (C), 36. (A), 37. (B), 38. (D), 39. (C), 40. (C), 41. (D), 42. (C), 43. (B), 44. (C), 45. (B), 46. (A), 47. (A), 48. (A), 49. (A), 50. (A), 51. (B), 52. (B), 53. (C), 54. (B), 55. (B), 56. (C), 57. (A), 58. (D), 59. (C), 60. (B), 61. (D), 62. (B), 63. (D), 64. (C), 65. (D), 66. (C), 67. (B), 68. (C), 69. (A), 70. (B), 71. (A), 72. (A), 73. (D), 74. (D), 75. (A), 76. (D), 77. (A), 78. (A), 79. (C), 80. (A), 81. (C), 82. (B)

વિદ્યુતવિભાજન : વિદ્યુતવિભાજનનું જલીય દ્રાવણ અથવા પિગાળેલું વિદ્યુતવિભાજ્ય કોષમાં લઈ તેમાં યોગ્ય વિદ્યુતધ્રુવો ડુબાડી વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર કરતાં વિદ્યુતધ્રુવો પર ઓક્સિડેશન અથવા રિડક્શન-પ્રક્રિયાઓ થઈ રેડોક્ષ નીપજો પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રક્રિયાને વિદ્યુતવિભાજન કહે છે.

વિદ્યુતવિભાજનનો સિદ્ધાંત : વિદ્યુતઊર્જાનું રાસાયણિક ઊર્જામાં રૂપાંતર.

● ફેરાડેના વિદ્યુતવિભાજનના નિયમો

(1) પહેલો નિયમ : વિદ્યુતવિભાજનથી વિદ્યુતધ્રુવો ઉપર ઉત્પન્ન થતી નીપજોના જથ્થા વિદ્યુતવિભાજન કોષમાંથી પસાર કરેલા વિદ્યુતના જથ્થાના સમપ્રમાણમાં હોય છે.

$$m \propto Q \text{ આથી } m = z \cdot Q \text{ જ્યાં } z = \text{વિદ્યુતરાસાયણિક તુલ્યાંક}$$

(2) બીજો નિયમ : જુદા જુદા વિદ્યુતવિભાજ્ય ધરાવતા વિદ્યુતવિભાજન કોષોને શ્રેણીબદ્ધ કરી તેમાંથી એક સમાન વિદ્યુતનો જથ્થો પસાર કરવામાં આવે, તો વિવિધ વિદ્યુતધ્રુવો ઉપર પ્રાપ્ત થતી નીપજોનો જથ્થો તેમના તુલ્યભારના સમપ્રમાણમાં હોય છે.

$$m \propto E_{eq} \text{ આથી } m = E_{eq} \cdot Q \text{ જ્યાં } E_{eq} = \text{તુલ્યભાર(વિદ્યુતરાસાયણિક તુલ્યાંક)}, Q = \text{પસાર કરેલો વિદ્યુત જથ્થો.}$$

ફેરાડેના નિયમોની આધુનિક રજૂઆત નીચે પ્રમાણે કરવામાં આવી :

“ઓક્સિડેશન-અર્ધ અને રિડક્શન-અર્ધ પ્રક્રિયાઓ દ્વારા વિદ્યુતધ્રુવો ઉપર પ્રાપ્ત થતી નીપજોના મોલની સંખ્યા તે પ્રક્રિયાની પ્રમાણિયતા(Stoichiometry-તત્વયોગમિતિ) દ્વારા કોષમાંથી પસાર થતા વિદ્યુતના જથ્થા સાથે સંબંધ ધરાવે છે.”

“1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા વહન થતા વિદ્યુતના જથ્થાને 1 ફેરાડે કહે છે.” તેને F સંજ્ઞા દ્વારા દર્શાવાય છે.

$$\begin{aligned} 1 \text{ ફેરાડે વિદ્યુત જથ્થો (F)} &= 1 \text{ મોલ} \times 1 \text{ ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર} \\ &= (6.022 \times 10^{23}) \times (1.602 \times 10^{19} \text{ કુલમ્બ}) \\ &= 96487 \text{ કુલમ્બ} \approx 96500 \text{ કુલમ્બ} \end{aligned}$$




$$F = \frac{I \times t}{96500} \text{ ફેરાડે, જ્યાં } I = \text{વિદ્યુતપ્રવાહ એમ્પિયરમાં, } t = \text{સમય સેકન્ડમાં}$$

ક્ષારોનાં જલીય દ્રાવણોના વિદ્યુતવિભાજનથી કઈ નીપજો પ્રાપ્ત થશે તેનો આધાર નીચેની બાબતો પર છે :

(1) વાપરવામાં આવેલા વિદ્યુતધ્રુવોની પ્રકૃતિ (2) દ્રાવણોની સાંદ્રતા (3) વિદ્યુતદબાણ

● પિગાળેલા NaClનું વિદ્યુતવિભાજન


પિગાળેલા NaClનું વિદ્યુતવિભાજન ગ્રેફાઈટનો એનોડ અને સ્ટીલનો કેથોડ લઈ કરતાં નીચે દર્શાવેલ પ્રક્રિયા મુજબ એનોડ પર ક્લોરિન વાયુ (Cl_{2(g)}) અને કેથોડ પર સોડિયમ (Na_(s)) ધાતુ ઉત્પન્ન થાય છે.







● NaClના મંદ જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન

ગ્રેફાઈટ (અથવા) પ્લેટિનમના નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં કરતાં તે ખરેખર પાણીનું જ વિદ્યુતવિભાજન છે. NaCl મંદ જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન ગ્રેફાઈટ (અથવા પ્લેટિનમ)ના નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવો વડે કરતાં નીચે સમજાવ્યા પ્રમાણે સંપૂર્ણ પ્રક્રિયામાં ફક્ત પાણીનું વિદ્યુતવિભાજન થઈને એનોડ ઉપર ઓક્સિજન વાયુ(O_{2(g)}) અને કેથોડ ઉપર હાઈડ્રોજન વાયુ (H_{2(g)}) ઉત્પન્ન થાય છે.

એનોડ ઉપર : NaClના મંદ જલીય દ્રાવણમાં Cl^- ની સાંદ્રતા ઓછી હોવાથી તેનું ઓક્સિડેશન મુશ્કેલ છે, તેના કરતાં પાણીનું ઓક્સિડેશન સરળતાથી થવાથી Cl_2 ને બદલે O_2 વાયુ મળે છે.



કેથોડ ઉપર : Na^+ નું રિડક્શન મુશ્કેલ હોવાથી અને તેના કરતાં પાણીનું રિડક્શન સરળ હોવાથી Na^+ ને બદલે H_2O ના રિડક્શનથી H_2 વાયુ મળે છે. ($\because \text{Na}^+_{(\text{aq})} + \text{e}^- \rightarrow \text{Na}_{(\text{s})} \quad E^0 = -2.70 \text{ V}; 2\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_{2(\text{g})} + 2\text{OH}^-_{(\text{aq})} \quad E^0 = -0.83 \text{ V}$)





આમ નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવો વડે NaClના મંદ જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન એ ખરેખર પાણીનું જ વિદ્યુતવિભાજન છે. (નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવો વડે NaClના મંદ જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન કરતાં દ્રાવણની pH બદલાતી નથી. વિદ્યુતવિભાજન દરમિયાન ફિનોલ્ફથેલિન કોઈ રંગપરિવર્તન દર્શાવશે નહિ અને દ્રાવણ રંગવિહીન રહેશે તથા મિથાઇલ ઓરેન્જ પણ કોઈ રંગ પરિવર્તન દર્શાવશે નહિ અને દ્રાવણ તટસ્થ રહેવાથી નારંગી રંગનું રહેશે. પાણી ઓછું થવાથી દ્રાવણમાં NaClની સાંદ્રતા વધે છે.)

● NaClના સાંદ્ર જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન :

NaClના સાંદ્ર જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન ગ્રેફાઈટ (અથવા પ્લેટિનમ)ના નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવો વડે કરતાં નીચે સમજાવ્યા પ્રમાણે એનોડ ઉપર ક્લોરિન વાયુ ($\text{Cl}_{2(\text{g})}$) અને કેથોડ ઉપર હાઈડ્રોજન વાયુ ($\text{H}_{2(\text{g})}$) ઉત્પન્ન થાય છે :

એનોડ ઉપર : NaClના સાંદ્ર જલીય દ્રાવણમાં Cl^- ની સાંદ્રતા વધુ હોવાથી H_2O કરતાં Cl^- નું ઓક્સિડેશન સરળતાથી થાય છે. આથી Cl^- નું ઓક્સિડેશન થઈ ક્લોરિન વાયુ ($\text{Cl}_{2(\text{g})}$) ઉત્પન્ન થાય છે.

કેથોડ ઉપર : Na^+ નું રિડક્શન મુશ્કેલ હોવાથી અને તેના કરતાં પાણીનું રિડક્શન સરળ હોવાથી Na^+ ને બદલે H_2O ના રિડક્શનથી H_2 વાયુ મળે છે. ($\because \text{Na}^+_{(\text{aq})} + \text{e}^- \rightarrow \text{Na}_{(\text{s})} \quad E^0 = -2.70 \text{ V}; 2\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_{2(\text{g})} + 2\text{OH}^-_{(\text{aq})} \quad E^0 = -0.83 \text{ V}$)



દ્રાવણમાં $\text{Cl}^-_{(\text{aq})}$ આયનોનું સ્થાન $\text{OH}^-_{(\text{aq})}$ આયનો લે છે.

આમ NaClના સાંદ્ર જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન ગ્રેફાઈટ(અથવા પ્લેટિનમ) નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવો વડે કરતાં એનોડ ઉપર ક્લોરિન વાયુ ($\text{Cl}_{2(\text{g})}$) કેથોડ પર હાઈડ્રોજન વાયુ ($\text{H}_{2(\text{g})}$) અને દ્રાવણમાં NaOH ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી NaCl ના સાંદ્ર જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન એ વાસ્તવમાં કોસ્ટિક સોડા (NaOH)ની ઔદ્યોગિક બનાવટ છે.




(નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવો વડે NaClના સાંદ્ર જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન કરતાં દ્રાવણ બેઝિક બનવાથી દ્રાવણની pH વધે છે, ફિનોલ્ફથેલિન ઉમેરીને વિદ્યુતવિભાજન કરવામાં આવે, તો દ્રાવણ રંગવિહીનમાંથી ગુલાબી બને છે અને મિથાઇલ ઓરેન્જ ઉમેરીને વિદ્યુતવિભાજન કરવામાં આવે, તો દ્રાવણ નારંગીમાંથી પીળા રંગનું બને છે.)

● કૉપર સલ્ફેટ (CuSO_4)ના જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન કૉપર (Cu)ના સક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં

CuSO_4 ના જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન કૉપર (Cu)ના સક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં કરવામાં આવે, તો આ પ્રક્રિયામાં એકંદરે એનોડનો કૉપર કેથોડ ઉપર જમા થાય છે.

કોપરનો વિદ્યુતધ્રુવ સક્રિય હોવાથી વિદ્યુતવિભાજન દરમિયાન તે પ્રક્રિયા અનુભવે છે.

અહીં વિદ્યુતવિભાજન દરમિયાન જેમ સમય પસાર થાય તેમ કોપરના એનોડ પરથી કોપરના પરમાણુઓ ($\text{Cu}_{(s)}$) ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા અનુભવી Cu^{2+} આયનો ઉત્પન્ન કરે છે Cu^{2+} અને આયનો દ્રાવણમાં જાય છે. આથી કોપરના એનોડનું વજન સમય સાથે ઘટતું જાય છે. તથા દ્રાવણમાં રહેલા Cu^{2+} આયનો કોપરના કેથોડની સપાટી ઉપર રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવી કોપર પરમાણુ ($\text{Cu}_{(s)}$) માં રૂપાંતર પામે છે અને કોપરના પરમાણુઓ ($\text{Cu}_{(s)}$) કોપરના કેથોડ ઉપર જમા થાય છે. આથી કોપરના કેથોડનું વજન સમય સાથે વધતું જાય છે.



કોપરના ધાતુકર્મવિધિમાં કોપરના વિદ્યુતરાસાયણિક શુદ્ધીકરણ દરમિયાન અશુદ્ધ કોપરનો એનોડ લઈ યોગ્ય વિદ્યુતદબાણે વિદ્યુતવિભાજન કરવામાં આવે ત્યારે એનોડમાં રહેલી Au, Pt જેવી નિષ્ક્રિય ધાતુઓ કે જે ઓક્સિડેશન અનુભવતી નથી તે એનોડમાંથી મુક્ત થઈને કોષના તળિયે જમા થાય છે. તેને **એનોડ પંક (Anode Mud)** કહે છે.

આમ, કોપર સલ્ફેટ (CuSO_4)ના જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન કોપર (Cu)ના સક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં કરવામાં આવે, તો એનોડ પર કોઈ નીપજ ના મળે પણ કોષના તળિયે મળતા એનોડ પંકમાં Ag, Au, Pt જેવી નિષ્ક્રિય અને કિંમતી ધાતુઓ મળે છે તથા કેથોડ પર કોપર ($\text{Cu}_{(s)}$) ધાતુ જમા થાય છે.

કોપર સલ્ફેટ (CuSO_4)ના જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન કોપર (Cu)ના સક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં કરવામાં આવે, તે દરમિયાન દ્રાવણમાં Cu^{2+} ની સાંદ્રતામાં ફેરફાર થતો ન હોવાથી દ્રાવણના વાદળી રંગમાં અને દ્રાવણની pHમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી.)

કોપર સલ્ફેટ (CuSO_4)ના જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન ગ્રેફાઈટ કે પ્લેટિનમ (Pt) જેવા નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં કરવામાં આવે, તો નીચે સમજાવ્યા પ્રમાણે એનોડ ઉપર પાણીના ઓક્સિડેશનથી ઓક્સિજન વાયુ ($\text{O}_{2(g)}$) અને કેથોડ ઉપર કોપર ધાતુ જમા થાય છે.

એનોડ ઉપર : SO_4^{2-} આયનોનું ઓક્સિડેશન H_2O ની તુલનામાં મુશ્કેલ હોવાથી H_2O નું ઓક્સિડેશન થઈ H^{+} આયન અને O_2 વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે.

કેથોડ ઉપર : દ્રાવણમાં રહેલા Cu^{2+} આયનોનું $\text{Cu}_{(s)}$ માં રિડક્શન થવાથી કોપર ધાતુ ઉત્પન્ન થાય છે.

દ્રાવણમાં $\text{Cu}_{(s)}$ આયનોનું સ્થાન H^{+} આયન લે છે. આથી દ્રાવણમાં H_2SO_4 ઉત્પન્ન થાય છે.

આમ કોપર સલ્ફેટ (CuSO_4)ના જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન ગ્રેફાઈટ કે પ્લેટિનમ (Pt) જેવા નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં કરવામાં આવે ત્યારે એનોડ ઉપર ઓક્સિજન વાયુ ($\text{O}_{2(g)}$) અને કેથોડ ઉપર કોપર ધાતુ જમા થાય છે તથા દ્રાવણમાં H_2SO_4 ઉત્પન્ન થાય છે.

(કોપર સલ્ફેટ (CuSO_4)ના જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન ગ્રેફાઈટ કે પ્લેટિનમ (Pt) જેવા નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં કરવામાં આવે ત્યારે દ્રાવણમાં H_2SO_4 ઉત્પન્ન થવાના કારણે દ્રાવણની એસિડિકતામાં વધારો થવાથી દ્રાવણની pH ઘટે છે. દ્રાવણમાં રહેલા Cu^{2+} આયનોનું $\text{Cu}_{(s)}$ માં રિડક્શન થવાથી દ્રાવણનો વાદળી રંગ આછો બને છે.)

● વિદ્યુતવિભાજનની ઉપયોગિતા (અગત્ય અથવા મહત્વ)

(1) Na, Mg, Al જેવી ધાતુઓનું ઉત્પાદન, Cl_2 , F_2 જેવા વાયુઓનું ઉત્પાદન અને NaOH, KOH જેવાં સંયોજનોનું ઉત્પાદન કરવા તેનો ઉપયોગ થાય છે.

(2) Au, Cu, Pt, Ag જેવી ધાતુઓનું શુદ્ધીકરણ વિદ્યુતવિભાજનથી કરવામાં આવે છે.

(3) ધાતુઓના ઢોળ ચઢાવવામાં (ધાતુ-પ્લેટિંગમાં) વિદ્યુતવિભાજનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

ક્રમ	વિદ્યુતવિભાજન	એનોડ ઉપર મળતી નીપજ	કેથોડ ઉપર મળતી નીપજ
1.	NaCl (પિગલિત)	$Cl_{2(g)}$	Na ધાતુ
2.	NaCl (સાંદ્ર જલીય દ્રાવણ)	$Cl_{2(g)}$	$H_{2(g)}$ અને દ્રાવણમાં NaOH
3.	NaCl (મંદ જલીય દ્રાવણ)	$O_{2(g)}$	$H_{2(g)}$
4.	Al_2O_3 (Na_3AlF_6) ગ્રેફાઈટના વિદ્યુતધ્રુવો	$O_{2(g)}$, $F_{2(g)}$, $CO_{2(g)}$	Al ધાતુ
5.	KHF_2 નિર્જળ HFમાં	$F_{2(g)}$	$H_{2(g)}$

● વિદ્યુતરાસાયણિક કોષ અને વિદ્યુતવિભાજન કોષ વચ્ચેનો તફાવત

વિદ્યુતરાસાયણિક કોષ	વિદ્યુતવિભાજન કોષ
(1) આ કોષ દ્વારા રાસાયણિક ઊર્જાનું વિદ્યુત-ઊર્જામાં રૂપાંતર થાય છે.	(1) આ કોષ દ્વારા વિદ્યુત-ઊર્જાનું રાસાયણિક ઊર્જામાં રૂપાંતર થાય છે.
(2) રેડોક્ષ પ્રક્રિયા આપમેળે થવાથી ($\Delta G < 0$) વિદ્યુત-શક્તિ મળે છે.	(2) રેડોક્ષ પ્રક્રિયા આપમેળે થતી નથી ($\Delta G > 0$) પણ વિદ્યુત-ઊર્જા આપવાથી રેડોક્ષ પ્રક્રિયા થાય છે.
(3) બે વિદ્યુતધ્રુવો સામાન્ય રીતે જુદાં જુદાં પાત્રમાં હોય છે.	(3) બંને વિદ્યુતધ્રુવો એક જ પાત્રમાં વિદ્યુતવિભાજનના દ્રાવણમાં કે પિગલિત પદાર્થમાં ડુબાડેલા હોય છે.
(4) એનોડ વિદ્યુતધ્રુવ ઋણ (−) વિદ્યુતધ્રુવ તરીકે અને કેથોડ વિદ્યુતધ્રુવ ધન (+) તરીકે હોય છે.	(4) એનોડ વિદ્યુતધ્રુવ ધન (+) તરીકે અને કેથોડ વિદ્યુતધ્રુવ (−) વિદ્યુતધ્રુવ તરીકે હોય છે. (એટલે કે બેટરીના ધન ધ્રુવ સાથે જોડવામાં આવેલ વિદ્યુતધ્રુવ એનોડ તરીકે અને બેટરીના ઋણ ધ્રુવ સાથે જોડવામાં આવેલ વિદ્યુતધ્રુવ કેથોડ તરીકે હોય છે.)
(5) આ કોષની રચનામાં સામાન્ય રીતે ક્ષાર-સેતુની જરૂર પડે છે.	(5) આ કોષની રચનામાં સામાન્ય રીતે ક્ષાર-સેતુની જરૂર પડતી નથી.
(6) દા. ત., ડેનિયલ કોષ	(6) દા. ત., Na, Al, Cl_2 વગેરેના વિદ્યુતવિભાજનથી ઉત્પાદન કરવા માટે વપરાતા કોષ

83. એક કોષનો પોટેન્શિયલ 2.0 વોલ્ટ છે. જો કોષમાં થતી પ્રક્રિયા માટે મુક્ત-ઊર્જાનો ફેરફાર $\Delta G = -50$ કિ.કેલરી હોય, તો તે કોષમાંથી કેટલા કુલંબ વિદ્યુતજથ્થો મેળવાયો હશે ? (1 કેલરી = 4.184 જૂલ)

- (A) 1.08 કુલંબ (B) 104600 કુલંબ (C) 25000 કુલંબ (D) 0.26 કુલંબ

84. પાણીના વિદ્યુતવિભાજનમાં 10 ફેરાડે વિદ્યુતભારનો જથ્થો પસાર કરતાં સૈદ્ધાંતિક રીતે અનુક્રમે કેટલા મોલ $O_{2(g)}$ અને $H_{2(g)}$ મળશે ?

- (A) 5 મોલ અને 10 મોલ (B) 10 મોલ અને 5 મોલ (C) 5 મોલ અને 2.5 મોલ (D) 2.5 મોલ અને 5 મોલ

85. $AgNO_3$ ના જલીય દ્રાવણમાંથી 5.0 ફેરાડે વિદ્યુતભારનો જથ્થો પસાર કરતાં કેથોડ પર સૈદ્ધાંતિક રીતે કેટલા ગ્રામ સિલ્વર મળશે ? (પરમાણ્વિય ભાર $Ag = 108$ ગ્રામ. મોલ⁻¹)

- (A) 270 ગ્રામ (B) 540 ગ્રામ (C) 180 ગ્રામ (D) 135 ગ્રામ

86. $\text{Al}^{3+}_{(l)}$ માંથી 15.0 ફેરાડે વિદ્યુતભારનો જથ્થો પસાર કરતાં કેથોડ પર પ્રાયોગિક રીતે કેટલા ગ્રામ Al ધાતુ મળશે ?
(કોષ-ક્ષમતા 80 % છે.) (પરમાણ્વિય ભાર Al = 27 ગ્રામ. મોલ⁻¹)
(A) 135 ગ્રામ (B) 121.5 ગ્રામ (C) 108 ગ્રામ (D) 94.5 ગ્રામ
87. પાણીના વિદ્યુતવિભાજનમાં 20 ફેરાડે વિદ્યુતભારનો જથ્થો પસાર કરતાં એ સૈદ્ધાંતિક રીતે કેટલા લિટર $\text{O}_{2(g)}$ મળશે ?
(A) 224 લિટર (B) 448 લિટર (C) 112 લિટર (D) 62 લિટર
88. પિગાળેલા NaClના વિદ્યુતવિભાજનમાં 10 ફેરાડે વિદ્યુતભારનો જથ્થો પસાર કરતાં પ્રાયોગિક રીતે STP એ 84 લિટર $\text{Cl}_{2(g)}$ મળે છે, તો કોષ ક્ષમતા કેટલી હશે ?
(A) 80 % (B) 75 % (C) 50 % (D) 90 %
89. CuSO_4 ના જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં કરવામાં આવે, તો દ્રાવણની pHમાં શું ફેરફાર થાય છે ?
(A) pH વધે. (B) pH ઘટે. (C) pHમાં કોઈ ફેરફાર ના થાય. (D) કહી ના શકાય.
90. 298 K તાપમાને બંધપાત્રમાં સલ્ફરડાયોક્સાઇડનું ઓક્સિડેશન થઈ સલ્ફરટ્રાયોક્સાઇડ બનવાની પ્રક્રિયાનો પ્રમાણિત પોટેન્શિયલ 0.182 વોલ્ટ છે. આ પ્રક્રિયા માટે $\Delta G^0 = -35126$ જૂલ છે. જો $\text{SO}_{2(g)}$ ની પ્રમાણિત સર્જનમુક્ત ઊર્જા -300.37 કિગ્રા જૂલ. મોલ⁻¹ હોય, તો $\text{SO}_{3(g)}$ ની પ્રમાણિત સર્જનમુક્ત ઊર્જા કેટલી હશે ?
(R = 8.314 જૂલ.મોલ⁻¹ કેલ્વિન⁻¹, F = 96500 ફેરાડે·મોલ ઇલેક્ટ્રોન⁻¹)
(A) -313.933 કિગ્રા જૂલ મોલ⁻¹ (B) -235.335 કિગ્રા જૂલ મોલ⁻¹
(C) -296.854 કિગ્રા જૂલ મોલ⁻¹ (D) -335.496 કિગ્રા જૂલ મોલ⁻¹
91. NaClના જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં કરતાં કેથોડ પર $\text{Na}^+_{(aq)}$ ની જગ્યાએ H_2O નું રિડક્શન થાય છે. કારણ કે.....
(A) H_2O કરતાં $\text{Na}^+_{(aq)}$ નો પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ વધારે છે.
(B) H_2O ના પ્રમાણિત ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય ખૂબ વધારે હોવાથી
(C) નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવો હોવાથી
(D) $\text{Na}^+_{(aq)}$ ની રિડક્શન પ્રક્રિયાનો પ્રમાણિત પોટેન્શિયલ ખૂબ ઓછો હોવાથી
92. પિગાળેલ NaCl, CaCl_2 અને AlCl_3 ધરાવતાં વિદ્યુતવિભાજન કોષોને શ્રેણીમાં જોડી તેમાંથી એક સમાન વિદ્યુતજથ્થો પસાર કરતાં વિવિધ કેથોડ પર પ્રાપ્ત થતી ધાતુના મોલનું પ્રમાણ અનુક્રમે આપેલમાંથી કયું છે ?
(A) 1 : 2 : 3 (B) 3 : 2 : 1 (C) 6 : 2 : 3 (D) 6 : 3 : 2
93. આપેલ વિધાનો માટે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો. (સાચાં વિધાન માટે T અને ખોટા વિધાન માટે F છે.)
(i) CuSO_4 ના જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન કોપરના સક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં કરતાં દ્રાવણનો વાદળી રંગ આછો બને છે.
(ii) CuSO_4 ના જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં કરતાં દ્રાવણની pOH વધે છે.
(iii) CuSO_4 ના જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન કોપરના સક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં કરતાં દ્રાવણ બેઝિક બને છે.
(iv) CuSO_4 ના જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં કરતાં કેથોડનું વજન વધે છે.
(A) FTFT (B) TFFT (C) FFFT (D) FTTF
94. KHF_2 અને નિર્જળ HFના મિશ્રણના વિદ્યુતવિભાજનમાં કેથોડ અને એનોડ પર અનુક્રમે કઈ નીપજ મળે છે ?
(A) K અને F_2 (B) K અને H_2 (C) O_2 અને F_2 (D) H_2 અને F_2

95. પિગાળેલ CaCl_2 ના વિદ્યુતવિભાજનમાં 5 ફેરાડે વિદ્યુતભારનો જથ્થો પસાર કરતાં પ્રાયોગિક રીતે કેટલા મોલ Ca ધાતુ કેથોડ પર મળશે ?
 (A) 2.5 મોલ (B) 2.5 મોલ કરતાં ઓછી (C) 2.5 મોલ કરતા વધુ (D) 5 મોલ
96. CuSO_4 , AgNO_3 અને NiSO_4 ના જલીય દ્રાવણ ધરાવતા વિદ્યુતવિભાજન કોષોમાંથી એક સમાન વિદ્યુતભારનો જથ્થો પસાર કરવામાં આવે, તો જુદા જુદા કેથોડ પર મળતી ધાતુઓની મોલ સંખ્યાનું પ્રમાણ અનુક્રમે કેટલું હશે ?
 (A) 2 : 1 : 2 (B) 2 : 2 : 1 (C) 1 : 1 : 2 (D) 1 : 2 : 1
97. ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગના પ્રયોગમાં 4 એમ્પિયર વિદ્યુતપ્રવાહ 2 મિનિટ સુધી પસાર કરતાં m ગ્રામ Ag કેથોડ પર જમા થાય છે. જો 6 એમ્પિર વિદ્યુતપ્રવાહ 40 સેકન્ડ સુધી પસાર કરવામાં આવે, તો કેટલા ગ્રામ Ag જમા થશે ?
 (A) 2 m (B) 4 m (C) $\frac{m}{2}$ (D) $\frac{m}{4}$
98. 1 મોલ $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ નું Cr^{3+} માં રિડક્શન કરવા સૈદ્ધાંતિક રીતે કેટલા ફેરાડે વિદ્યુતજથ્થો જરૂર પડે ?
 (A) 6 (B) 3 (C) 1 (D) 4
99. ફેરાડેના વિદ્યુતવિભાજનના બીજા નિયમ માટે કયો સંબંધ સાચો છે ? જ્યાં m_1 અને m_2 પદાર્થના જથ્થા તથા E_1 અને E_2 અનુક્રમે તે પદાર્થના તુલ્યભાર છે.
 (A) $m_1 E_2 = m_2 E_1$ (B) $m_1 E_1 = m_2 E_2$ (C) $m_1 + m_2 = E_2 + E_1$ (D) $E_1 E_2 = m_1 m_2$
100. કોમિયમ પ્લેટિંગ કરવા માટે ઋણ ધ્રુવ તરીકે 220.0 ગ્રામ આયર્ન પ્લેટ ધરાવતા CrCl_3 ના દ્રાવણમાં 10 એમ્પિયર વિદ્યુત પ્રવાહ 1221 સેકન્ડ સુધી પસાર કરવાથી પ્લેટનું વજન વધીને 221.84 ગ્રામ થાય છે, તો આ વિદ્યુતવિભાજન કોષની ક્ષમતા કેટલી હશે ? (Cr નું પરમાણ્વિક દળ 52 ગ્રામ. મોલ⁻¹ છે.)
 (A) 90.2 % (B) 83.90 % (C) 95 % (D) 63.89 %
101. 1 મોલ MnO_4^- નું Mn^{2+} માં રિડક્શન કરવા સૈદ્ધાંતિક રીતે કેટલા કુલંબ વિદ્યુતભારનો જથ્થો જરૂરી છે ?
 (A) 96500 C (B) 1.93×10^5 C (C) 5.62×10^5 C (D) 4.83×10^5 C
102. 1.0 M AgNO_3 ના 250 મિલિ જલીય દ્રાવણમાંથી બધા જ Ag^+ ના રિડક્શન માટે સૈદ્ધાંતિક રીતે કેટલો વિદ્યુતભારનો જથ્થો જરૂરી છે ?
 (A) 2412.5 C (B) 24125 C (C) 4825 C (D) 25250 C
103. Al^{3+} માંથી જરૂરી વિદ્યુતભારનો જથ્થો પસાર કરતાં કેથોડ પર પ્રાયોગિક રીતે 4.5 ગ્રામ Al ધાતુ જમા થાય છે. તેટલો જ વિદ્યુતભારનો જથ્થો પૂરતી સાંદ્રતા ધરાવતા H^+ (aq) માંથી પસાર કરતાં STPએ હાઈડ્રોજન વાયુનું કદ કેટલું હશે ? (પરમાણ્વિક ભાર Al = 27 ગ્રામ-મોલ⁻¹)
 (A) 44.4 લિટર (B) 222.4 લિટર (C) 11.2 લિટર (D) 5.6 લિટર
104. 2 ગ્રામ Hg કેથોડનો ઉપયોગ કરી CdCl_2 ના વિદ્યુતવિભાજનથી Cd-Hg સંરસ મેળવવામાં આવે છે. કેથોડ પર 20 % Cd ધરાવતા Cd-Hg સંરસ મેળવવા 100 સેકન્ડ માટે સૈદ્ધાંતિક રીતે કેટલા એમ્પિયર વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર કરવો પડશે ? (પરમાણ્વિક ભાર Cd = 112.5 ગ્રામ-મોલ⁻¹)
 (A) 34.32 A (B) 17.16 A (C) 4.29 A (D) 8.58 A

105. Pd ધાતુના અજ્ઞાત ક્ષારના જલીય દ્રાવણમાં 5 A વિદ્યુતપ્રવાહ 2.15 કલાક માટે પસાર કરી વિદ્યુતવિભાજન કરતાં સૈદ્ધાંતિક રીતે કેથોડ પર 10.64 ગ્રામ Pd ધાતુ જમા થાય છે, તો તે ક્ષારમાં Pdની ઓક્સિડેશન અવસ્થા કેટલી હશે ? (પરમાણ્વિય ભાર Pd = 106.4 ગ્રામ-મોલ⁻¹)
- (A) +2 (B) +3 (C) +4 (D) +1
106. MnSO₄ના જલીય દ્રાવણના વિદ્યુતવિભાજનથી MnO₂ની બનાવટ નીચેના સમીકરણ મુજબ કરવામાં આવે છે. જો 25 A વિદ્યુતપ્રવાહ 30 કલાક માટે પસાર કરતાં 1.0 kg MnO₂ મળે, તો વિદ્યુતપ્રવાહની ક્ષમતા કેટલી હશે ? (આણ્વિય ભાર MnO₂ = 87 ગ્રામ-મોલ⁻¹)
- $$\text{Mn}^{2+}_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightarrow \text{MnO}_{2(\text{s})} + 2\text{H}^{+}_{(\text{aq})} + \text{H}_{2(\text{g})}$$
- (A) 82.16 % (B) 20.54 % (C) 25 % (D) 49.2 %
107. 75 % ક્ષમતા ધરાવતા વિદ્યુતવિભાજન કોષમાંથી 15 એમ્પિયર વિદ્યુતપ્રવાહ 2 કલાક સુધી પસાર કરતાં પ્રાયોગિક રીતે કેથોડ વિદ્યુતધ્રુવ પર જમા થતી ધાતુનું વજન ગણો. ધાતુનો વિદ્યુતરાસાયણિક તુલ્યાંક 4.0×10^{-4} ગ્રામ કુલંબ⁻¹ છે.
- (A) 32.4 ગ્રામ (B) 43.2 ગ્રામ (C) 57.6 ગ્રામ (D) 16.2 ગ્રામ
108. પ્લેટિનમ વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં AgNO₃ના જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન કરતાં દ્રાવણમાં AgNO₃ની સાંદ્રતા 4M થી ઘટીને 3M થાય છે. જો આ જ દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન Agના વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં કરવામાં આવે, તો કયું પરિણામ મળે ?
- (A) પરિણામ સમાન રહે. (B) દ્રાવણની સાંદ્રતા વધે.
(C) સાંદ્રતાનો ઘટાડો ઓછો થાય. (D) દ્રાવણની સાંદ્રતામાં કોઈ ફેરફાર ના થાય.
109. ગ્રેફાઈટનો એનોડ અને નિકલ ધાતુનો કેથોડ લઈ 0.5 લિટર 2.0 M Ni(NO₃)₂ના જલીય દ્રાવણમાંથી 9.65 A વિદ્યુતપ્રવાહ 3 કલાક માટે પસાર કરી વિદ્યુતવિભાજન કરવામાં આવે, તો દ્રાવણમાં Ni(NO₃)₂ની સાંદ્રતા સૈદ્ધાંતિક રીતે કેટલી થશે ?
- (A) 0.46 M (B) 1.46 M (C) 0.92 M (D) 0.36 M
110. 4 લિટર 0.8 M AgNO₃ના જલીય દ્રાવણનું નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં 5 એમ્પિયર વિદ્યુતપ્રવાહ 10 કલાક માટે પસાર કરી વિદ્યુતવિભાજન કરવામાં આવે, તો દ્રાવણમાં Ag⁺_(aq)ની સાંદ્રતામાં કેટલો ઘટાડો થશે ? (વિદ્યુતપ્રવાહની ક્ષમતા 80 % છે.)
- (A) 0.466 M (B) 1.865 M (C) 1.492 M (D) 0.373 M
111. પાણીના વિદ્યુતવિભાજન દ્વારા પ્રતિ મિનિટ 100 મિલિ O₂ વાયુ 25° સે તાપમાને અને 1 બાર દબાણે ઉત્પન્ન કરવા કેટલા એમ્પિયર વિદ્યુતપ્રવાહ પાણીમાંથી પસાર કરવો પડશે ? વિદ્યુતપ્રવાહની ક્ષમતા 90 % છે.
(R = 0.08314 $\frac{\text{લિટર.બાર}}{\text{મોલ.કેલ્વિન}}$)
- (A) 23.16 A (B) 14.35 A (C) 28.85 A (D) 31.88 M
112. પિગાળેલા NaClના વિદ્યુતવિભાજનમાં 36.47 ગ્રામ સોડિયમ ધાતુ કેથોડ પર મેળવવા 10 A વિદ્યુતપ્રવાહ કેટલા સમય સુધી પસાર કરવો પડે ? વિદ્યુતપ્રવાહની ક્ષમતા 85 % છે. (પરમાણ્વિય ભાર Na = 23 ગ્રામ-મોલ⁻¹)
- (A) 4.25 કલાક (B) 3.6 કલાક (C) 5 કલાક (D) 4 કલાક
113. નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં 5 લિટર CuSO₄ના જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન 25 A વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર કરતાં દ્રાવણમાં CuSO₄ની મોલારિટી 0.7 M થી ઘટીને 1.2 M થાય છે, તો સૈદ્ધાંતિક રીતે કેટલા સમય સુધી વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર કર્યો હશે ?
- (A) 1.716 કલાક (B) 8.58 કલાક (C) 17.16 કલાક (D) 4.29 કલાક

114. નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં 10 લિટર CuSO_4 ના જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન 20 કલાક સુધી વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર કરી દ્રાવણમાં CuSO_4 ની મોલારિટી 0.7 M થી ઘટીને 0.2 M થાય છે, તો સૈદ્ધાંતિક રીતે કેટલા એમ્પિયર વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર કર્યો હશે ?
- (A) 13.4 A (B) 1.34 A (C) 6.7 A (D) 26.8 A
115. 2 ગ્રામ Hg કેથોડનો ઉપયોગ કરી CdCl_2 ના વિદ્યુતવિભાજનથી Cd-Hg સંરસ મેળવવામાં આવે છે. કેથોડ પર 20 % Hg ધરાવતા Cd-Hg સંરસ મેળવવા 1000 સેકન્ડ માટે સૈદ્ધાંતિક રીતે કેટલા એમ્પિયર વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર કરવો પડશે ? (પરમાણ્વિય ભાર Cd = 112.5 ગ્રામ-મોલ⁻¹)
- (A) 34.32 A (B) 17.16 A (C) 4.29 A (D) 13.72 A
116. ફેરાડેનો વિદ્યુતવિભાજનનો નિયમ કોની સાથે સંબંધિત છે ?
- (A) ધન આયનના પરમાણુ-ક્રમાંક સાથે (B) ઋણ આયનના પરમાણુ-ક્રમાંક સાથે
(C) ધન આયનની ઝડપ સાથે (D) વિદ્યુતવિભાજનના તુલ્યભાર સાથે
117. વિદ્યુતવિભાજનના દ્રાવણમાંથી 1 કુલંબ વિદ્યુતભાર પસાર કરતાં વિદ્યુતધ્રુવ પર જમા થતું દળ કેટલું હોય છે ?
- (A) 1 રાસાયણિક તુલ્યાંક જેટલું (B) 1 પરમાણુભાર જેટલું
(C) 1 ગ્રામ જેટલું (D) 1 વિદ્યુતરાસાયણિક તુલ્યાંક જેટલું
118. વિદ્યુતધ્રુવ પર એક તુલ્યભાર દળ જમા થવા માટે જરૂરી વિદ્યુતભાર કેટલો હશે ?
- (A) 1 કુલંબ (B) 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન પરનો વિદ્યુતભાર
(C) 96500 ફેરાડે વિદ્યુતભાર (D) આપેલ એક પણ નહિ
119. એક પદાર્થનો વિદ્યુતરાસાયણિક તુલ્યાંક 0.0006735 ગ્રામ છે, તો તેનો રાસાયણિક તુલ્યાંક કેટલો હશે ?
- (A) 65 ગ્રામ (B) 0.0007635 ગ્રામ (C) 34.5 ગ્રામ (D) 130 ગ્રામ
120. એક એસિડના જલીય દ્રાવણમાંથી વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર કરતાં એનોડ પર 44800 મિલિ ઓક્સિજન વાયુ ઉત્પન્ન થાય, તે દરમિયાન કેથોડ પર ઉત્પન્ન થતા હાઈડ્રોજન વાયુનું કદ કેટલું હશે ?
- (A) 11200 મિલિ (B) 44800 મિલિ (C) 22400 મિલિ (D) 89600 મિલિ
121. CuSO_4 ના જલીય દ્રાવણમાંથી 2 A વિદ્યુતપ્રવાહ 2 કલાક માટે પસાર કરતાં W ગ્રામ કોપર ધાતુ કેથોડ પર જમા થાય છે, તો તે જ કોષમાંથી જો 4 A વિદ્યુતપ્રવાહ 4 કલાક માટે પસાર કરવામાં આવે, તો કેથોડ પર જમા થતું કોપર ધાતુનું દળ કેટલું હશે ?
- (A) 2W ગ્રામ (B) $\frac{W}{2}$ ગ્રામ (C) 4W ગ્રામ (D) $\frac{W}{4}$ ગ્રામ
122. વિદ્યુતવિભાજન પ્રક્રિયામાં 9650 ઇલેક્ટ્રોન સંકળાય ત્યારે કેથોડ પર જમા થતું ધાતુનું દળ 1.2 ગ્રામ છે, તો તે ધાતુનો રાસાયણિક તુલ્યાંક કેટલો હશે ?
- (A) 24 ગ્રામ/તુલ્ય (B) 0.12 ગ્રામ/તુલ્ય (C) 12 ગ્રામ/તુલ્ય (D) 2.4 ગ્રામ/તુલ્ય
123. 965 સેકન્ડમાં એસિડિક પાણીમાંથી કેથોડ પર STP એ 112 મિલિ ડાયહાઈડ્રોજન વાયુ ભેગો કરવા માટે સૈદ્ધાંતિક રીતે કેટલા એમ્પિયર વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર કરવો પડે ?
- (A) 0.1 A (B) 1.0 A (C) 0.5 A (D) 2.0 A
124. એક ગેલ્વેનિક કોષમાં 1 લિટર 1.0 M CuSO_4 ના જલીય દ્રાવણમાં 100 ગ્રામ દળ ધરાવતો Zn ધાતુનો વિદ્યુતધ્રુવ ડુબાડેલો છે. જો આ કોષ સતત 1.0 A વિદ્યુતપ્રવાહ આપતો હોય, તો તે કેટલા સમય સુધી ચાલુ રહેશે ?
- (A) 26.8 કલાક (B) 53.61 કલાક (C) 82.48 કલાક (D) 33.78 કલાક

125. ધાતુની એક મૂર્તિની સપાટીનું ક્ષેત્રફળ 150 cm^2 છે. તેની સપાટી પર 0.01 mm જાડાઈ ધરાવતું Ag નું સ્તર ચઢાવવા Ag^+ ના જલીય દ્રાવણમાં 15 એમ્પિયર વિદ્યુતપ્રવાહ કેટલા સમય સુધી પસાર કરવો પડે ?

(વિદ્યુતપ્રવાહની ક્ષમતા 90 % છે.) Ag ધાતુની ઘનતા $10.5 \text{ gram.cm}^{-3}$ છે. પરમાણ્વિય ભાર $\text{Ag} = 108 \frac{\text{ગ્રામ}}{\text{મોલ}}$

(A) 227.979 સેકન્ડ (B) 205.1811 સેકન્ડ (C) 253.31 સેકન્ડ (D) 233.45 સેકન્ડ

126. $5 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ ધાતુની 100 લગડીઓ પર 0.01 mm જાડાઈ ધરાવતું સોનાનું સ્તર ચઢાવવા 10 એમ્પિયર વિદ્યુતપ્રવાહ Au^{3+} ના જલીય દ્રાવણમાં કેટલા સમય સુધી પસાર કરવો પડે ? (વિદ્યુતપ્રવાહની ક્ષમતા 80 % છે.)

Au ધાતુની ઘનતા $19.3 \text{ gram.cm}^{-3}$ છે. પરમાણ્વિય ભાર $\text{Au} = 197 \frac{\text{ગ્રામ}}{\text{મોલ}}$

(A) 45393.63 સેકન્ડ (B) 45034.94 સેકન્ડ (C) 52572.23 સેકન્ડ (D) 56748.51 સેકન્ડ

127. એક ચમચા પર પ્લેટિંગ કરવા 0.01 ગ્રામ સિલ્વર ધાતુ વપરાય છે. AgNO_3 વિદ્યુતવિભાજ્ય તરીકે હોય તેવા જલીય દ્રાવણમાં 0.1 A વિદ્યુતપ્રવાહ 27 કલાક પસાર કરવામાં આવે, તો કેટલા ચમચા પર પ્લેટિંગ થાય ?

(પરમાણ્વિય ભાર $\text{Ag} = 108 \text{ ગ્રામ.મોલ}^{-1}$)

(A) 100 (B) 1088 (C) 108 (D) 80

128. 1080 ચમચીઓ પર સિલ્વર પ્લેટિંગ કરવા AgNO_3 ના જલીય દ્રાવણમાં 10 A વિદ્યુતપ્રવાહ કેટલા સમય સુધી પસાર કરવો પડે ? દરેક ચમચી પર 0.02 ગ્રામ સિલ્વર ધાતુનું પ્લેટિંગ કરવામાં આવે છે.

(વિદ્યુતપ્રવાહની ક્ષમતા 90 % છે અને Ag નો પરમાણ્વિય ભાર = 108 ગ્રામ. મોલ $^{-1}$)

(A) 2144 સેકન્ડ (B) 1544 સેકન્ડ (C) 1930 સેકન્ડ (D) 2130 સેકન્ડ

129. એક વિદ્યુતવિભાજન કોષમાંથી 19,3000 કુલંબ વિદ્યુતભારનો જથ્થો પસાર કરતાં સૈદ્ધાંતિક રીતે કેથોડ પર એક ગ્રામ પરમાણુભાર ધાતુ જમા થાય છે, તો તે ધાતુના મોલરભાર (M) અને તુલ્યભાર (Eq) વચ્ચે કયો સંબંધ હશે ?

(A) $M = 2\text{Eq}$ (B) $M = 4\text{Eq}$ (C) $M = \text{Eq}$ (D) $M = 3\text{Eq}$

130. જો AgNO_3 ના જલીય દ્રાવણમાંથી x કુલંબ વિદ્યુતભારનો જથ્થો પસાર કરવામાં આવે, ત્યારે કેથોડ પર સૈદ્ધાંતિક રીતે 3 મોલ Ag ધાતુ જમા થાય, તો જ્યારે $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ ના જલીય દ્રાવણમાંથી x કુલંબ વિદ્યુતભારનો જથ્થો પસાર કરવામાં આવે, ત્યારે કેથોડ પર સૈદ્ધાંતિક રીતે કેટલા મોલ Al ધાતુ જમા થશે ?

(A) 1 મોલ (B) 2 મોલ (C) 9 મોલ (D) 3 મોલ

131. $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ ના જલીય દ્રાવણમાંથી x કુલંબ વિદ્યુતભારનો જથ્થો પસાર કરવામાં છે. વિદ્યુતપ્રવાહની ક્ષમતા 90 % છે, ત્યારે કેથોડ પર પ્રાયોગિક રીતે 3 મોલ Al ધાતુ જમા થાય છે, જો AgNO_3 ના જલીય દ્રાવણમાંથી x કુલંબ વિદ્યુત ભારનો જથ્થો પસાર કરવામાં આવે, ત્યારે વિદ્યુતપ્રવાહની ક્ષમતા 80 % હોય, તો કેથોડ પર પ્રાયોગિક રીતે કેટલા મોલ Ag ધાતુ જમા થશે ?

(A) 7.2 મોલ (B) 10 મોલ (C) 8 મોલ (D) 8.5 મોલ

જવાબો : 83. (B) 84. (D) 85. (B) 86. (C) 87. (C) 88. (B) 89. (B), 90. (D), 91. (D), 92. (D), 93. (A), 94. (D), 95. (B), 96. (D), 97. (C), 98. (A), 99. (A), 100. (B), 101. (D), 102. (B), 103. (D), 104. (D), 105. (C), 106. (A), 107. (A), 108. (D), 109. (C), 110. (D), 111. (C), 112. (C), 113. (B), 114. (A), 115. (D), 116. (D), 117. (D), 118. (B), 119. (A), 120. (D) 121. (A), 122. (C), 123. (A), 124. (B), 125. (C), 126. (D), 127. (B), 128. (A), 129. (A), 130. (A), 131. (C)

● વિદ્યુતકીય અવરોધ

“કોઈ પણ એકસરખા વાહકનો અવરોધ તેની લંબાઈ (l)ના સમપ્રમાણમાં અને તેના આડછેદના ક્ષેત્રફળ(A)ના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે.”

વિદ્યુતકીય અવરોધને R વડે દર્શાવાય છે. તેનો એકમ ઓહમ (Ω) અને તેનું માપન વ્હિસ્ટન બ્રિજ નામના સાધન વડે કરવામાં આવે છે.

$$\therefore R \propto \frac{l}{A} \text{ જ્યાં } R = \text{અવરોધ, } l = \text{લંબાઈ, } A = \text{આડછેદનું ક્ષેત્રફળ}$$

$\therefore R = \rho \left(\frac{l}{A} \right)$ જ્યાં ρ = અવરોધકતા (વિશિષ્ટ અવરોધ) અને તેનો SI એકમ ઓહમ મીટર (Ωm) છે. તેને સામાન્ય રીતે ઓહમ સેમી (Ωcm)માં દર્શાવાય છે.

અવરોધકતા (વિશિષ્ટ અવરોધ) : એકમ લંબાઈ 1 મીટર અને એકમ આડછેદનું ક્ષેત્રફળ 1 ચોરસ મીટર ધરાવતા વાહકના અવરોધને તેની અવરોધકતા (વિશિષ્ટ અવરોધ) કહે છે.

અવરોધકતાનો SI એકમ ઓહમ મીટર (Ωm) છે. તેને સામાન્ય રીતે ઓહમ સેમી (Ωcm)માં દર્શાવાય છે.

$$1 \Omega m = 100 \Omega cm$$

વાહકતા : અવરોધ R ના વ્યસ્તને વાહકતા G કહે છે. $G = \frac{1}{R}$ આથી $G = \frac{A}{\rho \cdot l}$ ($\because R = \rho \left(\frac{l}{A} \right)$)

$$\therefore G = K \cdot \frac{A}{l} \text{ જ્યાં } K = \frac{1}{\rho} = \text{વિશિષ્ટ વાહકતા}$$

વાહકતાનો SI એકમ સિમેન્સ (S) છે. વાહકતાનો સામાન્ય એકમ ઓહમ⁻¹ અથવા મ્હો (Ω^{-1} અથવા Ω) છે.

વિશિષ્ટ વાહકતા : એકમ લંબાઈ (1 સેમી) અને એકમ આડછેદનું ક્ષેત્રફળ (1 ચોરસ સેમી) ધરાવતા વાહકની વાહકતાને તેની વિશિષ્ટ વાહકતા કહે છે અથવા અવરોધકતાના વ્યસ્તને તે વાહકની વિશિષ્ટ વાહકતા કહે છે.

વિશિષ્ટ વાહકતા (K) = $G \times \frac{l}{A}$ નો એકમ : મ્હો. સેમી⁻¹ (Ωcm^{-1}) SI એકમ : સિમેન્સ મીટર⁻¹ (Sm^{-1}).

કોષ-અચળાંક : વિશિષ્ટ વાહકતાના સૂત્ર ($K = G \times \frac{l}{A}$)માં આવતા $\frac{l}{A}$ ના મૂલ્યને વાહકતા માપવાના સાધનનો (વાહકતાકોષનો) કોષ-અચળાંક કહે છે. કોષ-અચળાંકનો એકમ : સેમી⁻¹(cm^{-1}) SI એકમ : મીટર⁻¹ (m^{-1}) છે.

ધાત્વીય વાહકોમાં વિદ્યુતનું વહન ધાતુ પરમાણુની બાહ્ય કક્ષામાં (અથવા વાહકતા પટમાં) રહેલા ઈલેક્ટ્રોન દ્વારા થાય છે.

વિદ્યુતવિભાજ્યનાં દ્રાવણોમાં વિદ્યુતનું વહન આયનો દ્વારા થાય છે.

ધાતુમાં વિદ્યુતવહન દરમિયાન કોઈ રાસાયણિક ફેરફાર થતો નથી.

ધાતુમાં વિદ્યુતવહન દરમિયાન ભૌતિક ફેરફારમાં તેના તાપમાનમાં વધારો થાય છે.

મોલરવાહકતા (Λ_m) : એક બીજાથી 1 સેમી અંતરે A ક્ષેત્રફળ ધરાવતા બે વિદ્યુતધ્રુવો (પ્લેટ) વચ્ચે 1 મોલ વિદ્યુતવિભાજ્ય ધરાવતા દ્રાવણની વાહકતાને મોલરવાહકતા કહે છે.

ધારો કે બે પ્લેટો(વિદ્યુતધ્રુવો) વચ્ચે ભરેલ V લિટર દ્રાવણ 1 મોલ વિદ્યુતવિભાજ્ય ધરાવે છે, માટે તે દ્રાવણની મોલારિટી

$$M = \frac{1}{V} \text{ થશે. આથી } V = \frac{1}{M}.$$

$G = K \cdot \frac{A}{l}$ જ્યાં $l = 1$ સેમી અને $A = V$ થશે $G = K \cdot V$ જ્યાં વ્યાખ્યા મુજબ $G = \Lambda_m$ થશે.

$$\therefore \Lambda_m = K \cdot V$$

$\therefore \Lambda_m = \frac{K}{M}$ (જો દ્રાવણની મોલારિટી M હોય, તો M મોલ $\equiv 1$ લિટર દ્રાવણ. આથી 1 મોલ $\equiv \frac{1}{M}$ લિટર દ્રાવણ થશે.)

$$M = \frac{\text{મોલ}}{\text{લિટર}} = \frac{M \text{ મોલ}}{(\text{સીમીટર})^3} = \frac{M \text{ મોલ}}{(1000 \text{ સેમી})^3}$$

$$\Lambda_m = \frac{K}{M} = \frac{K}{\frac{M \text{ મોલ}}{(1000 \text{ સેમી})^3}} = \frac{(1000 \text{ સેમી})^3 \times K \text{ મો. સેમી}^{-1}}{M \text{ મોલ}} = \frac{1000 \times K}{M} \text{ મો. (સેમી)}^2 \text{ મોલ}^{-1}$$

અથવા સિમેન્સ (સેમી)² મોલ⁻¹ $K =$ વિશિષ્ટ વાહકતા

$$1 \text{ સિમેન્સ (મીટર)}^2 \text{ મોલ}^{-1} = 10^4 \text{ સિમેન્સ (સેમી)}^2 \text{ મોલ}^{-1}$$

$$\text{તુલ્યવાહકતા } (\Lambda) = \frac{1000 \times K}{\text{નોર્માલિટી (N)}} \text{ એકમ : મો. (સેમી)}^2 \text{ તુલ્ય}^{-1}, \text{ SI એકમ : મો. (મીટર)}^2 \text{ તુલ્ય}^{-1}$$

જ્યારે વિદ્યુતવિભાજનના જલીય દ્રાવણને પાણી ઉમેરીને મંદ કરવામાં આવે છે ત્યારે તેમાં એકમ કદ દીઠ વિદ્યુતનું વહન કરી શકે તેવાં આયનોની સંખ્યા ઘટવાથી દ્રાવણની વિશિષ્ટ વાહકતા ઘટે છે. જ્યારે દ્રાવણ મંદ થવાને કારણે વિદ્યુતવિભાજનનું વિયોજન વધવાથી એક મોલ દીઠ વિદ્યુતનું વહન કરી શકે તેવાં આયનોની સંખ્યા વધવાથી મોલર વધવાથી વધે છે.

સુપરકન્ડક્ટર (અતિસુવાહકો) : જેમની અવરોધકતા શૂન્ય હોય અને વાહકતા ખૂબ જ હોય તેવા વાહક પદાર્થોને અતિ સુવાહકો (સુપરકન્ડક્ટર) કહે છે.

નીચા તાપમાને (0 થી 15 K) ધાતુઓ અને તેમની મિશ્રધાતુઓ અતિસુવાહક (સુપરકન્ડક્ટર) તરીકે વર્તે છે. ઊંચા તાપમાને (150 K) ઘણાં બધાં સિરામિક્સ દ્રવ્યો અને મિશ્રિત ઓક્સાઇડ અતિસુવાહક (સુપરકન્ડક્ટર) તરીકે વર્તે છે.

દ્રાવણની વાહકતા મુખ્યત્વે તેમાં રહેલાં આયનોને કારણે હોય છે. તેને આયોનિક વાહકતા કહે છે.

આયનોની વાહકતાનો આધાર નીચેનાં પરિબળો ઉપર રહેલો છે :

(1) ઉમેરેલા વિદ્યુતવિભાજનની પ્રકૃતિ (2) વિદ્યુતવિભાજનની સાંદ્રતા (3) તાપમાન (4) સ્નિગ્ધતા (5) દ્રાવકની પ્રકૃતિ (6) ઉત્પન્ન થયેલાં આયનોના કદ અને તેના સોલ્વેશન

132. આપેલ ધાતુઓ માટે વિશિષ્ટ વાહકતાનો સાચો ક્રમ કયો છે ?

(A) $\text{Cu} > \text{Ag} > \text{Au} > \text{Na} > \text{Fe}$

(B) $\text{Ag} > \text{Cu} > \text{Au} > \text{Fe} > \text{Na}$

(C) $\text{Ag} > \text{Cu} > \text{Au} > \text{Na} > \text{Fe}$

(D) $\text{Ag} > \text{Au} > \text{Cu} > \text{Fe} > \text{Na}$

133. નિયત તાપમાને x મો (સેમી)⁻¹ વિશિષ્ટ વાહકતા ધરાવતા KClના એક જલીય દ્રાવણનો અવરોધ માપતા $y\Omega$ મળે છે, જો તે જ સાધનથી NaClના જલીય દ્રાવણનો અવરોધ $z\Omega$ મળે, તો આ દ્રાવણની વિશિષ્ટ વાહકતા કેટલી થાય ?

(A) $\frac{yz}{x}$ મો (સેમી)⁻¹

(B) $\frac{xy}{z}$ મો (સેમી)⁻¹

(C) $\frac{xz}{y}$ મો (સેમી)⁻¹

(D) $\frac{x}{yz}$ મો (સેમી)⁻¹

134. એક વિદ્યુતવિભાજ્યના 0.2 M સાંદ્રતા ધરાવતા જલીય દ્રાવણનો અવરોધ અને વિશિષ્ટ વાહકતા અનુક્રમે 50Ω અને 1.3 Sm^{-1} છે. જો તે જ વિદ્યુતવિભાજ્યના 0.4 M જલીય દ્રાવણનો અવરોધ 260Ω હોય, તો તેની મોલર વાહકતા કેટલી થાય ?
 (A) $6.25 \times 10^{-4} \text{ Sm}^2\text{mol}^{-1}$ (B) $625 \text{ Sm}^2\text{mol}^{-1}$ (C) $62.5 \text{ Sm}^2\text{mol}^{-1}$ (D) $6.25 \times 10^{-2} \text{ Sm}^2\text{mol}^{-1}$
135. $\frac{N}{50}$ KClનું દ્રાવણ ધરાવતા કોષનો અવરોધ અને વિશિષ્ટ વાહકતા અનુક્રમે 400Ω અને $0.002765 \text{ મો. S}\cdot\text{cm}^{-1}$ છે, તો તે કોષનો કોષ-અચળાંક કેટલો હશે ?
 (A) 6.91 cm^{-1} (B) 1.106 cm^{-1} (C) 14.46 cm^{-1} (D) 2.212 cm^{-1}
136. 18° સે તોપમાને $\frac{N}{10}$ KClનું દ્રાવણ ધરાવતા વાહકતાકોષની વિશિષ્ટવાહકતા $1.12 \times 10^{-2} \text{ S}\cdot\text{cm}^{-1}$ અને અવરોધ 65Ω હોય, તો તે કોષનો કોષ-અચળાંક કેટલો થાય ?
 (A) 0.728 cm^{-1} (B) 0.580 cm^{-1} (C) 0.172 cm^{-1} (D) 0.0172 cm^{-1}
137. 10Ω અવરોધ ધરાવતા વાયરને 20 V વિદ્યુતસ્થિતિમાનનો તફાવત 2 મિનિટ માટે આપતા પસાર થતો વિદ્યુતભારનો જથ્થો કેટલો હશે ?
 (A) 120 C (B) 240 C (C) 20 C (D) 4 C
138. $2.5 \text{ Sm}^{-1} = \dots\dots\dots \text{ Scm}^{-1}$
 (A) 250 (B) 25 (C) 0.025 (D) 0.25
139. પ્રચલિત સંજ્ઞા પદ્ધતિ અનુસાર $\frac{l}{AR} = \dots\dots\dots$
 (A) ρ (B) $K\cdot G$ (C) G (D) $\frac{1}{\rho}$
140. અગાઉ ધાતુઓ અને મિશ્ર ધાતુઓ કયા તાપમાને અતિસુવાહક (સુપરકન્ડક્ટર) તરીકે કહેવામાં આવતી હતી ?
 (A) 150 K (B) -273° સે થી -288° સે (C) 0° સે 15° સે (D) 0 K થી 15 K
141. 150 K તાપમાને કયા પદાર્થો અતિસુવાહક (સુપરકન્ડક્ટર) તરીકે જાણીતા છે ?
 (A) ધાતુઓ (B) મિશ્ર ધાતુઓ
 (C) સિરામિક પદાર્થો અને મિશ્રિત ઓક્સાઇડ (D) પ્લાસ્ટિક
142. ઓરડાના તાપમાને આપેલ પૈકી કોની વાહકતા સૌથી વધુ હશે ?
 (A) 0.1 M HCl (B) 0.1 M NaCl (C) ટેફલોન (D) કાંચ
143. આપેલમાંથી કયો પદાર્થ અર્ધવાહક છે ?
 (A) ટેફલોન (B) CuO (C) કાચ (D) Cu_2O

જવાબો : 132. (C) 133. (B) 134. (A) 135. (B) 136. (B) 137. (B), 138. (C), 139. (D),
 140. (D), 141. (C), 142. (A), 143. (B)

કોહ્લરોશનો આયનોના સ્વતંત્ર અભિગમનનો સિદ્ધાંત : વિદ્યુતવિભાજ્યની અનંત મંદને મોલરવાહકતા (Λ^0) તેમાં રહેલા ધન આયન અને ઋણ આયનની અનંત મંદને મોલરવાહકતા (λ^0_+ અથવા λ^0_-)ના સરવાળા બરાબર હોય છે.

● પ્રબળ વિદ્યુતવિભાજ્યના જલીય દ્રાવણની મોલરવાહકતા માટે ડી-બાય હકલ અને ઓન્સેજર સમીકરણ

$\Lambda_m = \Lambda_m^0 - \Lambda \cdot \sqrt{C}$ જ્યાં Λ_m = આપેલ સાંદ્રતા માટે મોલર વાહકતા, Λ_m^0 = સીમિત મોલર વાહકતા (અનંત મંદને મોલરવાહકતા)

પ્રબળ વિદ્યુતવિભાજ્યના જલીય દ્રાવણ માટે $\Lambda_m \rightarrow \sqrt{C}$ નો આલેખ સીધી રેખા મળે છે. આલેખના ઢાળનું મૂલ્ય $-\Lambda$ જેટલું હોય છે અને

આંતરછેદ (Y-અંતઃખંડ)નું મૂલ્ય Λ_m^0 જેટલું હોય છે.

Aનો આધાર વિદ્યુતવિભાજ્યનો પ્રકાર અને તાપમાન પર છે.

એક જ પ્રકારના પ્રબળ વિદ્યુતવિભાજ્યો માટે Aનું મૂલ્ય સમાન હોય છે. (દ્રાવક અને તાપમાન સમાન હોય ત્યારે)

નિર્બળ વિદ્યુતવિભાજ્યના જલીય દ્રાવણ માટે $\Lambda_m \rightarrow \sqrt{C}$ નો આલેખ રેખા મળતો નથી પણ વક્ર મળે છે. માટે $\Lambda_m \rightarrow \sqrt{C}$ આલેખ પરથી પ્રબળ વિદ્યુતવિભાજ્યના જલીય દ્રાવણોની અનંત મંદને મોલરવાહકતા (Λ_m^0) શોધી શકાય છે પણ નિર્બળ વિદ્યુતવિભાજ્યનાં જલીય દ્રાવણોની અનંત મંદને મોલરવાહકતા (Λ_m^0) શોધી શકાતી નથી.

KCl, NaCl, CsCl ... વગેરે 1 : 1 પ્રકારના વિદ્યુતવિભાજ્ય પદાર્થ છે.

CuSO₄, ZnSO₄, FeSO₄ વગેરે 2 : 2 પ્રકારના વિદ્યુતવિભાજ્ય પદાર્થ છે.

CaCl₂, MgBr₂, વગેરે 2 : 1 પ્રકારના વિદ્યુતવિભાજ્ય પદાર્થ છે. (સંયોજકતાના આધારે)

ઓસ્વાલ્ડનો મંદનનો નિયમ : પ્રબળ વિદ્યુતવિભાજ્ય કરતાં નિર્બળ વિદ્યુતવિભાજ્યના જલીય દ્રાવણને પાણી ઉમેરીને મંદ કરવામાં આવે, તો મોલર વાહકતામાં થતો વધારે વિશેષ હોય છે. કારણ કે પ્રબળ વિદ્યુતવિભાજ્ય કરતાં નિર્બળ વિદ્યુત- વિભાજ્યના જલીય દ્રાવણને પાણી ઉમેરીને મંદ કરવામાં આવે ત્યારે વિયોજનમાં થતો વધારો વિશેષ હોય છે.

કોહ્લરોશના નિયમની ઉપયોગિતા : નિર્બળ વિદ્યુતવિભાજ્યની અનંત મંદને મોલરવાહકતા (Λ^0) યોગ્ય પ્રબળ વિદ્યુતવિભાજ્યોની અનંત મંદને મોલરવાહકતા (Λ^0) મેળવીને તેમનાં બૈજિક સરવાળા કરીને શોધી શકાય છે. દા.ત., કે નિર્બળ વિદ્યુતવિભાજ્ય CH₃COOHની અનંત મંદને મોલર વાહકતા (Λ^0) CH₃COONa, HCl અને NaCl જેવા પ્રબળ વિદ્યુતવિભાજ્યની અનંત મંદને મોલરવાહકતા (Λ^0) નક્કી કરીને નીચે પ્રમાણે ગણતરી કરીને શોધી શકાય છે :

$$\begin{aligned}\Lambda_{CH_3COOH}^0 &= \Lambda_{CH_3COONa}^0 + \Lambda_{HCl}^0 - \Lambda_{NaCl}^0 \text{ કારણ કે કોહ્લરોશના નિયમ મુજબ} \\ \Lambda_{CH_3COONa}^0 + \Lambda_{HCl}^0 - \Lambda_{NaCl}^0 &= (\lambda_{CH_3COO^+}^0 + \lambda_{Na^+}^0) + (\lambda_{H^+}^0 + \lambda_{Cl^-}^0) - (\lambda_{Na^+}^0 + \lambda_{Cl^-}^0) \\ &= \lambda_{CH_3COO^+}^0 + \lambda_{Na^+}^0 + \lambda_{H^+}^0 + \lambda_{Cl^-}^0 - \lambda_{Na^+}^0 - \lambda_{Cl^-}^0 \\ &= \lambda_{CH_3COO^+}^0 + \lambda_{H^+}^0 = \Lambda_{CH_3COOH}^0\end{aligned}$$

144. $\Lambda_{\text{mMg}^{2+}}^0 = 106 \text{ S cm}^2\text{mol}^{-1}$, $\Lambda_{\text{mCa}^{2+}}^0 = 119 \text{ S cm}^2\text{mol}^{-1}$, $\Lambda_{\text{mCl}^-}^0 = 76.3 \text{ S cm}^2\text{mol}^{-1}$, $\Lambda_{\text{mSO}_4^{2-}}^0 = 160 \text{ S cm}^2\text{mol}^{-1}$ સમૂહ-1માં આપેલ સંયોજન અને સમૂહ-2માં આપેલ અનંતમંદને મોલરવાહકતા માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો.

સમૂહ-1 સંયોજન	સમૂહ-2 $\Lambda_{\text{m}}^0 \text{ S}\cdot\text{cm}^2\cdot\text{mol}^{-1}$
(i) MgSO_4	(A) 195.3 (E) 182.3
(ii) CaCl_2	(B) 279 (F) 266
(iii) MgCl_2	(C) 186 (G) 219.5
(iv) CaSO_4	(D) 271.6 (H) 258.6

(A) (i)-(C), (ii)-(D), (iii)-(H), (iv)-(B)

(B) (i)-(F), (ii)-(A), (iii)-(E), (iv)-(G)

(C) (i)-(F), (ii)-(D), (iii)-(H), (iv)-(B)

(D) (i)-(C), (ii)-(G), (iii)-(A), (iv)-(E)

145. $\frac{1}{3} \Lambda_{\text{mAl}^{3+}}^0 = 63 \text{ S cm}^2\text{mol}^{-1}$, $\frac{1}{2} \Lambda_{\text{mMg}^{2+}}^0 = 53 \text{ S cm}^2\text{mol}^{-1}$, $\Lambda_{\text{mOH}^-}^0 = 199.1 \text{ S cm}^2\text{mol}^{-1}$, $\frac{1}{2} \Lambda_{\text{mSO}_4^{2-}}^0 = 80 \text{ S cm}^2\text{mol}^{-1}$ સમૂહ-1માં આપેલ સંયોજન અને સમૂહ-2 આપેલ અનંતમંદને મોલરવાહકતા માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો.

સમૂહ-1 સંયોજન	સમૂહ-2 $\Lambda_{\text{m}}^0 \text{ S}\cdot\text{cm}^2\cdot\text{mol}^{-1}$
(i) MgSO_4	(A) 504.2 (E) 786.3
(ii) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$	(B) 133 (F) 451.2
(iii) $\text{Mg}(\text{OH})_2$	(C) 266 (G) 858
(iv) $\text{Al}(\text{HO})_3$	(D) 660.3 (H) 366

(A) (i)-(C), (ii)-(D), (iii)-(H), (iv)-(B)

(B) (i)-(F), (ii)-(A), (iii)-(E), (iv)-(G)

(C) (i)-(F), (ii)-(D), (iii)-(H), (iv)-(B)

(D) (i)-(C), (ii)-(G), (iii)-(A), (iv)-(E)

146. આપેલ કયા સંયોજન માટે મોલરવાહકતા અને $(\text{મોલારિટી})^{\frac{1}{2}}$ નો આલેખ સીધી રેખા મળે છે ?

(A) CsCl

(B) NH_4OH

(C) HCOOH

(D) આપેલ ત્રણેય માટે

147. $\Lambda_{\text{m}} = \Lambda_{\text{m}}^0 - A \cdot C^{\frac{1}{2}}$ કયા સંયોજનને લાગુ પડે છે ?

(A) NaCl

(B) NH_4OH

(C) HCOOH

(D) HCN

148. આપેલમાંથી કોની અનંતમંદને તુલ્યવાહકતા સૌથી વધારે છે ?

(A) $\text{K}^+_{(\text{aq})}$

(B) $\text{Na}^+_{(\text{aq})}$

(C) $\text{Cs}^+_{(\text{aq})}$

(D) $\text{Rb}^+_{(\text{aq})}$

149. એક પ્રબળ વિદ્યુતવિભાજ્ય માટે $C = 0.04 \text{ M}$ હોય, ત્યારે $\Lambda_{\text{m}} = 250 \text{ S cm}^2\text{mol}^{-1}$ છે અને $C = 0.09 \text{ M}$ હોય ત્યારે $\Lambda_{\text{m}} = 200 \text{ S cm}^2\text{mol}^{-1}$ છે તો તે વિદ્યુતવિભાજ્ય માટે Λ અને Λ_{m}^0 અનુક્રમે કેટલા હશે ?

(A) 550, 265 $\text{S cm}^2\text{mol}^{-1}$

(B) 450, 365 $\text{S cm}^2\text{mol}^{-1}$

(C) 500, 350 $\text{S cm}^2\text{mol}^{-1}$

(D) 340, 450 $\text{S cm}^2\text{mol}^{-1}$

150. આપેલમાંથી કયા વિકલ્પના બધા જ વિદ્યુતવિભાજ્યોના જલીય દ્રાવણ માટે $\Lambda_m \rightarrow \sqrt{C}$ ના આલેખનો ઢાળ સમાન હોય છે.
- (i) NaCl (ii) NH_4OH (iii) KNO_3 (iv) HCOOH (v) KBr (vi) HCN (vii) CaCl_2 (viii) FeCl_3
- (A) (i), (v), (vi) (B) (iii), (viii) (C) (i), (iii), (v) (D) (ii), (iv), (viii)
151. A_2B , X_3Y_2 અને A_3Y માટે Λ_m^0 નાં મૂલ્યો અનુક્રમે 2.4, 1.5 અને 1.8 મ્હો (સેમી)² મોલ⁻¹ હોય, તો XB માટે Λ_m^0 નું મૂલ્ય કયું હશે ?
- (A) 1.7 મ્હો (સેમી)² મોલ⁻¹ (B) 8.1 મ્હો (સેમી)² મોલ⁻¹
- (C) 2.1 મ્હો (સેમી)² મોલ⁻¹ (D) 0.7 મ્હો (સેમી)² મોલ⁻¹
152. $\Lambda_{\text{KCl}}^0 - \Lambda_{\text{NaCl}}^0 = 23.4$ મ્હો (સેમી)² મોલ⁻¹ અને $\Lambda_{\text{NaBr}}^0 - \Lambda_{\text{NaCl}}^0 = 1.8$ મ્હો (સેમી)² મોલ⁻¹, તો NaCl, KCl, NaBr અને KBrની અનંત મંદને મોલરવાહકતા (Δ_m^0)નો ચઢતો ક્રમ આપેલમાંથી કયો સાચો છે ?
- (A) $\text{NaCl} < \text{KCl} < \text{NaBr} < \text{KBr}$ (B) $\text{NaCl} < \text{NaBr} < \text{KCl} < \text{KBr}$
- (C) $\text{KBr} < \text{NaCl} < \text{NaBr} < \text{KCl}$ (D) $\text{KCl} < \text{NaCl} < \text{NaBr} < \text{KBr}$
153. એક પ્રબળ વિદ્યુતવિભાજ્ય માટે $C = 0.01 \text{ M}$ હોય ત્યારે $\Lambda_m = 255 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ છે અને $C = 0.04 \text{ M}$ હોય ત્યારે $\Lambda_m = 200 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ છે, તો $C = 0.09 \text{ M}$ હોય ત્યારે Λ_m કેટલી હશે ?
- (A) $400 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ (B) $145 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ (C) $150 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ (D) $250 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$
154. LiCl, NaCl અને KCl માટે અનંત મંદને મોલરવાહકતાને ચઢતો ક્રમ કયો સાચો છે ?
- (A) $\text{KCl} < \text{NaCl} < \text{LiCl}$ (B) $\text{LiCl} < \text{NaCl} < \text{KCl}$
- (C) $\text{LiCl} < \text{KCl} < \text{NaCl}$ (D) $\text{NaCl} < \text{KCl} < \text{LiCl}$
155. 5.4 cm^2 ક્ષેત્રફળ ધારવતા અને 1.8 cm અંતરે રહેલા બે પ્લેટિનમ ધ્રુવો વચ્ચે ઉદ્ભવતા કદમાં રહેલા એક ક્ષારના ડેસિનોર્મલ ($\frac{\text{N}}{10}$) દ્રાવણનો અવરોધ 32Ω હોય, તો તે દ્રાવણની તુલ્યવાહકતા કેટલી હશે ? (જલીય દ્રાવણ માટે)
- (A) $104.17 \text{ S cm}^2 \text{ ગ્રામતુલ્ય}^{-1}$ (B) $10.41 \text{ S cm}^2 \text{ ગ્રામતુલ્ય}^{-1}$
- (C) $1.0417 \text{ S cm}^2 \text{ ગ્રામતુલ્ય}^{-1}$ (D) $1041.0 \text{ S cm}^2 \text{ ગ્રામતુલ્ય}^{-1}$
156. 298 K તાપમાને 0.05 M KOHના જલીય દ્રાવણનો અવરોધ 31.6Ω છે. જો કોષાયનાંક 0.367 cm^{-1} હોય, તો KOHના તે દ્રાવણની તુલ્યવાહકતા (મોલરવાહકતા) કેટલી હશે ?
- (A) $0.2322 \text{ S cm}^2 \text{ ગ્રામતુલ્ય}^{-1}$ (B) $2.322 \text{ S cm}^2 \text{ ગ્રામતુલ્ય}^{-1}$
- (C) $23.22 \text{ S cm}^2 \text{ ગ્રામતુલ્ય}^{-1}$ (D) $232.28 \text{ S cm}^2 \text{ ગ્રામતુલ્ય}^{-1}$
157. 1.5 cm અંતરે મૂકેલા અને 10 cm^2 ક્ષેત્રફળ ધરાવતાં બે પ્લેટિનમ ધ્રુવો વચ્ચે ભરેલા 0.05 M દ્રાવણનો અવરોધ 50Ω છે, તો આ દ્રાવણની મોલરવાહકતા કેટલી હશે ?
- (A) $66.6 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ (B) $15 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ (C) $60 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ (D) $6.66 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$

158. 0.01 M સાંદ્રતા ધરાવતા એક નિર્બળ એસિડની મોલરવાહકતા કરતા અનંત મંદને મોલરવાહકતા 100 ગણી છે, તો તે નિર્બળ એસિડનો વિયોજનઅંશ (a) કેટલો હશે ?
- (A) 0.1 (B) 0.001 (C) 10 (D) 0.01
159. $\Lambda_{\text{mAg}^+}^0 = 5.0 \times 10^{-3} \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ હોય, તો અનંત મંદને Ag^+ ની આયોનિક વહનશીલતા કેટલી થાય ?
- (A) $5.2 \times 10^{-8} \frac{\text{cm} \cdot \text{sec}^{-1}}{\text{V} \cdot \text{cm}^{-1}}$ (B) $2.4 \times 10^{-8} \frac{\text{cm} \cdot \text{sec}^{-1}}{\text{V} \cdot \text{cm}^{-1}}$
- (C) $1.52 \times 10^{-8} \frac{\text{cm} \cdot \text{sec}^{-1}}{\text{V} \cdot \text{cm}^{-1}}$ (D) $8.25 \times 10^{-8} \frac{\text{cm} \cdot \text{sec}^{-1}}{\text{V} \cdot \text{cm}^{-1}}$
160. $\Lambda_{\text{ClCH}_2\text{COONa}}^0 = 224 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$, $\Lambda_{\text{NaCl}}^0 = 38.2 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ અને $\Lambda_{\text{HCl}}^0 = 203 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ હોય, તો $\Lambda_{\text{ClCH}_2\text{COONa}}^0$ નું મૂલ્ય કેટલું થાય ?
- (A) $288.5 \text{ S cm}^2 \text{ ગ્રામતુલ્ય}^{-1}$ (B) $289.5 \text{ S cm}^2 \text{ ગ્રામતુલ્ય}^{-1}$
- (C) $388.8 \text{ S cm}^2 \text{ ગ્રામતુલ્ય}^{-1}$ (D) $59.5 \text{ S cm}^2 \text{ ગ્રામતુલ્ય}^{-1}$
161. 298 K તાપમાને એક નિર્બળ વિદ્યુતવિભાજ્યનો આયનીકરણ અચળાંક 2.5×10^{-5} છે અને તેના 0.01 M સાંદ્રતા ધરાવતા દ્રાવણની મોલરવાહકતા $19.6 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ હોય, તો તેની અનંત મંદને મોલરવાહકતા લગભગ કેટલી થાય ?
- (A) $250 \text{ S cm}^2 \text{ ગ્રામતુલ્ય}^{-1}$ (B) $196 \text{ S cm}^2 \text{ ગ્રામતુલ્ય}^{-1}$
- (C) $402 \text{ S cm}^2 \text{ ગ્રામતુલ્ય}^{-1}$ (D) $384 \text{ S cm}^2 \text{ ગ્રામતુલ્ય}^{-1}$
162. 300 K તાપમાને 0.001028 M એસિટિક એસિડના જલીય દ્રાવણની વિશિષ્ટ વાહકતા $4.95 \times 10^{-5} \text{ S cm}^2$ અને સીમિત મોલરવાહક $390 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ હોય, તો એસિટિક એસિડનો વિયોજન અચળાંક કેટલો હશે ?
- (A) $1.75 \times 10^{-6} \text{ M}$ (B) $1.78 \times 10^{-5} \text{ M}$ (C) $3.5 \times 10^{-4} \text{ M}$ (D) $3.5 \times 10^{-6} \text{ M}$
163. 298 K તાપમાને HClના જલીય દ્રાવણની અનંત મંદને તુલ્યવાહકતા $425 \frac{\text{S} \cdot \text{cm}^2}{\text{Eq}}$ અને વિશિષ્ટ વાહકતા $3.825 \frac{\text{S}}{\text{cm}}$ છે. જો દ્રાવણમાં HClનું 90 % વિયોજન થયું હોય, તો દ્રાવણમાં HClની નોર્માલિટી કેટલી હશે ?
- (A) 10.0 N (B) 1.0 N (C) 1.2 N (D) 0.9 N
164. વિદ્યુતવિભાજ્યના જલીય દ્રાવણને પાણી ઉમેરીને મંદ કરતા વિશિષ્ટ વાહકતા અને મોલર વાહકતામાં અનુક્રમે શું ફેરફાર થાય ?
- (A) બંને વધે. (B) બંને ઘટે. (C) ઘટે અને વધે. (D) વધે અને ઘટે.
165. નિયત તાપમાને વિદ્યુતવિભાજ્યના જલીય દ્રાવણમાં પાણી ઉમેરીને તેના કદમાં વધારો કરતા તેની મોલર વાહકતા વધે છે. કારણ કે....
- (A) આયનોની સંખ્યા ઘટે છે. (B) વિદ્યુતવિભાજ્યનો વિયોજન-અંશ ઘટે છે.
- (C) આયનો વચ્ચેનું અંતર વધે છે. (D) વિદ્યુતનું વહન કરતાં આયનોની સંખ્યા વધે છે.
166. જો આપેલ દ્રાવણની મોલર વાહકતા $1.26 \times 10^{-4} \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ અને મોલારિટી 0.01 M હોય તો, તેની વિશિષ્ટ વાહકતા કેટલી હશે ?
- (A) $1.26 \times 10^{-25} \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ (B) $1.26 \times 10^{-5} \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$
- (C) $1.26 \times 10^{-4} \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ (D) $0.00063 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$



167. 0.1 M NaClના જલીય દ્રાવણમાં 0.1 M KClનું દ્રાવણ ઉમેરવામાં આવે, તો દ્રાવણની આણ્વિયવાહકતા
 (A) અચળ રહેશે. (B) વધે છે.
 (C) ઘટે છે. (D) શરૂઆતમાં વધે પછી ઘટે છે.
168. અચળ તાપમાને સલ્ફ્યુરિક એસિડના એક જલીય દ્રાવણની મોલર વાહકતા $150 \frac{\text{S.cm}^2}{\text{mol}}$ હોય, તો દ્રાવણની તુલ્યવાહકતા કેટલી હશે ?
 (A) $75 \frac{\text{S.cm}^2}{\text{Eq}}$ (B) $150 \frac{\text{S.cm}^2}{\text{Eq}}$ (C) $300 \frac{\text{S.cm}^2}{\text{Eq}}$ (D) આપેલ એક પણ નહિ.
169. NaClની તુલ્યવાહકતા C સાંદ્રણે અને અનંત મંદતાએ અનુક્રમે λ_c અને λ_∞ છે. નીચે આપેલા પૈકી કયો સંબંધ λ_c અને λ_∞ માટે સાચો છે ? (જ્યાં અચળાંક B ધન છે.)
 (A) $\lambda_c = \lambda_\infty + (B)\sqrt{C}$ (B) $\lambda_c = \lambda_\infty + (B)C$ (C) $\lambda_c = \lambda_\infty + (B)C$ (D) $\lambda_c = \lambda_\infty - (B)\sqrt{C}$
170. 0.2 M વિદ્યુતવિભાજ્ય દ્રાવણનો અવરોધ 50Ω છે. દ્રાવણની વિશિષ્ટ વાહકતા 1.4 S.m^{-1} છે. તે જ વિદ્યુતવિભાજ્યના 0.5 M દ્રાવણનો અવરોધ 280Ω છે, તો તે વિદ્યુતવિભાજ્ય 0.5 M દ્રાવણની મોલર વાહકતા $\text{S.m}^2.\text{mol}^{-1}$ એકમમાં કેટલી થાય ?
 (A) 5×10^2 (B) 5×10^{-4} (C) 5×10^{-3} (D) 5×10^3
171. AgNO_3 , AgCl અને NaCl ની અનંત મંદને મોલર વાહકતા અનુક્રમે 116.5, 121.6 અને $110.3 \frac{\text{S.cm}^2}{\text{mol}}$ હોય, તો NaNO_3 અનંત મંદને મોલર વાહકતા કેટલી હશે ?
 (A) $105.2 \frac{\text{S.cm}^2}{\text{mol}}$ (B) $130.6 \frac{\text{S.cm}^2}{\text{mol}}$ (C) $111.4 \frac{\text{S.cm}^2}{\text{mol}}$ (D) $150.2 \frac{\text{S.cm}^2}{\text{mol}}$
172. 398 K તાપમાને 0.1 N CH_3COOH ની મોલર વાહકતા $80 \frac{\text{S.cm}^2}{\text{mol}}$ છે, જ્યારે તેની અનંત મંદને મોલર વાહકતા $400 \frac{\text{S.cm}^2}{\text{mol}}$ છે, તો આ દ્રાવણમાં CH_3COOH નો વિયોજન-અંશ કેટલો હશે ?
 (A) 0.1 (B) 0.5 (C) 0.2 (D) 0.4

જવાબો : 132. (C) 133. (B) 134. (A) 135. (B) 136. (B) 137. (B), 138. (C), 139. (D), 140. (D), 141. (C), 142. (A), 143. (B), 144. (C), 145. (D), 146. (A), 147. (A), 148. (C), 149. (C), 150. (C), 151. (A), 152. (B), 153. (B), 154. (B), 155. (A), 156. (D), 157. (C), 158. (D), 159. (A), 160. (C), 161. (C), 162. (D), 163. (A), 164. (C), 165. (D), 166. (B), 167. (B), 168. (C), 169. (D), 170. (B), 171. (A), 172. (C)

પ્રાથમિક કોષ : લાંબા વપરાશ બાદ મૃત એટલે કે બિનઉપયોગી બનેલા કોષને પુનઃજીવિત એટલે કે પુનઃઉત્પાદિત કરી શકાય નહિ, તેવા પ્રકારના કોષને પ્રાથમિક પ્રકારના કોષ કહે છે. દા. ત., સૂકો કોષ

દ્વિતીયક કોષ : લાંબા વપરાશ બાદ મૃત એટલે કે બિનઉપયોગી બનેલા કોષને પુનઃજીવિત એટલે કે પુનઃઉત્પાદિત કરી શકાય તેવા પ્રકારના કોષને દ્વિતીયક પ્રકારના કોષ કહે છે. દા. ત., લેડ સંગ્રાહક કોષ, Ni-Cd સંગ્રાહક કોષ

● સૂકો કોષ (લેક્લેન્સે કોષ)



કેથોડ પરની પ્રક્રિયાથી મળતી મેંગેનીઝયુક્ત નીપજ કોષના સતત વપરાશનો સમય અને બે વપરાશ વચ્ચેના સમયગાળા ઉપર પણ આધાર રાખે છે.


Mn(III) નું Mn(IV) માં ઓક્સિડેશન વિદ્યુતપ્રવાહની દિશા ઉલટાવીને થઈ શકતું નથી, આથી આ કોષ એક વખત મૂત એટલે કે બિનઉપયોગી થયા બાદ પુનઃજીવિત એટલે કે પુનઃઉત્પાદિત કરી શકાતો નથી, આથી આ કોષ પ્રાથમિક કોષ તરીકે ઓળખાય છે.

સૂકો કોષ ખરેખર સૂકો નથી, કારણ કે તેમાં NH_4Cl અને ZnCl_2 ની ભીની લૂગદી ભરેલી હોય છે. જો કોષ સંપૂર્ણ સૂકો હોય, તો વિદ્યુતનું વહન થઈ શકે નહિ.

આ કોષનો પોટેન્શિયલ (E^0) લગભગ 1.5 વોલ્ટ છે.



સૂકા કોષના ઉપયોગો : ટોર્ચ, ટ્રાન્ઝિસ્ટર, રેડિયો અને બીજા નાનાંમોટાં ઉપકરણોમાં સૂકો કોષ વપરાય છે.

● લેડ સંગ્રાહક કોષ



વિદ્યુતવાહક તાર વડે બંને વિદ્યુતધ્રુવોને જોડતાં વિદ્યુતધ્રુવો ઉપર નીચેની પ્રક્રિયાઓ થઈ વિદ્યુતપ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય છે.


(ડિસ્ચાર્જિંગ પ્રક્રિયા)



આ કોષનો પોટેન્શિયલ (E^0) લગભગ 2.0 વોલ્ટ છે.

કોષ કાર્યરત હોય ત્યારે પ્રક્રિયામાં H_2SO_4 વપરાવાથી પાણી ઉત્પન્ન થાય છે અને આથી H_2SO_4 ના દ્રાવણની ઘનતા ઘટે છે. શરૂઆતમાં દ્રાવણની ઘનતા 1.25 – 1.30 ગ્રામ.મિલિ⁻¹ હોય છે, પરંતુ જ્યારે કોષ વિદ્યુતપ્રવાહ ઉત્પન્ન કરતો બંધ પડે છે એટલે કે ડિસ્ચાર્જ થાય છે ત્યારે દ્રાવણની ઘનતા ઘટીને 1.10 – 1.15 ગ્રામ મિલિ⁻¹ થાય છે.

વિદ્યુતધ્રુવો ઉપર થતી ચાર્જિંગ પ્રક્રિયાઓ નીચે પ્રમાણે છે :




● મરક્યુરી કોષ




ઑનોડ : ઝિંક-મરક્યુરી (Zn-Hg) આવરણ

કેથોડ : મરક્યુરી ઓક્સાઇડ (HgO) લૂગદી અને કાર્બન

વિદ્યુતવાહકીય પદાર્થ : KOH અને ZnOની બનાવેલી લૂગદી



● વિદ્યુતધ્રુવો પર થતી પ્રક્રિયાઓ



કોષ પોટેન્શિયલ : 1.35 વોલ્ટ

આ કોષમાં સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા દરમિયાન કોઈ પણ આયન ઉત્પન્ન થતા નથી.

● નિકલ-કેડમિયમ (Ni-Cd) સંગ્રાહક કોષ

આ કોષનું આયુષ્ય લેડ સંગ્રાહક કોષ કરતાં વધારે હોય છે, પરંતુ તેનો ઉત્પાદન-ખર્ચ વધારે છે.



આ કોષનો પોટેન્શિયલ : 1.2 વોલ્ટ


● હાઈડ્રોજન બળતણ-કોષ

હાઈડ્રોજન બળતણ-કોષ : હાઈડ્રોજન બળતણ-કોષમાં બળતણ તરીકે હાઈડ્રોજન વાયુનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

હાઈડ્રોજન બળતણ-કોષની રચના : એક પાત્રમાં ઉદ્દીપક સાથેના છિદ્રાળુ કાર્બનના બે પડદા ગોઠવી તેની વચ્ચે NaOHનું સાંદ્ર જલીય દ્રાવણ ભરવામાં આવે છે.

આ બંને પડદા નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવો તરીકેનું કાર્ય કરે છે.

ઍનોડ તરીકે વર્તતા વિદ્યુતધ્રુવમાં પ્લેટિનમ અને કેથોડ તરીકે વર્તતા વિદ્યુતધ્રુવમાં પ્લેટિનમ અને સિલ્વર ઓક્સાઈડનો મિશ્ર પાઉડર ઉદ્દીપક તરીકે વપરાય છે.



આ કોષનો પોટેન્શિયલ 1.23 વોલ્ટ હોય છે.

સૈદ્ધાંતિક દૃષ્ટિએ આ પ્રકારના કોષની વિદ્યુત-ઉત્પાદનક્ષમતા 100 % હોય તેવી અપેક્ષા રાખી શકાય છે. પરંતુ વાસ્તવિકપણે પ્રાપ્ત થતી ક્ષમતા લગભગ 70–75 % જેટલી હોય છે.

$$\text{બળતણ કોષની ક્ષમતા} = \frac{\Delta G}{\Delta H} \times 100 \%$$

બળતણ-કોષના ફાયદા : બીજા કોષની સરખામણીમાં બળતણ-કોષના અનેક ફાયદા છે.

બળતણ-કોષથી હવાનું પ્રદૂષણ થતું નથી.


બળતણ-કોષ અવાજ ઉત્પન્ન કરતો નથી.

થર્મલ પાવર-સ્ટેશનના વીજઉત્પાદનની સરખામણીમાં ખૂબ ઊંચી ક્ષમતા ધરાવે છે.


અમેરિકાના વૈજ્ઞાનિકોએ અવકાશીય એપોલો પ્રોગ્રામમાં અવકાશયાનમાં આ પ્રકારના કોષનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તદુપરાંત કોષની પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉત્પન્ન થતી પાણીની બાષ્પને ઠંડી પાડી મળતા પાણીનો ઉપયોગ પીવા માટે કર્યો હતો.

મર્યાદા : ખૂબ જ ઊંચા તાપમાને કાર્ય કરે છે.

ધાતુક્ષારણ : કેટલીક ધાતુઓની સપાટી ઉપર ધાતુ અને હવાના ઓક્સિજન વચ્ચે થતી રાસાયણિક પ્રક્રિયા (રેડોક્ષ પ્રક્રિયા)થી ધાતુની સપાટી ઉપર ક્ષાર ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રક્રિયાને ધાતુક્ષારણ કહે છે.



ધાતુક્ષારણની વાસ્તવિક પ્રક્રિયાઓ કંઈક અંશે અટપટી છે. લોખંડ સાથે થતી ધાતુક્ષારણની પ્રક્રિયા આ પ્રમાણે સમજાવી શકાય છે :



લોખંડના વળાંક આગળની સપાટી ઉપરના આયર્નના પરમાણુઓ ઓક્સિડેશન-પ્રક્રિયા અનુભવે છે.

એનોડ : $\text{Fe}_{(s)} = \text{Fe}^{2+}_{(aq)} + 2e^{-}$ (ઓક્સિડેશન)

આ પ્રક્રિયા થવા માટે જરૂરી પાણીના અણુઓ હવામાંના ભેજ દ્વારા મળે છે.

H^{+} ની આ હાજરીમાં હવામાંનો ઓક્સિજન રિડક્શન-પ્રક્રિયા કરે છે. આ બિંદુ કેથોડ તરીકે વર્તવાથી નીચેની પ્રક્રિયા થાય છે.

કેથોડ : $\text{O}_{2(g)} + 4\text{H}^{+}_{(aq)} + 4e^{-} = 2\text{H}_2\text{O}_{(l)}$ (રિડક્શન)

અહીં પ્રક્રિયા માટે જરૂરી H^{+} આયર્નના સળિયાની સપાટીને લાગેલા ભેજમાં ઓગળેલા કાર્બન ડાયોક્સાઇડથી ઉત્પન્ન થયેલા H_2CO_3 ના વિયોજનથી મળી રહે છે. એનોડ તરીકે વર્તતા બિંદુએથી કાટ લાગવાની પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે.

ઓક્સિડેશનથી ઉત્પન્ન થતાં $\text{Fe}^{2+}_{(aq)}$ નું હવામાંના ઓક્સિજન દ્વારા Fe^{3+} માં ઓક્સિડેશન થાય છે, જે કેથોડ તરફ પ્રસરણ પામી અંતે $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ બને છે, જે લાલ રંગના કાટ (rust) તરીકે ઓળખાય છે.

કેથોડ તરીકે વર્તતા બિંદુએ H^{+} પ્રાપ્ત થઈ શકતા ના હોય, તો ભેજમાં ઓગળેલા ઓક્સિજનનું ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા નીચેની પ્રક્રિયાથી રિડક્શન થાય છે. $\text{O}_{2(aq)} + 2\text{H}_2\text{O}_{(l)} + 4e^{-} = 4\text{OH}^{-}_{(aq)}$

● લોખંડનું ક્ષારણ (ધાતુક્ષારણ) અટકાવવાના ઉપાય

લોખંડનું ક્ષારણ અટકાવવા માટેની એક પદ્ધતિ તેની સપાટી સાથે ભેજનો સંપર્ક થવા દેવો જોઈએ નહિ, તેથી ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા થાય નહિ.

આ માટેની સરળ પદ્ધતિ લોખંડની સપાટી ઉપર રંગ લગાડવાની છે. પણ તે લાંબો સમય સુધી ટકી શકતો નથી. આથી રંગ નીકળી જતા ક્ષારણની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ જાય છે.

લોખંડની સપાટી ઉપર ઝિંક-ધાતુનું બારિક અસ્તર ચડાવવાથી લોખંડનું ક્ષારણ થતું નથી.

ઝિંકનું અસ્તર ચડાવેલ લોખંડને ગેલ્વેનાઇઝ્ડ આયર્ન કહે છે અને અસ્તર ચડાવવાની પદ્ધતિને ગેલ્વેનાઇઝિક કહે છે.

ગેલ્વેનાઇઝ્ડ આયર્ન ઉપર ઝિંકનું થોડું અસ્તર પણ નીકળી જાય તોપણ લોખંડને કાટ લાગતો નથી. કારણ કે $E^0_{\text{Zn/Zn}^{2+}}$ નું મૂલ્ય $E^0_{\text{Fe/Fe}^{2+}}$ ના મૂલ્ય કરતાં વધારે છે.

લોખંડની સપાટી ઉપર જો ટિન-ધાતુ (Sn)નું અસ્તર ચડાવવામાં આવેલું હોય અને તે સહેજ નીકળી જાય તો ત્યાં આગળથી લોખંડના ક્ષારણની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ જાય છે, $E^0_{\text{Fe/Fe}^{2+}}$ નું મૂલ્ય $E^0_{\text{Sn/Sn}^{2+}}$ ના મૂલ્ય કરતાં વધારે છે.

લોખંડનું ક્ષારણ અટકાવવા માટેની બીજી પદ્ધતિમાં લોખંડના પતરાને Mg અથવા Zn જેવી ઊંચા E^0_{OX} મૂલ્ય ધરાવતી ધાતુ સાથે જોડીને ધાતુને જમીનમાં દાટવામાં આવે છે.

સ્ટીમરની લોખંડની પ્લેટોને કાટ ખાતી અટકાવવા માટે Mg અથવા Zn ધાતુનાં મોટા ચોસલાં સાથે લોખંડની પ્લેટોને જોડી દરિયાના પાણીના સંપર્કમાં રાખવામાં આવે છે. આમ કરવાથી લોખંડની પ્લેટ કેથોડ તરીકે વર્તે છે અને Mg અથવા Zn નાં ચોસલાં એનોડ તરીકે વર્તે છે. આ ચોસલાંનું સતત ક્ષારણ થતું રહે છે અને તેને સમયાંતરે બદલવાં પડે છે. આથી Mg અથવા Zn ને બલિદાન આપનાર એનોડ કહે છે.

આ ઉપરાંત યોગ્ય રાસાયણિક પદાર્થો, જેને નિરોધકો (Inhibitors) કહે છે. તેનો ઉપયોગ કરવાથી તે ધાતુની સપાટી સાથે રાસાયણિક બંધથી જોડાઈને ક્ષારણ અટકાવે છે.

173. નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો કોષ મૃત બન્યા પછી પુનઃઉત્પાદિત કરી શકતો નથી ?
 (A) લેડસંગ્રાહક કોષ (B) Ni-Cd સંગ્રાહક કોષ (C) લેકલેન્સ કોષ (D) આપેલ ત્રણેય
174. લેડસંગ્રાહક કોષમાં એનોડ પર થતી યાજિર્ગની પ્રક્રિયા કઈ છે ?
 (A) $\text{PbSO}_{4(s)} + 2\text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightarrow \text{PbO}_{2(s)} + \text{SO}_4^{2-}_{(aq)} + 4\text{H}^+_{(aq)} + 2\text{e}^-$
 (B) $\text{PbSO}_{4(s)} \rightarrow \text{Pb}_{(s)} + \text{SO}_4^{2-}_{(aq)} + 2\text{e}^-$
 (C) $\text{Pb}_{(s)} + \text{SO}_4^{2-}_{(aq)} \rightarrow \text{PbSO}_{4(s)} + 2\text{e}^-$
 (D) $\text{PbSO}_{4(s)} + 2\text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightarrow \text{Pb}_{2(s)} + \text{SO}_4^{2-}_{(aq)} + 4\text{H}^+_{(aq)} + 2\text{e}^-$
175. હાઈડ્રોજન બળતણ કોષમાં થતી પ્રક્રિયા $4\text{H}_{2(g)} + 2\text{O}_{2(g)} \rightarrow 4\text{H}_2\text{O}_{(l)}$ ΔH છે, તો ΔH નું મૂલ્ય જણાવો.
 (A) 571.7 KJ (B) 1503.4 KJ (C) 157.5 KJ (D) 1143.4 KJ
176. બળતણ કોષમાં એનોડ અને કેથોડ પર અનુક્રમે ઉદ્દીપક તરીકે કયા પદાર્થ વપરાય છે ?
 (A) Ag_2O અને Pt (B) Pt અને Pt તથા Ag_2O નો મિશ્ર પાઉર
 (C) Pt તથા Ag_2O નો મિશ્ર પાઉર (D) ગ્રેફાઈટ અને Pt
177. નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયા કોષનો સિદ્ધાંત જુદો પડે છે ?
 (A) ડેનિયલ કોષ (B) લેડસંગ્રાહક કોષ (C) લેકલાન્સ કોષ (D) વિદ્યુતવિભાજન કોષ
178. કયા વૈજ્ઞાનિકે યુરિયા પર કરેલા સંશોધનથી કાર્બનિક રસાયણની એક અલગ શાખાનો ઉદ્ભવ થયો હતો ?
 (A) વોહલર (B) ફેરો (C) નર્નસ્ટ (D) રાઉલ્ટ
179. વિદ્યુત રાસાયણિક કોષમાં વિદ્યુતધ્રુવો પર થતી પ્રક્રિયાને n વડે ગુણવાથી E^0_{cell} માં શું ફેરફાર થાય ?
 (A) કોઈ ફેરફાર ના થાય. (B) n ગણો થાય. (C) nમાં ભાગનો થાય. (D) 2n ગણો થાય.
180. સમૂહ-1માં કોષ અને સમૂહ-2માં પોટેન્શિયલ આપેલા છે. તે માટે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો :

સમૂહ-1	સમૂહ-2	
(i) લેકલાન્સ કોષ	(A) 1.23 V (E) 1.32 V	(A) (i)-(C), (ii)-(D), (iii)-(F), (iv)-(A)
(ii) લેડસંગ્રાહક કોષ	(B) 2.35 V (F) 1.35 V	(B) (i)-(H), (ii)-(D), (iii)-(B), (iv)-(G)
(iii) મરક્યુરી કોષ	(C) 1.53 V (G) 1.75 V	(C) (i)-(E), (ii)-(D), (iii)-(F), (iv)-(A)
(iv) બળતણ કોષ	(D) 2.0 V (H) 1.5 V	(D) (i)-(H), (ii)-(D), (iii)-(F), (iv)-(A)

181. મરક્યુરી કોષમાં વિદ્યુતવાહકીય પદાર્થ તરીકે શું હોય છે ?
 (A) NH_4Cl અને ZnCl_2 ની લુગદી (B) KOH અને HgO ની લુગદી
 (C) KOH અને ZnO ની લુગદી (D) HgO અને ગ્રેફાઈટ
182. એક નિર્બળ વિદ્યુતવિભાજ્યનો વિયોજન અચળાંક 1.77×10^{-5} છે. તેના જલીય દ્રાવણની Λ^0_m 390.5 $\text{S cm}^2 \text{mol}^{-1}$ છે, તો તેના 0.01 M સાંદ્રતા ધરાવતા જલીય દ્રાવણની મોલર વાહકતા કેટલી હશે ?
 (A) 4.53 $\text{S cm}^2 \text{mol}^{-1}$ (B) 16.78 $\text{S cm}^2 \text{mol}^{-1}$ (C) 45.3 $\text{S cm}^2 \text{mol}^{-1}$ (D) 164.3 $\text{S cm}^2 \text{mol}^{-1}$

183. હાઈડ્રોજન બળતણ કોષની વિદ્યુત ઉત્પાદન કરવાની ક્ષમતા કેટલી હોય છે ?

- (A) 35 % (B) 100 % (C) 70 થી 75 % (D) 50 થી 60 %

184. સ્ટીમરની લોખંડની પ્લેટોનું ક્ષારણ અટકાવવા બલિદાન આપનાર એનોડ તરીકે કઈ ધાતુના ચોસલા વપરાય છે ?

- (A) Sn અને Mg (B) Zn અને Co (C) Ni અને Cu (D) Zn અને Mg

185. લોખંડને ક્ષારણથી બચાવવા આપેલમાંથી કઈ ધાતુનો ઢોળ ચઢાવવો સૌથી વધુ હિતાવહ છે ?

- (A) Sn (B) Ni (C) Cu (D) Zn

186. $\text{Cr} | \text{Cr}^{3+}, \text{Zn} | \text{Zn}^{2+}$ ના પ્રમાણિત ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ અનુક્રમે 0.74 V, 0.76 V છે, તો નીચે આપેલી પ્રક્રિયા માટે કયાં વિધાનો સાચાં છે ? $2\text{Cr}^{3+}_{(\text{aq}, 0.001\text{M})} + 3\text{Zn}_{(\text{s})} \rightleftharpoons 2\text{Cr}_{(\text{s})} + 3\text{Zn}^{2+}_{(\text{aq}, 0.1\text{M})}$ T = 298 K

- (1) પૂરોગામી પ્રક્રિયાનો વેગ પ્રતિગામી પ્રક્રિયા કરતાં વધારે હશે.
 (2) પૂરોગામી પ્રક્રિયા થાય છે પણ પ્રતિગામી પ્રક્રિયા થતી નથી.
 (3) પૂરોગામી અને પ્રતિગામી બંને પ્રક્રિયાઓ થાય છે.
 (4) પ્રતિગામી પ્રક્રિયાનો વેગ પૂરોગામી પ્રક્રિયાના વેગ કરતાં વધારે છે.
 (5) પૂરોગામી અને પ્રતિગામી બંને પ્રક્રિયાઓના વેગ સમાન છે.

- (A) (1), (3) (B) (2) (C) (5) (D) (3), (4)

187. 25° સે તાપમાને પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ નીચે પ્રમાણે આપેલા છે :

$$E^0_{\text{Fe}^{3+}|\text{Fe}^{2+}} = 0.77 \text{ વોલ્ટ}, E^0_{\text{Fe}^{2+}|\text{Fe}} = -0.44 \text{ વોલ્ટ}, E^0_{\text{Cu}^{2+}|\text{Cu}} = +0.34 \text{ વોલ્ટ}, E^0_{\text{Cu}^+|\text{Cu}} = +0.52 \text{ વોલ્ટ},$$

$$E^0_{\text{Cr}^{3+}|\text{Cr}} = -0.74 \text{ વોલ્ટ}, E^0_{\text{Cr}^{2+}|\text{Cr}} = -0.91 \text{ વોલ્ટ}, \text{O}_{2(\text{g})} + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} E^0 = +1.23 \text{ વોલ્ટ},$$

$$\text{O}_{2(\text{g})} + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \rightarrow 4\text{H}^- E^0 = +0.40 \text{ વોલ્ટ}.$$

સમૂહ-Iમાં આપેલ રેડોક્ષ યુગ્મ માટે સમૂહ-IIમાં પોટેન્શિયલ આપેલા છે, તો સમૂહ-I અને સમૂહ-IIને યોગ્ય રીતે જોડવામાં આવે, તો કયો વિકલ્પ સાચો છે ?

સમૂહ-I	સમૂહ-II
(P) $E^0_{\text{Fe}^{3+} \text{Fe}}$	(1) -0.18 વોલ્ટ
(Q) $4\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{H}^+ + 4\text{OH}^-$	(2) -0.40 વોલ્ટ
(R) $\text{Cu}^{2+} + \text{Cu} \rightarrow 2\text{Cu}^+$	(3) -0.04 વોલ્ટ
(S) $E^0_{\text{Cr}^{3+} \text{Cr}^{2+}}$	(4) -0.83 વોલ્ટ

	P	Q	R	S
(A)	4	1	2	3
(B)	2	3	4	1
(C)	1	2	3	4
(D)	3	4	1	2

188. આપેલ વિધાનો માટે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો. (સાચાં વિધાન માટે T અને ખોટાં વિધાન માટે F છે.)

- (i) વિદ્યુતના વહનથી ધાતુનું તાપમાન વધે છે અને વિદ્યુતવિભાજ્યના જલીય દ્રાવણનું બંધારણ બદલાતું નથી.
 (ii) વિદ્યુતના વહનથી ધાતુ રસાયણિક પ્રક્રિયા અનુભવે છે અને વિદ્યુતવિભાજ્યના જલીય દ્રાવણનું બંધારણ બદલાય છે.
 (iii) વિદ્યુતના વહનથી ધાતુના અને વિદ્યુતવિભાજ્યના જલીય દ્રાવણના બંધારણમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી.
 (iv) વિદ્યુતના વહનથી ધાતુનું તાપમાન વધે છે અને વિદ્યુતવિભાજ્યના જલીય દ્રાવણનું બંધારણ બદલાય છે.

- (A) FFTT (B) TFTF (C) TTFF (D) FFTF

189. આપેલ વિધાનો માટે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો. (સાચાં વિધાન માટે T અને ખોટાં વિધાન માટે F છે.)

- (i) NaClના સાંદ્ર જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં કરતાં $\text{Na}^+_{(\text{aq})}$ ની સાંદ્રતા વધે છે.
 - (ii) NaClના મંદ જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં કરતાં મળતા દ્રાવણમાં NaClની સાંદ્રતા વધે છે.
 - (iii) NaClના સાંદ્ર જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં કરતાં $\text{Cl}^-_{(\text{aq})}$ ની સાંદ્રતા ઘટે છે.
 - (iv) NaClના મંદ જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં કરતાં $\text{OH}^-_{(\text{aq})}$ ની સાંદ્રતા વધે છે.
- (A) TFTF (B) FTTT (C) FTFT (D) TTTT

190. આપેલ વિધાનો માટે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો. (સાચાં વિધાન માટે T અને ખોટાં વિધાન માટે F છે.)

- (i) CuSO_4 ના જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં કરતાં દ્રાવણનો વાદળી રંગ ઓછો બને છે.
 - (ii) CuSO_4 ના જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં કરતાં દ્રાવણની pH વધે છે.
 - (iii) CuSO_4 ના જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન કોપરના સક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં કરતાં એનોડનું વજન ઘટે છે.
 - (iv) CuSO_4 ના જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન કોપરના સક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં કરતાં કેથોડમાંથી કીમતી ધાતુઓ છૂટી પડે છે.
- (A) FTFT (B) TFFF (C) TFFT (D) TFTF

191. આપેલ વિધાનો માટે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો. (સાચાં વિધાન માટે T અને ખોટાં વિધાન માટે F છે.)

- (i) NaClના મંદ જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં કરતાં દ્રાવણની pH વધે છે.
 - (ii) NaClના સાંદ્ર જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં કરતાં એનોડ પર ક્લોરિન વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે.
 - (iii) NaClના મંદ જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં કેથોડ પર હાઈડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે.
 - (iv) NaClના સાંદ્ર જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં મળતાં દ્રાવણમાં ફિનોલ્ફથેલિન ઉમેરતાં દ્રાવણ ગુલાબી રંગનું બને છે.
- (A) TFFT (B) FTTT (C) FFFT (D) TFTF

192. આપેલ વિધાનો માટે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો. (સાચાં વિધાનો માટે T અને ખોટાં વિધાનો માટે F છે.)

- (i) NaClના મંદ જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં કરતાં દ્રાવણની pH વધે છે.
 - (ii) NaClના મંદ જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં કરતાં મળતા દ્રાવણમાં મિથાઈલ ઓરેન્જ ઉમેરતાં દ્રાવણ નારંગી રંગનું બને છે.
 - (iii) NaClના સાંદ્ર જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં કરતાં દ્રાવણની pOH વધે છે.
 - (iv) NaClના સાંદ્ર જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં કરતાં મળતું દ્રાવણ ભીનાં લિટ્મસ પત્રને વાદળી બનાવે છે.
- (A) TFTF (B) FTTT (C) FTFT (D) FFFT

193. સમૂહ-1માં વિદ્યુતવિભાજન પામતો પદાર્થ તથા સમૂહ-2 અને સમૂહ-3માં અનુક્રમે એનોડ અને કેથોડ પર મળતી નીપજો આપેલ છે, તો યોગ્ય રીતે જોડો :

સમૂહ-1	સમૂહ-2	સમૂહ-3
(1) NaCl (પિગલિત)	(A) $O_{2(g)}$	(P) Al ધાતુ
(2) NaCl (સિંદ્ર જલીય દ્રાવણ)	(B) $O_{2(g)}$, $CO_{2(g)}$	(Q) Cl_2
(3) NaCl (મંદ જલીય દ્રાવણ)	(C) $Cl_{2(g)}$	(R) Na ધાતુ
(4) Al_2O_3 (Na_3AlF_6)	(D) $F_{2(g)}$	(S) $H_{2(g)}$ અને દ્રાવણમાં NaOH
(5) KHF_2 નિર્જળ HF	(E) $H_{2(g)}$	(T) $H_{2(g)}$

- (A) (1)-(C)-(R), (2)-(C)-(T), (3)-(A)-(T), (4)-(B)-(P), (5)-(D)-(T)
 (B) (1)-(C)-(R), (2)-(C)-(S), (3)-(A)-(T), (4)-(B)-(P), (5)-(D)-(T)
 (C) (1)-(C)-(R), (2)-(C)-(S), (3)-(A)-(Q), (4)-(B)-(P), (5)-(D)-(T)
 (D) (1)-(C)-(R), (2)-(C)-(S), (3)-(C)-(T), (4)-(B)-(P), (5)-(D)-(T)

194. 298 K તાપમાને $Pt | H_{2(g, 1.0 \text{ બાર})} | OH^-_{(aq, 0.02M)} || H^+_{(aq)} | H_{2(g, 1.0 \text{ બાર})} | Pt$ કોષનો પોટેન્શિયલ 0.61 V છે, તો R.H.S. અર્ધકોષના દ્રાવણની pH કેટલી હશે ? 298 K તાપમાને પાણીનો આયોનિક ગુણાકાર K_w 1.02×10^{-14} છે.
 (A) 1.95 (B) 12.05 (C) 3.15 (D) 2.5

195. $Zn_{(s)} | Zn^{2+}_{(aq, 0.02M)} || Cu^{2+}_{(aq, 0.05M)} | Cu_{(s)}$ વિદ્યુતરાસાયણિક કોષના સંદર્ભમાં આપેલ વિધાનો માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો :

વિધાન (A) : $Zn^{2+}_{(aq)}$ ની સાંદ્રતા વધારતાં કોષ પોટેન્શિયલ (E_{cell}) વધે છે.

કારણ (R) : $Zn^{2+}_{(aq)}$ ની સાંદ્રતા વધારતાં એનોડનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ (E_{OX}) વધે છે.

- (A) વિધાન (A) અને કારણ (R) બંને સાચાં છે અને વિધાન (A)નું કારણ (R) છે.
 (B) વિધાન (A) અને કારણ (R) બંને સાચાં છે પણ વિધાન (A)નું કારણ (R) નથી.
 (C) વિધાન (A) અને કારણ (R) બંને ખોટાં છે.
 (D) વિધાન (A) ખોટું છે અને કારણ (R) સાચું છે.

196. નીચેના દરેક પ્રશ્નોમાં બે વિધાનો આપેલાં છે. તેમાં એક વિધાન (A) અને બીજું કારણ (R) છે. વિધાનનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરી નીચે આપેલી સૂચના મુજબ યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો :

વિધાન (A) : Na_2SO_4 ના જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુતવિભાજન Ptના વિદ્યુતપ્રુવોની હાજરીમાં કરતા એનોડ પર ઓક્સિજન વાયુ મુક્ત થાય છે.

કારણ (R) : $2SO_4^{2-}_{(aq)} \rightleftharpoons S_2O_8^{2-}_{(aq)} + 2e^-$ ના પ્રમાણિત પોટેન્શિયલ કરતાં

$2H_2O_{(l)} \rightleftharpoons O_{2(g)} + 4H^+_{(aq)} + 4e^-$ નો પ્રમાણિત પોટેન્શિયલ વધારે છે.

- (A) વિધાન (A) અને કારણ (R) બંને સાચાં છે અને વિધાન (A)નું કારણ (R) છે.
 (B) વિધાન (A) અને કારણ (R) બંને સાચાં છે અને વિધાન (A)નું કારણ (R) નથી.
 (C) વિધાન (A) અને કારણ (R) બંને ખોટાં છે.
 (D) વિધાન (A) ખોટું છે અને કારણ (R) સાચું છે.

197. આપેલ વિધાનો માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો :

વિધાન (A) : વિદ્યુતવિભાજ્યના જલીય દ્રાવણમાં પાણી ઉમેરીને મંદ કરવામાં આવે, તો તેની મોલર વાહકતા વધે છે.

કારણ (R) : વિદ્યુતવિભાજ્યના જલીય દ્રાવણમાં પાણી ઉમેરતાં તેમાં રહેલા વિદ્યુતવિભાજ્ય પદાર્થનું વિયોજન ઘટે છે.

(A) વિધાન (A) અને કારણ (R) બંને સાચાં છે અને વિધાન (A)નું કારણ (R) છે.

(B) વિધાન (A) અને કારણ (R) બંને સાચાં છે પણ વિધાન (A)નું કારણ (R) નથી.

(C) વિધાન (A) સાચું છે અને કારણ (R) ખોટું છે.

(D) વિધાન (A) અને કારણ (R) બંને ખોટાં છે.

198. $\text{Cd} | \text{CdCl}_{2(0.1 \text{ M})} || \text{AgCl}_{(s)} | \text{Ag}$ કોષમાં થતી પ્રક્રિયા $\text{Cd}_{(s)} + 2\text{AgCl}_{(s)} \rightarrow 2\text{Ag}_{(s)} + \text{Cd}^{2+}_{(aq)} + 2\text{Cl}^{-}_{(aq)}$ છે. આ વિદ્યુતકોષનો વોલ્ટેજ 273 K તાપમાને અને 298 K તાપમાને અનુક્રમે 0.6915 V અને 0.6753 V છે, તો 298 K તાપમાને આ પ્રક્રિયામાં એન્થાલ્પી ફેરફાર કેટલો હશે ?

(A) -167.6 કિ. જૂલ (B) -176 જૂલ (C) -234 કિ. જૂલ (D) 123.5 કિ. જૂલ

199. સમૂહ-Iમાં આપેલા ચાર કોષ નિરૂપણ માટે સમૂહ-IIમાં આપેલાં પાંચ વિધાનોમાંથી એક અથવા વધારે સાચાં વિધાનો હોઈ શકે છે. સમૂહ-Iના કોષનીરૂપણને સમૂહ-II માટે આપેલ 4×5 મેટ્રિક્સ સાથે યોગ્ય રીતે જોડો.

સમૂહ-I	સમૂહ-II
(A) $\text{Mg}_{(s)} \text{Mg}^{2+}_{(aq, 0.02\text{M})} \text{Cl}^{-}_{(aq, 0.05\text{M})} \text{Cl}_{2(g, 1 \text{ bar})} \text{Pt}$	(P) LHS અર્ધકોષની સાંદ્રતા અચળ રાખી RHS અર્ધકોષની સાંદ્રતા વધારતાં E_{cell} વધે છે.
(B) $\text{Pt} \text{Br}_{2(l)} \text{Br}^{-}_{(aq, 0.02\text{M})} \text{Au}^{3+}_{(aq, 0.05\text{M})} \text{Au}$	(Q) RHS અર્ધકોષની સાંદ્રતા અચળ રાખી LHS અર્ધકોષની સાંદ્રતા વધારતાં E_{cell} વધે છે.
(C) $\text{Ni}_{(s)} \text{Ni}^{2+}_{(aq, 0.02\text{M})} \text{Cu}^{2+}_{(aq, 0.05\text{M})} \text{Cu}_{(s)}$	(R) RHS અને LHS અર્ધકોષની સાંદ્રતામાં સમાન xMનો વધારો કરતાં E_{cell} વધે છે.
(D) $\text{Pt} \text{Br}_{2(l)} \text{Br}^{-}_{(aq, 0.02\text{M})} \text{Cl}^{-}_{(aq, 0.05\text{M})} \text{Cl}_{2(g, 1 \text{ bar})} \text{Pt}$	(S) RHS અને LHS અર્ધકોષની સાંદ્રતામાં સમાન xMનો ઘટાડો કરતાં E_{cell} વધે છે.
	(T) $Q_C > 1$

(A) (P) (Q) (R) (S) (T)

(A) (P) (Q) (R) (S) (T)

(B) (P) (Q) (R) (S) (T)

(B) (P) (Q) (R) (S) (T)

(C) (P) (Q) (R) (S) (T)

(C) (P) (Q) (R) (S) (T)

(D) (P) (Q) (R) (S) (T)

(D) (P) (Q) (R) (S) (T)

200. સમૂહ-Iમાં આપેલા વિદ્યુતવિભાજન માટે સમૂહ-IIમાં આપેલાં પાંચ વિધાનોમાંથી એક અથવા વધારે સાચાં વિધાનો હોઈ શકે છે. સમૂહ-Iના વિદ્યુતવિભાજનને સમૂહ-II માટે આપેલ 4×5 મેટ્રિક્સ સાથે યોગ્ય રીતે જોડો.

સમૂહ-I	સમૂહ-II
(A) NaClના મંદ જલીય દ્રાવણનું નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં વિદ્યુતવિભાજન કરતાં	(P) એનોડ પર ડાયઑક્સિજન વાયુ મળે છે.
(B) NaClના સાંદ્ર જલીય દ્રાવણનું નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં વિદ્યુતવિભાજન કરતાં	(Q) કેથોડ પર ડાયહાઈડ્રોજન વાયુ મળે છે.
(C) CuSO ₄ ના જલીય દ્રાવણનું નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં વિદ્યુતવિભાજન કરતાં	(R) દ્રાવણની pH ઘટે છે.
(D) Na ₂ SO ₄ ના જલીય દ્રાવણનું નિષ્ક્રિય વિદ્યુતધ્રુવોની હાજરીમાં વિદ્યુતવિભાજન કરતાં	(S) દ્રાવણની pH વધે છે.
	(T) પ્રેક્ષક આયનોની સાંદ્રતા વધે છે.

(A) ☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S ☐ T

(B) ☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S ☐ T

(C) ☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S ☐ T

(D) ☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S ☐ T

(A) ☒ P ☒ Q ☐ R ☐ S ☐ T

(B) ☐ P ☒ Q ☐ R ☒ S ☒ T

(C) ☒ P ☐ Q ☒ R ☐ S ☒ T

(D) ☒ P ☒ Q ☐ R ☐ S ☒ T

જવાબો : 173. (C) 174. (A) 175. (D) 176. (B) 177. (D) 178. (A), 179. (A), 180. (D), 181. (C), 182. (B), 183. (C), 184. (D), 185. (D), 186. (D), 187. (D), 188. (A), 189. (D), 190. (D), 191. (B), 192. (C), 193. (B), 194. (A), 195. (D), 196. (A), 197. (C), 198. (A).