

જે તત્વોની બાહ્યતમ સંયોજકતા કક્ષકની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના ns^2np^1 થી ns^2np^6 (સિવાય He તત્વ) હોય, તે તત્વો p-વિભાગનાં કહેવાય છે. જ્યાં $n = 2$ થી 6 છે. આવર્ત કોષ્ટકમાં સંક્રાંતિ તત્વોથી જમણી બાજુ આ તત્વો ગોઠવાયેલાં છે. p-વિભાગનાં તત્વોની સંયોજકતા કક્ષકો સિવાયની અંદરના ભાગની ઇલેક્ટ્રોનીય રચનામાં ફેરફાર હોવાથી, આ તત્વોના ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં વિવિધતા માલૂમ પડે છે. સમૂહનું પ્રથમ તત્વ તે જ સમૂહના અન્ય સભ્યો કરતાં કેટલાક ગુણધર્મોમાં જુદાપણું ધરાવે છે.

સમૂહ	13	14	15	16	17	18
2P	B	C	N	O	F	Ne
3P	Al	Si	P	S	Cl	Ar
4P	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
5P	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
6P	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn

વિદ્યુતઋણમયતા, આયનીકરણ એન્ટાલ્પી અને ઓક્સિડેશન-ક્ષમતા આવર્તમાં પરમાણ્વિય-ક્રમાંક વધતાં વધે છે. જ્યારે સમૂહમાં પરમાણ્વિય-ક્રમાંક વધતાં તે ઘટે છે. પરમાણ્વિયત્રિજ્યા, વાનડરવાલ્સ ત્રિજ્યા અને ધાત્વિક ગુણધર્મ સમૂહમાં પરમાણ્વ-ક્રમાંક વધતાં વધે છે. p-સમૂહનાં તત્વોમાં અધાતુ, અર્ધધાતુ અને ધાતુતત્વોનો એક જ સમૂહમાં સમાવેશ થયેલો જોવા મળે છે. આ ગુણધર્મો આવર્તમાં પરમાણ્વિય-ક્રમાંક વધતાં ઘટે છે.

● P-વિભાગનાં તત્વોની સામાન્ય ઓક્સિડેશન-અવસ્થા

p-વિભાગનાં તત્વોની સંયોજકતા કક્ષકની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના ns^2np^{1-6} જ્યાં $n = 2$ થી 6 છે. તેથી આ તત્વોની મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થાનું મૂલ્ય તેના સમૂહના મૂલ્યમાંથી દસ બાદ (-10) કરવાથી મળે છે. સમૂહ 13થી 16માં પરમાણ્વ-ક્રમાંક વધે એટલે કે સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થાના મૂલ્યમાંથી બે બાદ (-2) કરતાં મળતી ઓક્સિડેશન અવસ્થાની સ્થિરતામાં વધારો થાય છે. આ વલણને નિષ્ક્રિય યુગ્મ અસર કહે છે.

સમૂહ	13	14	15	16	17	18
ઓક્સિડેશન	B	C	N	O	F	Ne
અવસ્થા	+3	+4, -4	+5 થી -3	-1, -2	-1	-
	Al	Si	P, As	S, Se, Te	Cl, Br, I	Xe
	+3	+4	+3, +5, -3	-2, +2	-1, +1, +3	+2, +4
				+4, +6	+5, +7	+6, +8
	Ga, In, Tl	Ge, Sn, Pb	Sb, Bi			
	+1, +3	+2, +4	+3, +5			

● સમૂહ 13નાં તત્ત્વો (બોરોન સમૂહ) : ઇલેક્ટ્રોનીય રચના

ક્રમ	તત્ત્વનું નામ	(સંજ્ઞા)	પરમાણ્વિય-ક્રમાંક	કોર ઇલેક્ટ્રોનીય રચના
(1)	બોરોન	(B)	5	[He] 1s ² 2p ¹
(2)	એલ્યુમિનિયમ	(Al)	13	[Ne] 3s ² 3p ¹
(3)	ગેલિયમ	(Ga)	31	[Ar] 3d ¹⁰ 4s ² 4p ¹
(4)	ઇન્ડિયમ	(In)	49	[Kr] 4d ¹⁰ 5s ² 5p ¹
(5)	થેલિયમ	(Tl)	81	[Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ¹

તેમની સંયોજકતાકોષની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના ns²np¹ જ્યાં n = 2 થી 6 છે. આમ, સંયોજકતા કોષમાં s-પ્રકારની કક્ષકમાં બે ઇલેક્ટ્રોન અને p-પ્રકારની કક્ષકમાં એક એમ મળી કુલ ત્રણ ઇલેક્ટ્રોન આવેલાં છે.

● પ્રાપ્તિસ્થાન :

બોરોનની પ્રચુરતા પૃથ્વીના પોપડામાં વજનથી 0.0001 % કરતાં ઓછી છે. બોરોન કેલિફોર્નિયા (અમેરિકા) અને તુર્કીમાં મળી આવે છે. ભારતમાં તે કશ્મીરના લડાખ વિસ્તારની પુત્રા ખીણમાંથી અને રાજસ્થાનના સાંભર સરોવરમાંથી બોરેક્સ સ્વરૂપે મળે છે.

ખનિજો : બોરેક્સ	(Na ₂ B ₄ O ₇ · 10H ₂ O)	પૃથ્વીના પોપડામાં	પ્રથમ ક્રમે વજનથી	O (45.5 %)
કેર્નોઈટ	(Na ₂ B ₄ O ₇ · 4H ₂ O)		દ્વિતીય ક્રમે વજનથી	Si (27.7 %)
કોલિમેનાઈટ	(Ca ₂ B ₆ O ₁₁ · 2H ₂ O)		તૃતીય ક્રમે વજનથી	Al (8.3 %)
ઓર્થોબોરિક એસિડ	(H ₃ BO ₃)			

ખનિજો : બોક્સાઈટ	Al ₂ O ₃ · xH ₂ O
ઓર્થોકલેઈમ	KAlSi ₃ O ₈
કાયોલાઈટ	Na ₃ AlF ₆
કોરેન્ડમ	Al ₂ O ₃
બેરિલ	Be ₃ Al ₂ Si ₆ O ₁₈
અબરખ	KAl ₂ (Si ₃ AlO ₁₀)(OH) ₂

ભારતમાં અબરખ (માઈકા) ખનિજ મધ્યપ્રદેશ, કર્નાટક, ઓરિસ્સા અને જમ્મુમાં મળી આવે છે. દુનિયામાં અબરખની સૌથી વધુ નિકાસ કરતો દેશ ભારત છે. Ga, In, અને Tlની ઉપસ્થિતિ ખૂબ જ ઓછી છે. Zn, Cu, Ge અને Asના બનેલા સંકીર્ણ સલ્ફાઈડના ખનિજ જર્મેનાઈટમાંથી ગેલિયમ (0.1 – 1 %) મળી આવે છે. Znના સલ્ફાઈડમાંથી અલ્પ માત્રામાં ઇન્ડિયમ મળી આવે છે. લેડના સલ્ફાઈડ ખનિજમાંથી થેલિયમ પ્રાપ્ત થાય છે.

● ગુણધર્મોમાં વિવિધતા

(1) પરમાણ્વિય ત્રિજ્યા અને આયનીય ત્રિજ્યા : બોરોન સમૂહનાં તત્ત્વોમાં પરમાણ્વિય-ક્રમાંક વધતાં પરમાણ્વિય ત્રિજ્યા (આયનીય ત્રિજ્યા) વધે છે. Al કરતાં Gaની પરમાણ્વિય ત્રિજ્યા ઓછી છે. (અપવાદ) પરંતુ આયનીય ત્રિજ્યામાં નિયમિત વલણ માલૂમ પડે છે.

(2) આયનીકરણ એન્ટાલ્પી : બોરોન સમૂહનાં તત્ત્વોની પ્રથમ આયનીકરણ એન્ટાલ્પી (Δ₁H₁)નો ક્રમ B > Al < Ga > In < Tl. આ સમૂહનાં તત્ત્વોની Δ₁H₂ અને Δ₁H₃નાં મૂલ્યો ખૂબ જ વધારે છે.

(3) ધાત્વિક ગુણધર્મ : B કરતાં Alમાં ધાત્વિક ગુણધર્મ વધારે છે. કારણ કે B કરતાં Alની વિદ્યુતધનમયતા વધુ હોવાથી Al વિદ્યુત અને ઉષ્માનો સુવાહક છે. Al થી Tl તરફ જતાં તેના રિડક્શન પોટેન્શિયલનાં મૂલ્યો વધે છે. તેથી તેની વિદ્યુત ધનમયતાનાં મૂલ્યોમાં ઘટાડો થાય છે. તેથી ધાત્વિક ગુણધર્મમાં વધારો થાય છે. આમ, બોરોન અધાતુ, એલ્યુમિનિયમ ધાતુ અને In અને Tlમાં ધાતુ ગુણધર્મ ક્રમશઃ વધે છે.

(4) વિદ્યુતઋણતા : સમૂહ-13નાં તત્વોની વિદ્યુતઋણતા સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં B કરતાં Alની વિદ્યુતઋણતા ઝડપથી ઘટે છે અને ત્યાર બાદ Al થી Tl તરફ જતાં તે ધીમેથી ક્રમશઃ વધે છે.

(5) ગલનબિંદુ અને ઉત્કલનબિંદુ : ગલનબિંદુના ક્રમ: $B > Al > Ga < In < Tl$ ઉત્કલનબિંદુ પરમાણુ-ક્રમાંક વધતાં ઉત્કલનબિંદુ ક્રમશઃ ઘટે છે.


(6) ઘનતા : સમૂહ-13નાં તત્વોના પરમાણ્વિય-ક્રમાંક વધતાં તેમની ઘનતાનાં મૂલ્યોમાં વધારો થાય છે.

(7) રિડક્શનકર્તાનો ગુણધર્મ : Al થી Tl તરફ જતાં ઘટે છે. કારણ કે Al થી Tl તરફ જતાં તેમનાં E^0_{Red} નાં મૂલ્યો વધે છે. તેથી તેમની રિડક્શન કરવાની ક્ષમતામાં ઘટાડો થાય છે અને તેથી રિડક્શનકર્તાનો ગુણધર્મ ઘટે છે.


(8) સંયોજનોનો સ્વભાવ : સમૂહ-13માં પરમાણ્વિય-ક્રમાંક વધતાં સહસંયોજક બંધ ધરાવતાં સંયોજનો બનવાનું વલણ ઘટે છે અને આયનીય બંધ ધરાવતાં સંયોજનો બનવાનું વલણ વધે છે.

ઑક્સિડેશન અવસ્થા : સમૂહ-13નાં તત્વોની ઇલેક્ટ્રોનીય રચનામાં બાહ્યતમ કક્ષકમાં s-પ્રકારની કક્ષકમાં $2e^-$ અને p-પ્રકારની કક્ષકમાં $1e^-$ એટલે કે $3e^-$ કુલ હોવાથી +3 ઑક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવે છે. B અને Al ઑક્સિડેશન અવસ્થા +3 છે, જ્યારે Ga, In અને Tl +1 અને +3 એમ બે પ્રકારની ઑક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવે છે. જેમ-જેમ પરમાણ્વિય-ક્રમાંક વધે તેમ +3 ઑક્સિડેશન અવસ્થાની સ્થિરતા ઘટે છે અને +1 ઑક્સિડેશન અવસ્થાની સ્થિરતામાં વધારો થાય છે.

● હાઈડ્રાઈડ સંયોજનો :



$B_n H_{n+4}$ અને $B_n H_{n+6}$ પ્રકારના બોરોનના હાઈડ્રાઈડ “બોરેન” તરીકે જાણીતા છે. જ્યારે અન્ય તત્વોના હાઈડ્રાઈડ બહુલક સ્વરૂપે હોય છે. દા.ત., $(AlH_3)_n$, $(GaH_3)_n$ અને $(InH_3)_n$ તેઓ નિર્બળ લુઈસ એસિડ છે.



(રિડક્શનકર્તા)

હેલાઈડ સંયોજનો : બોરોનના હેલાઈડની પ્રબળતાનો ક્રમ $BI_3 > BBr_3 > BCl_3 > BF_3$, $AlCl_3$ સેતુબંધ જોડાણને લીધે દ્વિઅણુ બનાવે છે. (Al_2Cl_6) જે લુઈસ એસિડ Ga અને Tl, MX પ્રકારના હેલાઈડ બનાવે છે. જેમની સ્થિરતા પરમાણ્વિય-ક્રમાંક વધતાં વધે છે.

ઑક્સાઈડ અને હાઈડ્રોક્સાઈડ સંયોજનો : M_2O_3 અને $M(OH)_3$ સંયોજનોના પરમાણ્વિય-ક્રમાંક વધે તેમ એસિડિક ગુણધર્મ ઘટે અને બેઝિક ગુણધર્મ વધે છે.

સંકીર્ણ અને દ્વિક્ષાર સંયોજનો : બોરોનમાં d-કક્ષક ઉપલબ્ધ ન હોવાથી $[BH_4]^-$, $[BF_4]^-$ જેવા ચતુષ્ફલકીય સંકીર્ણ બનાવે છે, જ્યારે Al, Ga, In અને d-કક્ષક આવેલી હોવાથી $[MF_6]^{3-}$ જેવા અષ્ટફલકીય સંયોજનો બનાવે છે. જેઓ પાણી સાથે $[M(H_2O)_6]^{3+}$ અસ્ટફલકીય એકવા આયન બનાવે છે. $Al_2(SO_4)_3$ આલ્કલી ધાતુ આયન સાથે અને NH_4^+ ના સલ્ફેટ સાથે પ્રક્રિયા કરીને $M_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$ અથવા $MAI(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ બનાવે છે. જ્યાં $M = Na^+$, K^+ , Rb^+ , અને NH_4^+ .

K_2SO_4 , $Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$ દ્વિક્ષાર (ફટકડી) તરીકે ઓળખાય છે. પાણીને નરમ બનાવવા અને રંગરસાયણમાં મોર્ડન્ટ તરીકે વપરાય છે.

● સમૂહ-13નાં પ્રથમ તત્વ (બોરોન)ના ગુણધર્મોમાં અનિયમિતતા

બોરોન અધાતુ છે. એકાંકી અણુ બનાવે છે. પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરતો નથી તેના ઓક્સાઇડ અને હાઇડ્રોક્સાઇડ એસિડિક છે. બોરોન સિવાયનાં તત્વોના ટ્રાયહેલાઇડ જળવિભાજન પ્રક્રિયાથી સંકીર્ણ આયન બનાવે છે.



● બોરોનના ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મો

હીરા પછીનો બોરોન કઠિન પદાર્થ છે. ગ.ભિ/ઉ.ભિ ખૂબ જ ઊંચા છે. ઉષ્મા અને વિદ્યુતનો મંદવાહક છે. ^{10}B અને ^{11}B સમસ્થાનિકોની પ્રચુરતાનું સાપેક્ષ પ્રમાણ અનુક્રમે 20 % અને 80 % છે. ઘેરા બદામી રંગનું અસ્ફટિકમય અને કાળો ચળકાટ ધરાવતું ધાત્વીય સ્ફટિકમય અપરરૂપ ધરાવે છે.

રાસાયણિક ગુણધર્મો : પ્રબળ ઓક્સિડેશનકર્તા સાથે પ્રક્રિયા આપે છે.

ઊંચા તાપમાને બોરોન N_2 , O_2 અને X_2 સાથે અનુક્રમે BN , B_2O_3 અને BX_3 સંયોજનો બનાવે છે.

HCl સાથે પ્રક્રિયા કરતો નથી, પરંતુ HNO_3 અને H_2SO_4 સાથે પ્રક્રિયા કરે છે.



● આલ્કલી સાથે બોરેટ બનાવે છે :

$2\text{B} + 6\text{MOH} \xrightarrow{\Delta} 2\text{M}_3\text{BO}_3 + 3\text{H}_2$ ($\text{M} = \text{Na કે K}$) ધાતુ સાથે બોરાઇડ બનાવે છે જે ખૂબ જ કઠણ અને ઊંચું ગલનબિંદુ ધરાવતો ધન પદાર્થ છે. $\text{B} + \text{Cr} \xrightarrow{\Delta} \text{CrB}$ (ક્રોમિયમ બોરાઇડ).

1. p-વિભાગનાં તત્વોના દરેક સમૂહની સૌથી ભારે ધાતુ માટે નીચેના પૈકી કયું વિધાન ખોટું છે ?

(A) સૌથી વધુ ધાત્વિક ગુણધર્મ

(B) સમૂહની ઓક્સિડેશન અવસ્થા કરતાં 2 એકમ ઓછી ઓક્સિડેશન અવસ્થા દર્શાવે છે.

(C) તે અર્ધધાતુ છે.

(D) ધનાયન સ્પિસિઝનું નિર્માણ કરે છે.

2. સમૂહ-13નાં તત્વો ઓક્સિડેશન અવસ્થા દર્શાવે છે.

(A) +3

(B) +1

(C) +1 અને +3 બંને

(D) +1, +2 અને +3

3. નીચેના પૈકી સૌથી ઓછું ગલનબિંદુ કોનું છે ?

(A) B

(B) Al

(C) Ga

(D) Tl

4. યોગ્ય જોડકું જોડો :

ખનીજ	અણુસૂત્ર
(P) બોરેક્ષ	(T) $\text{Ca}_2\text{B}_6\text{O}_{11} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
(Q) કેર્નાઇટ	(U) H_3BO_3
(R) કોલિમેનાઇટ	(V) $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$
(S) ઓર્થોબોરિકએસિડ	(W) $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$



(A) (P)-(W), (Q)-(V), (R)-(T), (S)-(U)

(B) (P)-(U), (Q)-(W), (R)-(V), (S)-(T)

(C) (P)-(T), (Q)-(U), (R)-(W), (S)-(V)

(D) (P)-(V), (Q)-(T), (R)-(U), (S)-(W)

● બોરેક્સ મણકા-કસોટી



સોડિયમ મેટાબોરેટ

બોરોન ઓક્સાઇડ

(બોરિક એનહાઇડ્રાઇડ)





કાય જેવો પારદર્શક બોરેક્સ મણકો

રંગીન ધાતુ આયન Ni^{2+} , Co^{2+} , Cr^{3+} , Cu^{2+} , Mn^{2+} સાથે ગરમ કરતાં રંગીન મેટાબોરેટ બને છે. જેનો રંગ અનુક્રમે બદામી, ભૂરો, લીલો, ભૂરો અને ગુલાબી છે. $\text{NiO} + \text{B}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{Ni(BO}_2)_2$

નિકલ મેટાબોરેટ (બદામી રંગ)


ઉપયોગ : ગુણાત્મક પૃથક્કરણમાં બોરેક્સ મણકા-કસોટીમાં, માટીના ઘડાના રંગ અને ગ્લેઝ માટે, મીણબત્તીની બનાવટમાં, એન્ટિસેપ્ટિક હોવાથી ઔષધીય સાબુની બનાવટમાં, ઓપ્ટિકલ કાયની બનાવટમાં તથા કઠણ પાણીને નરમ બનાવવા વપરાય છે.

● બોરિક એસિડ (H_3BO_3)



(3) BCl_3 અને BN જળ વિભાજનથી બોરિક એસિડ બનાવે છે.

ગુણધર્મો : બોરિક એસિડ સફેદ સ્ફટિકમય ઘન (પોચો) સાબુ જેવો પદાર્થ છે. ઠંડા પાણીમાં અદ્રાવ્ય પણ ગરમ પાણીમાં દ્રાવ્ય છે.



ઓર્થોબોરિક એસિડ

મોટાબોરિક એસિડ

ટેટ્રાબોરિક એસિડ



બોરોન ઓક્સાઇડ


નિર્બળ મોનાબેઝિક અને લુઈસ એસિડ છે.



ઇથનોલ

ઇથાઇલ બોરેટ


બંધારણ (H_3BO_3)



● બંધારણ



ઉપયોગ : ખોરાક સંરક્ષક પિગમેન્ટ અને બોરેક્સની બનાવટમાં આંખને સ્વચ્છ રાખવા ઓષધ તરીકે, રંગરસાયણ અને પોટરી ગ્લેઝની બનાવટમાં ઉપયોગી છે.

બોરોન હાઈડ્રાઈડ (બોરેન) : B_2H_6 (ડાયબોરેન)




સોડિયમ બોરોહાઈડ્રાઈડ ડાયબોરેન


ઔદ્યોગિક પ્રક્રિયા : (X = F કે Cl)



ગુણધર્મો : રંગવિહીન, અત્યંત ઝેરી વાયુ




(હવા) $\Delta H = -2008 \text{ KJ.mole}^{-1}$




(બોરેઝિન)

(અકાર્બનિક બેન્ઝિન)



(બોરિક એસિડ)



● બંધારણ

બોરોન અને તેનાં સંયોજનોના ઉપયોગ : ^{10}B સમસ્થાનિક ન્યુટ્રોન શોષવાની ક્ષમતા ધરાવતો હોવાથી ન્યુક્લિયર રિએક્ટરમાં ધાતુ બોરાઈડ રક્ષણાત્મક આવરણ અને નિયંત્રણ સળિયા તરીકે તથા કેન્સરની કેમોથેરાપી સારવારમાં વપરાય છે. બોરોનના રેષાઓ વિમાન ઉદ્યોગમાં હલકા અને સંયોજિત પદાર્થો બનાવવા વપરાય છે. બોરેક્સ અને બોરિક એસિડ ઉષ્માપ્રતિકારક, બોરોસિલિકેટ પાયરેક્સ કાચ બનાવવા તથા ધાતુ કર્મવિધિમાં ધાતુઓના સોલ્ડરિંગ ફ્લક્સ તરીકે વપરાય છે. પોર્સેલિન ઈનેમલ, મણકા-કસોટીમાં, ચેપનાશક, ખોરાક ઉદ્યોગના સંરક્ષક તરીકે તથા ડાયબોરેન ઊંચી ઊર્જાક્ષમતા ધરાવતા બળતણ તરીકે ઉપયોગી છે.


● એલ્યુમિનિયમના ગુણધર્મો

એલ્યુમિનિયમ હલકી, ચાંદી જેવી સફેદ ધાતુ છે. ઊંચું તન્ય સામર્થ્ય, ઊંચી વીજવાહકતા તથા ઉષ્માવાહકતા (Cu કરતાં બમણી), વિદ્યુત ધનમયતા ધરાવે છે. O_2 સાથે ઝડપથી પ્રક્રિયા કરી Al_2O_3 નું રક્ષણ કવચ બનાવે છે, તેથી નિષ્ક્રિય બને છે.


● એલ્યુમિનિયમના ઉપયોગો

ઉદ્યોગોમાં તથા રોજિંદા જીવનમાં, મિશ્રધાતુ બનાવવા, વાસણો, એરોપ્લેનના ભાગ બનાવવા, Cr અને Mn ધાતુનું તેમની ઓક્સાઇડમાંથી નિષ્કર્ષણ કરવા વપરાતી એલ્યુમિનો થર્માઇટ પદ્ધતિમાં પ્રબળ રિડક્શનકર્તા તરીકે વપરાય છે.

● એલ્યુમિનિયમની ઍસિડ અને બેઇઝ સાથે પ્રક્રિયા




Alને સાંદ્ર HNO_3 સાથે Al_2O_3 નું નિષ્ક્રિય પડ બનાવે છે. તેથી સપાટી પર આગળ થતી પ્રક્રિયા અટકે છે.





સોડિયમ એલ્યુમિનેટ

12. બોરોન કાર્બાઇડનું સાચું આણ્વિય બંધારણ કયું છે ?







13. $\text{Ca}_2\text{B}_6\text{O}_{11} + 2\text{Na}_2\text{CO}_3 \xrightarrow{\Delta} 2\text{CaCO}_{3(s)} + \boxed{\text{X}} + 2\boxed{\text{Y}}$ આપેલ પ્રક્રિયામાં X અને Y અનુક્રમે શું છે ?




14. યોગ્ય જોડકું જોડો :


આયન	બોરેક્ષ મણકા-કસોટીમાં રંગ
(P) Co^{2+}	(T) ગુલાબી
(Q) Cr^{3+}	(U) બદામી
(R) Ni^{2+}	(V) લીલો
(S) Mn^{2+}	(W) ભૂરો



15. આંખોને સ્વચ્છ રાખવાના વોશિંગ સોલ્યુશનમાં શેનો ઉપયોગ થાય છે ?



16. BF_3 ની જળવિભાજન પ્રક્રિયાથી શું મળે ?



17. નીચે પૈકી કયું સંયોજન અકાર્બનિક બેન્ઝિન તરીકે ઓળખાય છે ?



18. BF_3 માટે નીચેનાં વિધાનોની સત્યાર્થતા જણાવો ?

(i) તે લુઈસ ઍસિડ તરીકે વર્તે છે.

(ii) તે NH_3 સાથે પ્રક્રિયા ફરી મિશ્રસંયોજન બનાવે છે.

(iii) તે ઓરડાના તાપમાને બાષ્પશીલ છે.

(iv) તે ઈથર સાથે જોડાઈ બોરોન ટ્રાય ક્લોરાઇડ ઈથરેટ બનાવે છે.



19. મેંગેનીઝ ક્ષારને બોરિક એનહાઇડ્રાઇડ સાથે ગરમ કરતાં ગુલાબી રંગનો મણકો કયા સંયોજનને કારણે બને છે ?
 (A) $Mn_2B_4O_7$ (B) $Mn(BO_2)_2$ (C) MnO (D) આપેલ પૈકી એક પણ નહિ.
20. બોરેઝીનમાં σ અને π બંધની સંખ્યા કેટલી છે ?
 (A) $9\sigma, 6\pi$ (B) $12\sigma, 3\pi$ (C) $6\sigma, 9\pi$ (D) $15\sigma, 0\pi$
21. BCl_3 ની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી નીચેના પૈકી શું મળે ?
 (A) $H_3BO_3 + HCl$ (B) $B_2H_6 + HCl$ (C) $B_2O_3 + HCl$ (D) એક પણ નહિ.
22. ‘અકાર્બનિક ગ્રેફાઇટ’ કોને કહેવાય છે ?
 (A) $B_3N_3H_6$ (B) B_3N_3 (C) SiC (D) $Fe(CO)_5$
23. પ્રવાહી સ્વરૂપે નીચેની કઈ ધાતુનું ઘનીકરણ થતાં તે વિસ્તરણ પામે છે ?
 (A) Ga (B) Al (C) Zn (D) Cu
24. પોટાશ એલમને પાણીમાં ઓગાળતાં તે આપે છે.
 (A) H_2SO_4 નું એસિડિક દ્રાવણ (B) બેઝિક દ્રાવણ
 (C) HCl નું એસિડિક દ્રાવણ (D) તટસ્થ દ્રાવણ
25. નીચેના પૈકી કયું વિધાન સાચું નથી ?
 (A) Al તેનાં બધા જ સંયોજનોમાં આયોનિક છે.
 (B) Al એ હલકી ધાતુ છે, છતાં ઊંચી તણાવશક્તિ ધરાવે છે.
 (C) Al એ પ્રબળ રિડક્શનકર્તા છે.
 (D) ઊંચા તાપમાને પણ Al પાણીની વરાળ સાથે પ્રક્રિયા કરતું નથી.
26. બૉમ્બમાં વપરાતું ‘એમોનાલ’ એ શેનું મિશ્રણ છે ?
 (A) $Al + NH_4NO_3$ (B) $Al + Al_2O_3 + B_2O_3$ (C) $Al + KNO_3$ (D) $Al_2O_3 + C$
27. ઓરડાના તાપમાને થેલિયમ ટ્રાય બ્રોમાઇડ ધીમેથી શેમાં રૂપાંતરિત થાય છે ?
 (A) $TlBr$ (B) Tl_2Br_6 (C) $TlBr_2$ (D) $Tl[TlBr_4]$
28. ‘લેપિસ લાઝુલી’ નામે ઓળખાતો વાદળી રંગનો કીમતી પથ્થર કઈ વર્ગની ખનિજમાં સમાવેશ પામે છે ?
 (A) સોડિયમ એલ્યુમિનો સિલિકેટ (B) ઝિંક કોબાલ્ટેટ
 (C) બેઝિક કોપર કાર્બોનેટ (D) આપેલ બધા જ.

જવાબો : 12. (B), 13. (A), 14. (A), 15. (A), 16. (B), 17. (C), 18. (D), 19. (C), 20. (B),
 21. (A), 22. (B), 23. (A), 24. (A), 25. (A), 26. (A), 27. (D), 28. (A)

● સમૂહ 14નાં તત્વોની સામાન્ય માહિતી

ક્રમ	તત્વનું નામ	સંજ્ઞા	પરમાણ્વિય-ક્રમાંક	નિષ્ક્રિય કોર સાથે ઇલેક્ટ્રોનીય રચના
1.	કાર્બન	(C)	6	$[He] 2s^2 2p_x^1 2p_y^1$
2.	સિલિકોન	(Si)	14	$[Ne] 3s^2 3p_x^1 3p_y^1$
3.	જર્મેનિયમ	(Ge)	32	$[Ar] 3d^{10} 4s^2 4p_x^1 4p_y^1$
4.	ટીન (ક્વાર્ટ)	(Sn)	50	$[Kr] 4d^{10} 5s^2 5p_x^1 5p_{ya}^1$
5.	લેડ (સીસુ)	(Pb)	82	$[Xe] 4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p_x^1 6p_y^1$

કાર્બનનું કદ નાનું, ઊંચી વિદ્યુતઋણતા અને કાર્બન બંધ ઊર્જાનું મૂલ્ય ઊંચું હોવાથી તેમાં કેટેનેશનનો ગુણ માલૂમ પડે છે. કાર્બનમાં ધાતુઓ, અધાતુઓ અને અર્ધધાતુઓ સાથેનાં સંયોજનોને દ્વિઅંગી કાર્બનિક સંયોજનો કહે છે. દા.ત., CaC, SiC, CO, HCN.

પ્રાપ્તિસ્થાન : પૃથ્વીના પોપડામાં વજનથી સત્તરમા ક્રમે કાર્બન, બીજા ક્રમે સિલિકોન (27 %), જર્મેનિયમ સૂક્ષ્મ માત્રિક તત્વ છે અને ઝિંક ખનિજોને ઊંચા તાપમાને ગરમ કરતાં, તેમાંથી નીકળતા ધૂમ્રમેશમાંથી, ટિન (2 ppm) અને લેડ(સીસુ) (13 ppm) જેટલા પ્રમાણમાં મળે છે.

કાર્બન કોલસો, ખનિજ તેલ, ધાતુ કાર્બોનેટ સ્વરૂપે, સિલિકોન SiO₂ અને સિલિકેટ સ્વરૂપે, લેડની મુખ્ય ખનિજ ગેલીના (PbS) સાથે ઝિંક બ્લેન્ડ (ZnS) પણ ભળેલો હોય છે. લેડની એગ્લેસાઈટ (PbSO₄) અને સેરુસાઈટ (PbCO₃) છે.

● ગુણધર્મોમાં વિવિધતા

પરમાણ્વિય ત્રિજ્યા : સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં વધે છે.

આયનીકરણ એન્થાલ્પી : C > Si > Ge > Sn < Pb

ધાત્વિક ગુણધર્મ : સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં વધે છે.

વિદ્યુત ઋણતા : પરમાણ્વિય-ક્રમાંક વધતાં ઘટે છે.

ગલનબિંદુ અને ઉત્કલનબિંદુ : સમૂહ 13 કરતાં સમૂહ 14માં ઘણો વધારો થાય છે. સમૂહ 14માં પરમાણ્વિય ક્રમાંક વધતાં ઘટે છે.

ઘનતા : કાર્બનથી લેડ તરફ જતાં વધે છે.

કેટેનેશન : C > > Si > Ge = Sn > > Pb

અપરરૂપતા : કાર્બનનાં અનેક અપરરૂપો છે. જેમાં હીરો, ગ્રેફાઈટ અને ફૂલેરિન સ્ફટિકમય અપરરૂપો છે. ટિનનાં બે અપરરૂપો છે. સફેદ ટિન (β-ટિન) ઓરડાના તાપમાને સ્થાયી છે. ભૂખરું ટિન (α-ટિન) અસ્થાયી છે. તેને β-ટિનમાંથી 286K તાપમાને મેળવી શકાય છે.

સફેદ ટિન $\xrightarrow{286K}$ ભૂખરું ટિન

(β-ટિન) (α-ટિન)

● ઓક્સિડેશન અવસ્થા અને રાસાયણિક સક્રિયતા :

C અને Siની ઓક્સિડેશન અવસ્થા +4, Ge, Sn અને Pb +4 ઉપરાંત +2 અવસ્થા ધરાવે છે.

● Ge < Sn < Pb +2 અવસ્થાનું સ્થાયિત્વ દર્શાવે છે.

આ સમૂહનાં તત્વોના M⁴⁺ આયનો જાણીતા નથી.

● +4થી વધુ સવર્ગીક ધરાવતાં સંયોજનો બનાવે છે.

[SiF₅]⁻, [SiF₆]²⁻, [PbCl₆]²⁻

● C અને Siના MX₂ દુર્લભ પરંતુ Ge < Sn < Pb ચઢતા ક્રમમાં

● પોતાના જ પરમાણુ સાથે p^π – p^π બંધ બનાવવાની ક્ષમતા અને N₂ અને O₂ જેવા અન્ય સાથે C થી Pb તરફ જતાં બંધ બનાવવાની સમતા ઘટતી જાય છે. CO₂ વાયુ છે. SiO₂ ધન છે.

MX₄ પ્રકારના ટેટ્રાહેલાઈડનું આયનીય લક્ષણ અને ઉષ્મીય સ્થાયિતા હેલોજનનો પરમાણુ-ક્રમાંક વધતાં ઘટે છે અને પાણી સાથે જળવિભાજન પામે છે.

SiCl₄ + 4H₂O → Si(OH)₄ + 4HCl

SnCl₄ + 2H₂O → SnO₂ + 4HCl

Ge, Sn અને Pbના MX₂ પ્રકારના હેલાઈડની સ્થાયિતા

CX₂ << SiX₂ << GeX₂ << SnX₂ < PbX₂


MO₂ પ્રકારના ઓક્સાઈડ બનાવે છે.

સ્ફટિકમય SiO_2 ક્વાર્ટ્ઝનો ઉપયોગ દાબ વૈદ્યુત સ્ફટિક તરીકે, સ્ફટિક આંદોલક તરીકે અને ટ્રાન્સડ્યુસરમાં થાય છે. સોડિયમસિલિકેટને એસિડિક બનાવી સિલિકાજેલ મેળવવામાં આવે છે. જેનું નિર્જલીકરણ કરવાથી સિલિકાજેલનો ઉપયોગ કોમેટોગ્રાફી, પદાર્થોની સુકવણી અને ભેજશોષક તરીકે થાય છે.

SiO_2 એસિડિક છે, GeO_2 અને SnO_2 ઉભયગુણી છે અને PbO_2 બેઝિક છે.

Sn ને O_2 સાથે ગરમ કરતાં અથવા સંકેન્દ્રિત HNO_3 સાથે પ્રક્રિયા કરીને SnO_2 બનાવવામાં આવે છે.

SnO_2 પોલિશિંગ પાઉડર તરીકે તથા કાચ અને માટીનાં વાસણો બનાવવામાં વપરાય છે.



PbO_2 ઓક્સિડેશનકર્તા છે. એસિડ સાથે તેમાંથી O_2 છૂટો પાડે છે. Sn અને Pb , MO પ્રકારના ઓક્સાઇડ બનાવે છે.



ટિન ઓક્સેલેટ

PbO નો રંગ રાતો, નારંગી અથવા પીળો તેની બનાવટની રીત પર આધારિત છે. PbCO_3 ને ગરમ કરી તે બનાવી શકાય છે. PbO ને હવા સાથે પરાવર્તની (રેવરબંટરી) ભટ્ટીમાં 773 K તાપમાને ગરમ કરવાથી Pb_3O_4 મળે છે, જે $[2(\text{PbO})(\text{PbO}_2)]$ નું સંયોગી મિશ્રણ છે.

● કાર્બનના ગુણધર્મોની અનિયમિતતા

કાર્બન પરમાણુનું કદ નાનું, વિદ્યુતઋણતા ઊંચી, આયનીકરણ એન્થાલ્પી વધારે અને ઇલેક્ટ્રોનીય રચનામાં d પ્રકારની કક્ષકનો અભાવ છે. તેથી સમૂહના અન્ય તત્ત્વથી જુદું પડે છે.

કાર્બન ચાર સહસંયોજક બંધ બનાવે છે, જ્યારે અન્ય તત્ત્વોમાં d અથવા d અને f કક્ષકો હોવાથી 5 કે 6 (વધુ) સહસંયોજક બંધ બનાવી શકે છે.

કાર્બન બીજા કાર્બન પરમાણુ સાથે એકલબંધ ઉપરાંત દ્વિબંધ અને ત્રિબંધ રચી શકે છે, જ્યારે અન્ય તત્ત્વોના પરમાણ્વિય કદ મોટા હોવાથી $p\pi - p\pi$ કક્ષક સંમિશ્રણ અસરકારક હોતા નથી.

કાર્બનમાં C – C એકલબંધ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય (348 KJ mole^{-1}) વધુ હોવાથી કેટેનેશનનું વલણ મહત્તમ હોય છે, જ્યારે અન્ય તત્ત્વોમાં આ વલણ ઘટતું જાય છે.

કાર્બન ફક્ત $p\pi . p\pi$ પ્રકારના બંધ બનાવે છે, જ્યારે અન્ય તત્ત્વો $p\pi . p\pi$ ઉપરાંત $d\pi . p\pi$ પ્રકારના બંધ પણ બનાવે છે.

29. સમૂહ-14નાં તત્ત્વો માટે આયનીકરણ એન્થાલ્પીનો સાચો ક્રમ કયો છે ?

(A) $\text{C} > \text{Si} > \text{Ge} > \text{Sn} < \text{Pb}$

(B) $\text{C} > \text{Si} > \text{Ge} > \text{Sn} > \text{Pb}$

(C) $\text{C} < \text{Si} < \text{Ge} < \text{Sn} > \text{Pb}$

(D) $\text{C} < \text{Si} < \text{Ge} < \text{Sn} < \text{Pb}$

30. નીચેના પૈકી ઉષ્મીય સ્થિરતા કોની સૌથી વધુ છે ?

(A) CCl_4

(B) SiCl_4

(C) SnCl_4

(D) PbCl_4

31. SnO ની બનાવવા માટે કોને ગરમ કરવામાં આવે છે ?

(A) ટિન ઓક્સેલેટ

(B) ટિન કાર્બોનેટ

(C) ટિન બાયકાર્બોનેટ

(D) ટિન ડાયોક્સાઇડ

32. લેડ ટેટ્રાક્લોરાઇડના જળ-વિભાજનથી નીચેના પૈકી શું મળશે ?

(A) PbO

(B) PbO_2

(C) Pb_3O_4

(D) $\text{Pb}(\text{OH})_2$

33. ટિનની ગરમ સાંદ્ર HNO_3 સાથેની પ્રક્રિયાથી બને છે.

(A) $\text{Sn}(\text{NO}_3)_2$

(B) H_2SnO_3

(C) Na_2SnO_3

(D) Na_2SnO_2

34. લેડનો ઓક્સાઇડ કે જેનો સ્ત્રીઓ સિંદુર તરીકે ઉપયોગ કરે છે. તેનું સૂત્ર કયું છે ?

- (A) PbO (B) PbO₂ (C) Pb₃O₄ (D) Pb₂O₃

35. મેટા સ્ટેનિક એસિડનું અણુસૂત્ર કયું છે ?

- (A) H₂SnO₃ (B) HSnO₂ (C) H₄SnO₃ (D) H₂SnO₂

જવાબો : 29. (A), 30. (A), 31. (A), 32. (B), 33. (B), 34. (C), 35. (A)

● કાર્બન કેટેનેશન

એક કાર્બન પરમાણુ બીજા કાર્બન પરમાણુ સાથે સહસંયોજક બંધથી જોડાઈને કાર્બનની શૃંખલા કે ચક્રિય રચનામાં જોડાવાના વલણને કેટેનેશન કહે છે.

કાર્બન પરમાણુના નાના કદ અને ઊંચી વિદ્યુતઋણતાના કારણે આ વલણ માલૂમ પડે છે. કેટેનેશનનો આધાર બે કાર્બન પરમાણુ વચ્ચે રચાતાં સહસંયોજક બંધની એન્ટાલ્પી પર છે. જેમ બંધ એન્ટાલ્પી વધુ તેમ કેટેનેશનનું વલણ વધુ થાય. C—C બંધઊર્જા 348 KJ.mol⁻¹ છે. જે તેના સમૂહમાં આવેલા તત્ત્વોની બંધઊર્જા કરતાં મહત્તમ હોવાથી કાર્બન સરળ શૃંખલા તેમજ ચક્રીય રચના ધરાવતા અસંખ્ય સંયોજનો બનાવે છે. કેટેનેશન અને pπ — pπ બંધ નિર્માણના કારણે કાર્બનમાં વિવિધ અપર રૂપો જોવા મળે છે.

(1) હીરો : sp³ સંકરણ, સમયતુષ્ફલકીય, ત્રિપરિમાણીય જાળીદાર રચના, કાર્બન પરમાણુ વચ્ચેનું અંતર 154 pm, મજબૂત બંધ તેથી કઠણ ઘન પદાર્થ.

(2) ગ્રેફાઈટ : sp² સંકરણ, ષટ્કોણીય સ્તરિય રચના, કાર્બન પરમાણુ વચ્ચેનું અંતર 141.5 pm, બે સ્તર વચ્ચેના નિર્બળ વાનડરવાન આકર્ષણને લીધે અંતર 340 pm, તેથી ગ્રેફાઈટ મૃદુ છે.

(3) ફૂલેરિન : કાર્બનનું સ્ફટિકમય સ્વરૂપ જે છિદ્રાળુ પિંજર જેવા અણુનું બનેલું છે. તે C_{2n} બંધારણ ધરાવે છે. C₆₀ અને C₇₀ અલ્પ માત્રામાં બેકી નંબર ધરાવતા 350 કે તેથી વધુ કાર્બન પરમાણુ ધરાવતા બીજા ફૂલેરિન મળે છે. C₆₀નો આકાર સોકરબોલ જેવો છે તેને બક મિનિસ્ટર પણ કહે છે. ફૂટબોલ જેવો આકાર તેથી બકી બોલ પણ કહે છે. તેમાં પાંચ કાર્બન પરમાણુવાળા બાર વલયો અને છ કાર્બન પરમાણુવાળા વીસ વલયો હોય છે. કાર્બનયુક્ત વલયરચના બંને પ્રકારની વલયરચના સાથે જોડાયેલી હોય છે. જ્યારે પાંચ કાર્બનયુક્ત વલયરચના માત્ર છ કાર્બનયુક્ત વલયરચના સાથે જ જોડાયેલી હોય છે. કાર્બન sp² સંકરણમાં દરેક કાર્બન બીજા ત્રણ કાર્બન પરમાણુ સાથે σ-બંધથી જોડાય છે અને બાકી રહેલ ઇલેક્ટ્રોન π-બંધ બનાવે છે.

એક બંધ અને દ્વિબંધનું મૂલ્ય અનુક્રમ 143.5 pm અને 138.3 pm છે. C₆₀ અને C₇₀ ફૂલેરિન ટોલ્યુઈન દ્રાવકમાં થઈ અનુક્રમે જાંબલી અને નારંગી લાલ રંગનાં દ્રાવણો આપે છે.

● કાર્બનના રાસાયણિક ગુણધર્મો

ઑક્સિજન સાથે $C + O_2 \rightarrow CO_2$ + ઊર્જા



રિડક્શન કાર્ય : $Pb_3O_4 + 3C \rightarrow 2Pb + 3CO$

$PbSO_4 + 4C \rightarrow 4CO + PbS$

$C + H_2O \rightarrow CO + H_2$

અન્ય તત્ત્વો સાથે : $C + 2S \rightarrow CS_2$ (કાર્બન ડાયસલ્ફાઈડ)

$2C + H_2 \xrightarrow{\text{વિદ્યુતચાપ}} C_2H_2$ (એસિટિલિન)



(મેલિટિક એસિડ)

● કાર્બનનાં સંયોજનોનો ઉપયોગ

કાર્બનનાં હેલાઇડ : $\text{CF}_4 > \text{CCl}_4 > \text{CBr}_4 > \text{CI}_4$ (સ્થિરતાક્રમ) અગ્નિસમનમાં તથા રિયોન રેફ્રિજરેટરમાં શિતક તરીકે ઉપયોગી. CCl_4 આંતરડામાં થતા કૃમિ. અટકાવવા ઉપયોગી.

કાર્બન ડાયસલ્ફાઇડ (CS_2) : વિસ્કોષ રેષા, સડી ગયેલા અનાજનો સડો દૂર કરવા જંતુનાશક તરીકે, રબર વલ્કેનાઇઝેશનમાં, દીવાસળી અને રંગના ઉત્પાદનમાં, CCl_4 ના ઉત્પાદનમાં ઉપયોગી.







કાર્બાઇડ સંયોજનો : કાર્બન તેના કરતાં વધુ વિદ્યુતધનમયતા ધરાવતાં તત્ત્વો સાથેનાં સંયોજનોને કાર્બાઇડ સંયોજનો કહે છે. કાર્બોરેન્ડમ (SiC) અપઘર્ષક તરીકે, ધાર કાઢવા અને દળવા માટે ઘંટીઓમાં તેમજ ઉચ્ચ તાપસહ તરીકે વપરાય છે.

WC : હથિયાર કે ઓજાર બનાવવા તેમજ સિક્કાનાં બીબાંની બનાવટમાં વપરાય છે. CaC_2 એસિટિલિનવાયુની બનાવટમાં અને તેનો ઉપયોગ આરણકામ (વેલ્ડિંગ)માં થાય છે. એસિટિક એસિડ અને ઇથેનોલની બનાવટમાં થાય છે.


Be_4C : ઘણો સખત પદાર્થ-રેડિયોએક્ટિવ વિકિરણોને અટકાવવાના આવરણ પડ તરીકે વપરાય છે.

● કાર્બનના ઓક્સાઇડ


● કાર્બન મોનોક્સાઇડ (CO) :




ગુણધર્મો : રિડક્શનકર્તા તરીકે $\text{ZnO} + \text{CO} \rightarrow \text{Zn} + \text{O}_2$



ધાતુકાર્બોનિલ બનાવવા



નિકલ ટેટ્રા કાર્બોનિલ






આયર્ન પેન્ટાકાર્બોનિલ

● ઉપયોગ

ધાતુ નિષ્કર્ષણમાં $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \rightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$


- મોન્ટકાર્બોનિલ પદ્ધતિમાં
- જળવાયુ કે ઉત્પાદક વાયુની બનાવટમાં
- મિથેનોલ અને ફોર્મિક એસિડની બનાવટમાં
- મેગ્નેટિક ટેપ (આયર્ન કાર્બોનિલ)-ટેપરેકોર્ડરમાં વપરાય છે.

● કાર્બન ડાયોક્સાઇડ (CO_2)




લાઈમ



(ચૂનો)




ગુણધર્મો : હવા કરતાં 1.5 ગણો ભારે, ઝેરી નથી, પરંતુ O_2 ની ઊણપને કારણે CO_2 ની વિશેષ હાજરીમાં પ્રાણી મૃત્યુ પામે છે. ઘન CO_2 (સૂકો બરફ) તરીકે ઓળખાય છે.




CO_2 એસિડીક છે. પાણીમાં અલ્પ દ્રાવ્ય-કાર્બોનિક એસિડ H_2CO_3 સોડા વોટર) બનાવે છે.



ચૂનાના નિતર્યા પાણીને દૂધિયું બનાવે છે.



કેલ્શિયમ હાઈડ્રોજન સલ્ફેટ



ઉપયોગ : કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં શીતક તરીકે અગ્નિસમનમાં, સોડા વોટર, ઠંડાં પીણાંની બનાવટમાં, ધોવાના સોડાની બનાવટની સોલ્વે પદ્ધતિમાં વપરાય છે. દાઝેલા અને ચામડી પર ઉઝરડાની સારવાર માટે સૂકો બરફ ($\text{CO}_{2(s)}$) વપરાય છે. CO_2 ની ઝેરી અસરના ભોગ બનેલા દર્દીને કૃત્રિમ શ્વાસોચ્છવાસ માટે કાર્બોજન (95 % O_2 + 5 % CO_2) ઉપયોગી છે. શેરડીના રસના શુદ્ધીકરણમાં (ખાંડની બનાવટ), પ્રકાશસંશ્લેષણમાં, લોહીનો pH (7.26 થી 7.42) નિયંત્રિત રાખવા માટે બફર પ્રણાલી ($\text{H}_2\text{CO}_3 + \text{HCO}_3^-$)માં ઉપયોગી. યુરિયા જેવા ખાતરની બનાવટમાં વપરાય છે.

36. હીરા અને ગ્રેફાઈટમાં બે કાર્બન-કાર્બન પરમાણુ વચ્ચેના અંતરનો તફાવત છે.
(A) 154 pm (B) 141.5 pm (C) 12.5 pm (D) 20 pm
37. કુલેરિનમાં પાંચ કાર્બનવાળા વલયોની સંખ્યા અને છ કાર્બન પરમાણુવાળા વલયોની સંખ્યા હોય છે.
(A) 12, 20 (B) 6, 8 (C) 7, 14 (D) 6, 10
38. C_{60} અને C_{70} ટોલ્યુઈન દ્રાવકમાં ઓગળી અનુક્રમે કયા રંગનાં જલીય દ્રાવણો આપે છે ?
(A) જાંબલી, નારંગી લાલ (B) વાદળી, જાંબલી (C) લાલ, વાદળી (D) પીળો, નારંગી
39. $12\text{C} + 9\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \boxed{\text{X}} + 6\text{H}_2\text{O} + 9\text{SO}_2$ આપેલી પ્રક્રિયામાં $\boxed{\text{X}}$ શું છે ?
(A) મેલિટિક એસિડ (B) સલ્ફ્યુરિક એસિડ (C) ફોર્મિક એસિડ (D) એસિટિક એસિડ
40. આંતરડામાં થતા કૃત્રિમ અટકાવવા શેનો ઉપયોગ થાય છે ?
(A) CO_2 (B) CCl_4 (C) CF_2Cl_2 (D) CHCl_3
41. ફળો શેની હાજરીમાં ઝડપથી પાકી જાય છે ?
(A) Na_2SO_4 (B) NaCl (C) CaC_2 (D) CaCl_2
42. રેડિયો સક્રિય વિકિરણોને અટકાવવા માટે આવરણ-પડ તરીકે શેનો ઉપયોગ થાય છે ?
(A) WC (B) CaC_2 (C) SiC (D) Be_4C
43. COની ઝેરી અસરના ભોગ બનેલા દર્દીને કૃત્રિમ શ્વાસોચ્છવાસની પ્રક્રિયા માટે ઉપયોગી કાર્બોજનમાં વાયુમિશ્રણનું પ્રમાણ કેટલું હોય છે ?
(A) 95 % O_2 + 5 % CO_2 (B) 5 % O_2 + 95 % CO_2 (C) 95 % O_2 + 5 % N_2 (D) 5 % O_2 + 95 % N_2

જવાબો : 36. (C), 37. (A), 38. (A), 39. (A), 40. (B), 41. (C), 42. (D), 43. (A)

● સિલિકોનનાં અગત્યનાં સંયોજનો

(1) સિલિકોન હાઈડ્રાઈડ : $\text{Si}_n \text{H}_{2n+2}$ જ્યાં $n = 1$ થી 8

Si – Si બંધ એન્થાલ્પી 297 K.J.mole⁻¹, કેટેનેશનનો ગુણ સિલેન સંયોજનો. C કરતાં Siના હાઈડ્રાઈડની સ્થિરતા ઓછી તેથી રિડક્શન કરવાની શક્તિ વધુ હોય છે.




(2) સિલિકોન ડાયોક્સાઈડ (સિલિકા SiO_2) :

SiO_2 સ્વતંત્ર એક અણુ સ્વરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવતો નથી પરંતુ અસંખ્ય પરમાણુઓની ગોઠવણીથી વિરાટ સ્ફટિક રચાય છે. શુદ્ધ સિલિકાના બાવીસ કરતાં વધુ વિવિધ સ્વરૂપો જાણીતાં છે.

સ્ફટિકમય → ક્વાર્ટઝ, ગ્રાયડાયમાઈટ, ક્રિસ્ટોબેલાઈટ



અસ્ફટિકમય → સિલિકા જેલ અને કેસેલ ગુર

SiO₂ એસિડિક હોવાથી સિલિકેટ સંયોજનો આવે છે.



● ઉપયોગ


- દાબ વૈદ્યુતસ્ફટિક તરીકે, સ્ફટિક આંદોલક તરીકે અને ટ્રાન્સડ્યુસર તરીકે ઉપયોગી.
- કાચનાં સાધનો અને લેન્સ, પ્રિઝમ જેવાં પ્રકાશિય ઉપકરણોની બનાવટમાં.
- પારજાંબલી સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટરના સેમ્પલ કોષમાં.
- સિલિકાજેલ સ્વરૂપે સૂકવણીકારક (ભેજશોષક), કોમેટોગ્રાફીમાં અધિશોષક તરીકે.
- ઉદ્દીપક અને પાણીની શુદ્ધીકરણ યોજનામાં કેસેલ ગુર સ્વરૂપે વપરાય છે.
- સિલિકોન ટેટ્રાક્લોરાઈડ (SiCl₄) [Si sp³ સંકરણમાં હોવાથી સમચતુષ્ફલકીય]



સિલિકા એસિડ

સિલિકોન્સ : સાંશ્લેષિત પદાર્થ છે, બહુલક છે. R₂SiO એકમ પુનરાવર્તિત થાય છે. સામાન્ય સૂત્ર (R₂SiO)_n જ્યાં R = આલ્કાઈલ કે એરાઈલ સમૂહ તેનું પ્રમાણસૂચક સૂત્ર R₂SiO કિટોન (R₂CO) જેવું હોવાથી તેને સિલિકોન્સ કહે છે.

● બનાવટ




ડાયમિથાઈલ

ડાયમિથાઈલ સિલેનોલ

ક્લોરોમિથેન

(CH₃)₃ SiCl ઉમેરીને બહુલકની શૃંખલા લંબાઈ નિયંત્રિત કરી શકાય છે.



ગુણધર્મો : શૃંખલા સ્વરૂપ

(1) નાની → તૈલી પ્રવાહી

(2) મધ્યમ → સ્નિગ્ધ તેલ, જેલી અને ગ્રીઝ તરીકે

(3) મોટી → રબરયુક્ત ઇલેસ્ટોમર અને રેઝિન

ઑક્સિડેશન, ઉષ્મીય વિમંજન અને કાર્બનિક પ્રક્રિયકોનો પ્રતિકાર કરે છે તેથી રાસાયણિક રીતે નિષ્ક્રિય છે.

ઉષ્મારોધક અને વિદ્યુત અવાહક છે. પાણી પ્રત્યે અપાકર્ષક છે.

ઉપયોગ : જલાબેદ (Waterproof) બનાવવા તેનું પાતળું પડ વપરાય છે. સિલન્ટ (Sealant) ઇલેક્ટ્રિક વીજરોધક તરીકે, ઊંચા અને નીચા તાપમાને ઊંજણ તરીકે, શલ્યારોપણ, સૌંદર્ય પ્રસાધનોમાં ફીણ-અવરોધક (એન્ટિફોર્મિંગ એજન્ટ) તરીકે વપરાય છે.

સિલિકેટનું બંધારણ : પૃથ્વીના પોષકમાં 95 % ભાગ સિલિકા અને સિલિકેટ સંયોજનોનો બનેલો છે. $[\text{SiO}_4]^{4-}$ અથવા તો આવાં આયનોના જોડાણથી બનતા સંયુક્ત સિલિકેટ આયનોનું Na^+ , K^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+} જેવાં ધન આયનો દ્વારા વીજભાર સમભારિત કરવા જોડાઈને બનતાં સંયોજનો છે. $[\text{SiO}_4]^{4-}$ સમચતુષ્ફલકીય મૂળભૂત એકમ છે.

એક $[\text{SiO}_4]^{4-}$ આયન ચતુષ્ફલકીય બંધારણના કેટલા ખૂણા (0, 1, 2, 3, 4) બીજા કેટલા ચતુષ્ફલકો સાથે ભાગીદારી કરે છે તેના આધારે વર્ગીકરણ પામે છે. ત્રિપરિમાણીય SiO_2 માંના Si^{4+} નું Al^{3+} દ્વારા આંશિક વિસ્થાપન કરવાથી એલ્યુમિનો સિલિકેટ (ફેલ્ડસ્પાર) બને છે. ઝિઓલાઈટ નામનો એલ્યુમિનો સિલિકેટ SiO_4^{4-} તથા AlO_4^{5-} ચતુષ્ફલકીય સ્વરૂપે ત્રિપરિમાણીય નેટવર્ક (ગૂંથણી) બનાવે છે.

SiO_4^{4-} ના ખૂણાની ભાગીદારી	સિલિકેટનો પ્રકાર	ઋણ આયન એકમ	ઉદાહરણ
0	ઓર્થોસિલિકેટ	SiO_4^{4-}	ઝિરકોન (ZrSiO_4), ફોસ્ફોરેટ (Mg_2SiO_4)
1	પાયરોસિલિકેટ	$\text{Si}_2\text{O}_7^{6-}$	થાર્ટવેટાઈટ ($\text{Sc}_2\text{Si}_2\text{O}_7$) હેમિમોરફાઈટ $\text{Zn}_2\text{Si}_2\text{O}_7$, $\text{Zn}(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$
2	ચક્રિય સિલિકેટ રિંગ સિલિકેટ શૃંખલા સિલિકેટ (A) રેખીય જોડાણ શૃંખલા (B) વિપરિત જોડાણ શૃંખલા	$\text{Si}_3\text{O}_9^{6-}$ $\text{Si}_6\text{O}_{18}^{12-}$ $(\text{SiO}_3^{2-})_n$ અથવા $(\text{SiO}_3^{2-})_n^{n-}$ $(\text{Si}_4\text{O}_{11}^{6-})_n$	વોલ્સ્ટોનાઈટ $\text{Ca}_2\text{Si}_3\text{O}_9$ બેરિલ (પન્ના) $\text{Be}_3\text{Al}_2\text{Si}_6\text{O}_{18}$ સ્પોડ્યુમીન $\text{LiAl}(\text{SiO}_3)_2$ ડાયોસ્પાઈડ $\text{CaMg}(\text{SiO}_3)_2$ ટ્રીમોલાઈટ $\text{Ca}_2\text{Mg}_5(\text{Si}_8\text{O}_{22})(\text{OH})_2$ એસબેસ્ટોસ
3	સ્ટરિય સિલિકેટ	$(\text{Si}_2\text{O}_5)_n^{2n-}$ અથવા $(\text{Si}_2\text{O}_5^{2-})_n$	સ્ટીએરાઈટ $\text{Mg}_3(\text{Si}_4\text{O}_{10})(\text{OH})_2$ (શંખજીર) મ્યુસ્કોરાઈટ $\text{KAl}_2(\text{Si}_3\text{AlO}_{10})(\text{OH})_2$ (ચિનાઈ માટી)
4	ત્રિપરમાણિય	SiO_2	ફેલ્ડસ્પાર, ઝિઓલાઈટ, ક્વાર્ટઝ ટ્રાયકાઈમાઈટ ક્રિસ્ટોબેલાઈટ

● ઝિઓલાઈટના ઉપયોગ

આણ્વિય ચાળણી તરીકે મોટા અણુઓમાંથી નાના અણુઓ જુદા પાડવા માટે, ઉદ્દીપક (આકાર વરણાત્મક ઉદ્દીપક) તરીકે ZSM 5 પેટ્રોરસાયણમાં અગત્યના ઉદ્દીપક તરીકે, જે આલ્કોહોલનું સીધું જ ગેસોલીન (પેટ્રોલ)માં ફેરવે છે.

44. સિલિકોન ટેટ્રાક્લોરાઈડનું જળવિભાજન થતાં શું બને છે ?

- (A) $\text{Si}(\text{OH})_4$ (B) $(\text{CH}_3)_2\text{Si}(\text{OH})_2$ (C) $\text{Si}(\text{OH})_2\text{Cl}_2$ (D) એક પણ નહિ.

45. સિલિકોન્સનું સામાન્ય સૂત્ર કયું છે ?

- (A) SiO_4^{4-} (B) $\text{Si}_2\text{O}_7^{6-}$ (C) $(\text{R}_2\text{SiO})_n$ (D) $(\text{SiO}_3)_n^{2n-}$

46. યોગ્ય જોડકું જોડો :

કાય	સંઘટકો
(P) પોટાશ કાય	(T) CeO_2
(Q) ફ્લિન્ટ કાય	(U) $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{B}_2\text{O}_3 \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$
(R) પાયરેક્ષ કાય	(V) $\text{K}_2\text{O} \cdot \text{PbO} \cdot 6\text{SiO}_2$
(S) ક્રુક કાય	(W) $\text{K}_2\text{SiO}_3 \cdot \text{CaSiO}_3 \cdot 4\text{SiO}_2$

- (A) (P)-(W), (Q)-(V), (R)-(U), (S)-(T)
 (B) (P)-(T), (Q)-(W), (R)-(V), (S)-(U)
 (C) (P)-(U), (Q)-(T), (R)-(W), (S)-(V)
 (D) (P)-(V), (Q)-(U), (R)-(T), (S)-(W)

47. નીચે પૈકી 'કાય ખાઈ જનાર' તરીકે કોણ ઓળખાય છે ?

- (A) HBr (B) HI (C) HCl (D) HF

48. બેરિલ (પન્નારત્ન)માં ઋણ આયન એકમ કયો હોય છે ?

- (A) $\text{Si}_2\text{O}_7^{6-}$ (B) $\text{Si}_3\text{O}_9^{6-}$ (C) $\text{Si}_6\text{O}_{18}^{12-}$ (D) $(\text{Si}_4\text{O}_{11})_n^{6-}$

49. ચિનાઈ માટીમાં ઋણ આયન એકમ કયો હોય છે ?

- (A) $(\text{Si}_2\text{O}_5^{2-})_n$ (B) $\text{Si}_2\text{O}_7^{6-}$ (C) $\text{Si}_6\text{O}_{18}^{12-}$ (D) $\text{Si}_3\text{O}_9^{6-}$

50. નીચે પૈકી કયું 'બટર ઓફ ટીન' તરીકે ઓળખાય છે ?

- (A) $\text{SnCl}_2 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (B) $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (C) $\text{SnCl}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (D) $\text{SnCl}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

જવાબો : 44. (A), 45. (C), 46. (A), 47. (D), 48. (C), 49. (A), 50. (D)

● નાઈટ્રોજન સમૂહ

● સમૂહ-15માં તત્વો, તેની ખનિજો, પ્રાપ્તિસ્થાન અને e^- રચના :

તત્વનું નામ	સંજ્ઞા	પરમાણ્વિક ક્રમાંક	e^- રચના	ખનિજો અને પ્રાપ્તિ સ્થાન
નાઈટ્રોજન (અધાતુ)	N	7	$1s^2 2s^2 2p^3$ અથવા $[\text{He}] 2s^2 2p^3$	● N વાયુ હવામાં 78 % ● વનસ્પતિજન્ય અને પ્રાણીજન્ય પ્રોટીનમાં 17 % ● પૃથ્વીના પોપડામાં નાઈટ્રેટ ક્ષાર સ્વરૂપે મળી આવે છે. ● NaNO_3 ચિલી સોલ્ટપીટર ● KNO_3 ઈન્ડિયન સોલ્ટ પીટર ● પોટેશિયમ નાઈટ્રેટ (સુરોખાર)
ફોસ્ફરસ (અધાતુ)	P	15	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ અથવા $[\text{Ne}] 3s^2 3p^3$	● એપેટાઈટ ખનિજો સ્વરૂપે સામાન્ય સૂત્ર ↓ $\text{Ca}_9(\text{PO}_4)_6 \cdot \text{CaX}_2$ (X = F, Cl, OH)

				ફ્લોર એપેટાઈટ $\text{Ca}_9(\text{PO}_4)_6 \cdot \text{CaF}_2$ $[3\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{CaF}_2]$ ક્લોર એપેટાઈટ $\text{Ca}_9(\text{PO}_4)_6 \cdot \text{CaCl}_2$ $[3\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{CaCl}_2]$ હાઈડ્રોક્સિ એપેટાઈટ $\text{Ca}_9(\text{PO}_4)_6 \cdot \text{Ca}(\text{OH})_2$ અથવા $[3\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{Ca}(\text{OH})_2]$ હાડકાં અને દાંતમાં કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ 60 % $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ ઈંડા અને દૂધમાં ફોસ્ફોપ્રોટીન
આર્સેનિક (અર્ધધાતુ)	As	33	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^3$ અથવા $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 4p^3$	As_4S_4 રીઅલ્ગર (જવાળામુખી પ્રદેશોમાં) As_2S_3 ઓપીમિન્ટ FeAsS આર્સેનો પાયરાઈટ
એન્ટિમની (અર્ધધાતુ)	Sb	51	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2$ $4p^6 4d^{10} 5s^2 5p^3$ અથવા $[\text{Kr}] 4d^{10} 5s^2 5p^3$	Sb_2S_3 સ્ટિબનાઈટ Sb_2O_4 એન્ટિમની ઓર
બિસ્મથ (ધાતુ)	Bi	83	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6$ $4d^{10} 4f^{14} 5s^2 5d^{10} 6s^2 6p^3$ અથવા $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^3$	Bi_2S_3 બિસ્મથાઈન Bi_2O_3 બિસ્માઈટ $(\text{BiO})_2\text{CO}_3$ બિસ્મથસ્પાર

સમૂહ 15નાં તત્વોની સંયોજકતા કક્ષાની e^- રચના $[\text{ns}^2] \text{np}^3$ છે. જેમાં s-કક્ષક સંપૂર્ણ ભરાયેલી અને p-કક્ષકો અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી હોવાથી આ તત્વો વિશેષ રીતે સ્થાયી છે.

● ઓક્સિડેશન અવસ્થા

- સમૂહ-15નાં તત્વોની સામાન્ય ઓક્સિડેશન અવસ્થા $-3, +3, +5$ છે.
- સમૂહમાં નીચે તરફ જતાં પરમાણ્વિક કદ અને ધાત્વીયગુણ વધવાને કારણે તત્વોનું $[-3]$ ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવવાનું

વલણ

તથા

$[+5]$ ઓક્સિડેશન અવસ્થાની સ્થાપિતા

ઘટે છે.

Imp $\Rightarrow$ $[N]$ તત્વ જ્યારે $[O]$ ઓક્સિજન તત્વ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે ત્યારે તે

$[+1]$ થી $[+5]$ ઓક્સિડેશન અવસ્થા દર્શાવે છે.

ઉદાહરણ :


NH ₃	NH ₂ ·NH ₂	NH ₂ OH	N ₂	N ₂ O	NO	N ₂ O ₃	NO ₂ OR N ₂ O ₄	N ₂ O ₅
-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5

• P તત્વ તેના ઓક્સિડેશનમાં +1, +3, +4, +5 ઓક્સિડેશન અવસ્થા દર્શાવે છે.

ઉદાહરણ :



(હાઈપો ફોસ્ફોરિક એસિડ) $\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_6 \rightarrow +4$



સમૂહ-15નાં તત્વોની ઓક્સિડેશન વ્યવસ્થા

N	-3 થી +5 (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5)
P, As	-3, +3, +5
Sb	+3, +5
Bi	+3

● સમૂહ-15ના ભૌતિક ગુણધર્મોમાં આવર્તિતા

સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં પરમાણુ-ક્રમાંક વધે તેમ....

- પરમાણ્વિય કદ વધે.
- આયનીકરણ એન્ટાલ્પી ઘટે.
- વિદ્યુતઋણતા ઘટે.
- ધાત્વિક ગુણ વધે.

સમૂહ-15માં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં

પરમાણ્વિય અને આયનીય ત્રિજ્યા

- વધે છે.
- N થી P તરફ જતાં વધારો નોંધપાત્ર પરંતુ As થી Bi તરફ થોડો વધારો. આમ થવાનું કારણ ભારે તત્વોમાં સંપૂર્ણ ભરાયેલી d અથવા/અને f કક્ષકની હાજરી છે. સમૂહ-15નાં તત્વો બહુપરમાણ્વિય છે.

આયનીકરણ એન્ટાલ્પી

- ઘટે છે.
- $\Delta_1 H_1$, $\Delta_1 H_2$, $\Delta_1 H_3$
- તત્વોમાં P-કક્ષકો અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી હોવાથી તેઓ વિશિષ્ટ સ્થાયિતા ધરાવે છે. (N_2 , P_4 , As_4 , Sb_4)

વિદ્યુતઋણતા

- ઘટે છે.
- ભારે તત્વોમાં તફાવત ઓછો.

● અપરરૂપો (Allotrop)


- N (નાઈટ્રોજન) અને Bi (બિસ્મથ) તત્વો અપર રૂપો ધરાવતાં નથી.
- P (ફોસ્ફરસ) ઋણ અપર રૂપો ધરાવે છે. (સફેદ, રાતો, કાળો)
- As (આર્સેનિક) અને એન્ટિમની (Sb) બે અપર રૂપો ધરાવે છે. (પીળો અને ભૂખરો)

● રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં આવર્તિતા


(1) હાઈડ્રોજન (H) તત્વ સાથે પ્રક્રિયા : બધાં તત્વો H સાથે પ્રક્રિયા કરી MH_3 પ્રકારના હાઈડ્રાઈડ બનાવે છે.

NH_3 એમોનિયા	PH_3 ફોસ્ફિન	AsH_3 આર્સિન	SbH_3 સ્ટીબાઈન	BiH_3 બિસ્મુથાઈન
બંધકોણ (107.8°)	(93.6°)	(91.8°)	(91.3°)	(90°)

NH_3 થી BiH_3 તરફ જતાં હાઈડ્રાઈડ સંયોજનોની સ્થાયિતા ઘટે છે અને બેઝિકતા ઘટે છે.




રિડક્શનકર્તા તરીકેનો ગુણધર્મ વધે છે.



Nનો વિશિષ્ટ હાઈડ્રાઈડ HN_3 (હાઈડ્રેઝોઈક એસિડ)

(2) ઓક્સિજન (O) તત્વ સાથે પ્રક્રિયા :

બે પ્રકારનાં ઓક્સાઈડ બનાવે



સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં એસિડિક ગુણધર્મ ઘટે છે.

ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતાં તત્વોના ઓક્સાઈડ, નીચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા કરતાં વધુ એસિડિક હોય છે.

ઉદાહરણ : $N_2O < NO < N_2O_3 < N_2O_4 < N_2O_5$ સૌથી વધુ એસિડિક
(+1) (+2) (+3) (+4) (+5)

M_2O_3 પ્રકારનાં,

[N] અને [P] નાં ઓક્સાઈડ $\rightarrow$ એસિડિક


[As] અને [Sb] નાં ઓક્સાઈડ $\rightarrow$ ઊભયગુણી

[Bi] નાં ઓક્સાઈડ $\rightarrow$ બેઝિક

નોંધ : અધાતુના ઓક્સાઈડ એસિડિક, ધાતુના બેઝિક અને અર્ધધાતુના ઊભયગુણી હોય.

ટ્રાયોક્સાઈડ માટે એસિડિકતાનો ક્રમ : $N_2O_3 > P_4O_6 > As_4O_6 > Sb_4O_6$. આ જ ક્રમ પેન્ટાક્સાઈડ માટે થાય છે.

(3) હેલોજન તત્વો સાથે પ્રક્રિયા :



પ્રકારનાં હેલાઈડ સંયોજનો બનાવે.

* [N] પરમાણુની સંયોજકતા કક્ષામાં d-કક્ષકો ન હોવાથી તે પેન્ટાહેલાઈડ સંયોજન બનાવી શકતો નથી.

* ટ્રાયહેલાઈડ કરતાં પેન્ટાહેલાઈડ વધુ સહસંયોજક છે.

* N (નાઈટ્રોજન) તત્વ સિવાયનાં તત્વોનાં બધા ટ્રાય હેલાઈડ સ્થાયી છે.

↓

Nનો ફક્ત [NF₃] સ્થાયી છે. ($\because$ N(75 pm) અને F(72 pm) કદ સમાન N – F બંધ વધુ મજબૂત)

* BiF_3 સિવાયનાં ટ્રાયહેલાઇડ સંયોજનો સહસંયોજક છે.

↓

(આયોનિક)

(4) ધાતુતત્વો સાથે પ્રક્રિયા :

દ્વિઅંગી સંયોજનો બનાવે છે.

- $\text{Ca}_3\text{N}_2 \rightarrow$ કેલ્શિયમ નાઇટ્રાઇડ
- $\text{Ca}_3\text{P}_2 \rightarrow$ કેલ્શિયમ ફોસ્ફાઇડ
- $\text{Na}_3\text{As} \rightarrow$ સોડિયમ આર્સેનાઇડ
- $\text{Zn}_3\text{Sb}_2 \rightarrow$ ઝિંક એન્ટિમોનાઇડ
- $\text{Mg}_3\text{Bi}_2 \rightarrow$ મેગ્નેશિયમ બિસ્મુથાઇડ

ઉપરનાં સંયોજનોમાં N, P, As, Sb, Biની ઓક્સિડેશન અવસ્થા -3 છે.

51. N તત્વ જ્યારે O તત્વ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે ત્યારે તે કઈ ઓક્સિડેશન અવસ્થા દર્શાવે છે ?
(A) +3 થી +5 (B) -3 થી +3 (C) +1 થી +5 (D) -3, +3, +5
52. સમૂહ-15ના તત્વો માટે તેના હાઇડ્રાઇડની બેઝિકતા માટે કયો ક્રમ સાચો છે ?
(A) $\text{SbH}_3 > \text{PH}_3 > \text{AsH}_3 > \text{NH}_3$ (B) $\text{NH}_3 > \text{SbH}_3 > \text{PH}_3 > \text{AsH}_3$
(C) $\text{NH}_3 > \text{PH}_3 > \text{AsH}_3 > \text{SbH}_3$ (D) $\text{SbH}_3 > \text{AsH}_3 > \text{PH}_3 > \text{NH}_3$
53. નીચે પૈકી નાઇટ્રોજનનો કયો ઓક્સાઇડ સૌથી વધુ એસિડિક છે ?
(A) N_2O_5 (B) N_2O_3 (C) N_2O_4 (D) NO
54. નીચેના ઓક્સાઇડ માટે એસિડિકતાનો સાચો ક્રમ કયો છે ?
(A) $\text{NO} < \text{N}_2\text{O} < \text{N}_2\text{O}_3 < \text{NO}_2 < \text{N}_2\text{O}_5$ (B) $\text{N}_2\text{O} < \text{NO} < \text{N}_2\text{O}_3 < \text{NO}_2 < \text{N}_2\text{O}_5$
(C) $\text{N}_2\text{O}_5 < \text{NO}_2 < \text{N}_2\text{O}_3 < \text{NO} < \text{N}_2\text{O}$ (D) $\text{N}_2\text{O}_5 < \text{N}_2\text{O}_3 < \text{NO}_2 < \text{NO} < \text{N}_2\text{O}$

જવાબો : 51. (C), 52. (C), 53. (A), 54. (B)

● નાઇટ્રોજન

ડાયનાઇટ્રોજન વાયુ (N_2)ની બનાવટ, ગુણધર્મો અને ઉપયોગો :

બનાવટ :

(1) હવાના પ્રવાહીકરણ અને વિભાગીય નિસ્યંદનથી (વ્યાપારી ધોરણે) :

N_2 નું ઉત્કલનબિંદુ 77.2K


અને

પ્રથમ N_2 મળે.

O_2 નું ઉત્કલનબિંદુ 90K

(2) પ્રયોગશાળામાં :

જલીય એમોનિયમ ક્લોરાઇડ (NH_4Cl) અને જલીય સોડિયમ નાઇટ્રાઇડ (NaNO_2) સાથેની પ્રક્રિયાથી.....




ખામી : પ્રક્રિયા દરમિયાન NO અને HNO₃ બને જેને દૂર કરવા ઉત્પન્ન થતા વાયુને K₂Cr₂O₇ અને જલીય H₂SO₄ના મિશ્રણમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે.

(3) એમોનિયમ ડાયક્રોમેટના વિઘટનથી :




(4) અતિશુદ્ધ ડાયનાઈટ્રોજન વાયુ મેળવવા :

બેરિયમ એઝાઈડ અથવા સોડિયમ એઝાઈડના ઉષ્મીય વિઘટનથી અતિશુદ્ધ ડાયનાઈટ્રોજન વાયુ મળે છે.



બેરિયમ એઝાઈડ

અથવા



સોડિયમ એઝાઈડ

ભૌતિક ગુણધર્મો

N₂ વાયુ

રંગવિહીન

સ્વાદવિહીન

બિનઝેરી

બે સ્થાયી સમસ્થાનિકો

¹⁴N, ¹⁵N

પાણીમાં


અલ્પદ્રાવ્ય

ઓરડાના


તાપમાને નિષ્ક્રિય

● રાસાયણિક ગુણધર્મો


- N₂ની ધાતુ સાથે ઊંચા તાપમાને પ્રક્રિયા કરતાં આયનીય નાઈટ્રાઈડ બને છે.



- N₂ની અધાતુ સાથે ઊંચા તાપમાને પ્રક્રિયા કરતાં સહસંયોજક નાઈટ્રાઈડ બને છે.




- N₂ની ડાયહાઈડ્રોજન સાથેની પ્રક્રિયા (હેબરવિધિ) :



FeO ઉદ્દીપક K₂O + Al₂O₃ પ્રવર્ધક તરીકે ઉમેરાય છે.

- N₂ની O₂ સાથેની પ્રક્રિયા :



ઉપયોગો :

- NH₃ વાયુના ઉત્પાદનમાં
- હવામાં O₂ની ક્રિયાશીલતા ઘટાડવા
- વિદ્યુતગોળામાં
- HNO₃ની બનાવટમાં
- ધાતુ કર્મવિધિમાં
- શીતક તરીકે

● નાઈટ્રોજનની અનિયમિત વર્તણૂક

- દ્વિ-પરમાણ્વિય અણુ (N_2) વાયુરૂપ, જ્યારે અન્ય તત્ત્વો M_4 અણુ તરીકે ઘન સ્વરૂપે.
- તે અપરરૂપો ધરાવતાં નથી, જ્યારે અન્ય તત્ત્વો ધરાવે છે. (અપવાદ Bi)
- તેના ટ્રાયોક્સાઈડ (N_2O_3) અને પેન્ટોક્સાઈડ (N_2O_5) એક આણ્વિય છે. જ્યારે અન્ય તત્ત્વોના દ્વિ-આણ્વીય છે.

(ઉદાહરણ : P_4O_6 , P_4O_{10})


- N_2 અધાતુ હોવાથી તેના ઓક્સાઈડ એસિડિક છે.
- NF_3 સિવાયના બીજા ટ્રાયહેલાઈડ વિસ્ફોટક છે.
- NH_3 બિનઝેરી છે. જ્યારે PH_3 , AsH_3 ઝેરી છે.
- નાનું કદ અને ઊંચી વિદ્યુત ઋણતાના લીધે $p\pi - p\pi$ બંધ બનવાનો ગુણ ધરાવે છે. જ્યારે અન્ય તત્ત્વોમાં આ ગુણ નથી.
- તેમાં d-કક્ષકો પ્રાપ્ય નથી. તેથી $d\pi - d\pi$ બંધ રચી શકતું નથી. જ્યારે અન્ય તત્ત્વો રચી શકે છે.

● નાઈટ્રોજન તત્ત્વનાં સંયોજનો



એમોનિયા (NH_3) :

બનાવટ :


(1) યુરિયા જેવા નાઈટ્રોજનયુક્ત કાર્બનિક પદાર્થના ક્ષયનથી.....



(2) એમોનિયમ ક્ષારની $NaOH$ કે $Ca(OH)_2$ સાથેની પ્રક્રિયાથી.....




(3) હેબર વિધિથી (ઔદ્યોગિક રીતે) :



[FeO] ઉદ્દીપકની સાથે $K_2O + Al_2O_3$ પ્રવર્ધક તરીકે વપરાય.

(4) મેગ્નેશિયમ નાઈટ્રાઈડનું જળવિભાજન કરવાથી.....




ભૌતિક ગુણધર્મો :

- રંગવિહીન તીવ્ર વાસવાળો વાયુ
- ત્રિકોણીય પિરામિડ આકાર (ટ્રાયગોનલ પિરામિડલ)
- ત્રણ બંધકારક એક અબંધકારક e^- યુગ્મ


રાસાયણિક ગુણધર્મો :

(1) એમોનિયા વાયુ પાણીમાં દ્રાવ્ય થઈ NH_4OH બનાવે છે.



બંધારણ :

આકૃતિ




● ભૌતિક ગુણધર્મો :

- રંગવિહિન પ્રવાહી
- વાયુ-અવસ્થામાં સમતલીય બંધારણ ધરાવે છે.

● રાસાયણિક ગુણધર્મો :


HNO_3 નું જલીય દ્રાવણ પ્રબળ એસિડ તરીકે વર્તે છે.







સાંદ્ર HNO_3 પ્રબળ ઓક્સિડેશનકર્તા છે. (ધાતુ સાથેની પ્રક્રિયા)

Cr, Al જેવી ધાતુઓ સાંદ્ર HNO_3 માં દ્રાવ્ય થતી નથી. ($\because$ ધાતુ પરનું નિષ્ક્રિય ઓક્સાઇડ પડ)

Au, Pt જેવી ધાતુ પ્રક્રિયા કરતી નથી.



ઉદાહરણ :






● અધાતુ સાથેની પ્રક્રિયા

અધાતુ તત્વોનું ઓક્સિડેશન ફક્ત સાંદ્ર HNO_3 વડે થાય છે.

યાદ રાખો :

- I_2 નું ઓક્સિડેશન $\rightarrow \text{HIO}_3$ (આયોડિક એસિડ)
- C નું ઓક્સિડેશન $\rightarrow \text{CO}_2$ (કાર્બન ડાયોક્સાઇડ)
- S_8 નું ઓક્સિડેશન $\rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$ (સલ્ફ્યુરિક એસિડ)
- P_4 નું ઓક્સિડેશન $\rightarrow \text{H}_3\text{PO}_4$ (ફોસ્ફોરિક એસિડ)





HNO_3 નું જલીય દ્રાવણ વીંટી કસોટી દર્શાવે છે.

NO_3^- આયન ધરાવતું જલીય દ્રાવણ વીંટી કસોટી આપે છે. (અકાર્બનિક પદાર્થના ગુણદર્શક પૃથક્કરણ)

● વીંટી કસોટી

બંને મિશ્રણ જે સ્થાને ભેગા થાય ત્યાં કથ્થાઈ રંગની વીંટી ‘નાઈટ્રોસો’ સંકીર્ણનો કારણે બને છે.



(કથ્થાઈ રંગ)

IUPAC નામ : પેન્ટા એક્વા નાઈટ્રોસોનિયમ આયર્ન (II) આયન



IUPAC નામ : પેન્ટા એક્વા નાઈટ્રોસોનિયમ આયર્ન (I)

NO_3^- આયન ધરાવતું જલીય દ્રાવણ + તાજું બનાવેલું FeSO_4 નું દ્રાવણ

HNO_3 નાં ઉપયોગો : એમોનિયમ નાઈટ્રેટ જેવા ખાતર બનાવવા.


TNT તથા નાઈટ્રોગ્લિસરિન જેવા વિસ્ફોટક પદાર્થોની બનાવટમાં.

રોકેટ બળતણમાં oxidation કર્તા તરીકે પણ ઉપયોગી છે.

નાઈટ્રોજનના ઓક્સાઈડનું નામ	આણ્વિક સૂત્ર	Nનો ઓ. આંક	નાઈટ્રોજનના ઓક્સાઈડ બનાવટની પદ્ધતિ	ભૌતિકસ્થિતિ અને સ્વભાવ
ડાય નાઈટ્રોજન ઓક્સાઈડ (નાઈટ્રોજન (I) ઓક્સાઈડ)	N_2O	+1	$\text{NH}_4\text{NO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{N}_2\text{O} + 2\text{H}_2\text{O}$	રંગવિહીન વાયુ, તટસ્થ
નાઈટ્રોજન મોનોક્સાઈડ (નાઈટ્રોજન (II) ઓક્સાઈડ)	NO	+2	-	રંગવિહીન વાયુ, તટસ્થ, અનુચુંબકીય
ડાય નાઈટ્રોજન ટ્રાયોક્સાઈડ (નાઈટ્રોજન (III) ઓક્સાઈડ)	N_2O_3	+3	$2\text{NO} + \text{N}_2\text{O}_4 \xrightarrow{250\text{K}} 2\text{N}_2\text{O}_3$	વાદળી રંગનો ઘન, એસિડિક
નાઈટ્રોજન ડાયોક્સાઈડ (નાઈટ્રોજન (IV) ઓક્સાઈડ)	NO_2	+4	$2\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 \xrightarrow{673\text{K}} 4\text{NO}_2 + 2\text{PbO} + \text{O}_2$	બદામી રંગનો વાયુ, એસિડિક, અનુચુંબકીય
ડાય નાઈટ્રોજન ટેટ્રાક્સાઈડ (નાઈટ્રોજન (IV) ઓક્સાઈડ)	N_2O_4	+4	$2\text{NO}_2 \xrightleftharpoons[\text{ગરમ}]{\text{ઠંડુ}} \text{N}_2\text{O}_4$	રંગવિહીન ઘન/પ્રવાહી એસિડિક
ડાયનાઈટ્રોજન પેન્ટોક્સાઈડ (નાઈટ્રોજન (V) ઓક્સાઈડ)	N_2O_5	+5	$4\text{HNO}_3 + \text{P}_4\text{O}_{10} \rightarrow 4\text{HPO}_3 + 2\text{N}_2\text{O}_5$	રંગવિહીન ઘન, એસિડિક

નાઈટ્રિક ઓક્સાઈડ (NO)માં એક અયુગ્મિત e^- ની હાજરીને કારણે પ્રવાહી સ્થિતિમાં તે આંશિક બહુલીકરણ પામે છે.

નાઈટ્રોજનના ઓક્સોએસિડ : નાઈટ્રોજનના ઓક્સાઈડની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી ઓક્સોએસિડ બને છે.



N_2O_3 એ HNO_2 (નાઈટ્રસ એસિડ)નો એનહાઈડ્રાઈડ છે.




N_2O_5 એ HNO_3 (નાઈટ્રિક એસિડ)નો એનહાઈડ્રાઈડ છે.

55. નીચે પૈકી સહસંયોજક નાઈટ્રાઈડ કયો છે ?
 (A) Li_3N (B) Mg_3N_2 (C) Ca_3N_2 (D) BN
56. NH_3 ઉત્પાદનની હેબરવિધિમાં પ્રવર્ધ તરીકે શું ઉમેરાય છે ?
 (A) $\text{K}_2\text{O} + \text{Al}_2\text{O}_3$ (B) $\text{CaO} + \text{NaOH}$ (C) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ (D) K_2CO_3
57. $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \xrightarrow{\Delta} x + y + 4\text{H}_2\text{O}_{(l)}$ આપેલી પ્રક્રિયામાં x અને y ને ઓળખો.
 (A) N_2 , Cr_2O_3 (B) NO , Cr_2O_3 (C) N_2O , CrO_2 (D) NO , Cr_2O_3
58. નીચે પૈકી કયો ઓક્સાઈડ નાઈટ્રિક એસિડનો એનહાઈડ્રાઈડ છે ?
 (A) N_2O (B) N_2O_3 (C) N_2O_4 (D) N_2O_5
59. ઓસ્વાલ્ડની પદ્ધતિની HNO_3 ની બનાવટમાં કયો ઉદ્દીપક વપરાય છે ?
 (A) $\text{Pt}(90\%) + \text{Rh}(10\%)$ (B) $\text{Pt}(10\%) + \text{Ag}(90\%)$
 (C) $\text{Pu}(90\%) + \text{Re}(10\%)$ (D) $\text{Pr}(90\%) + \text{Rh}(10\%)$
60. Cu ધાતુની નીચે પૈકી કોની સાથેની પ્રક્રિયાથી N_2O વાયુ ઉત્પન્ન થશે ?
 (A) મંદ HNO_3 (B) 10-30 % જલીય HNO_3 (C) સાંદ્ર HNO_3 (D) આપેલા બધા જ
61. HNO_3 ની I, S, P અને C સાથેની પ્રક્રિયાની અનુક્રમે શું મળે ?
 (A) HIO_3 , H_2SO_4 , H_3PO_4 , CO_2 (C) I_2O_5 , H_2SO_4 , H_3PO_4 , CO
 (B) HIO_3 , H_2SO_4 , H_3PO_3 , CO_2 (D) I_2O_5 , SO_2 , P_4O_{10} , CO_2
62. FeSO_4 નીચે પૈકી કોની સાથે પ્રક્રિયા કરી કથ્થઈ રંગની વીંટી બનાવે છે ?
 (A) NO_2 (B) N_2O_3 (C) N_2O_5 (D) NO
63. રોકેટ બળતણમાં ઓક્સિડેશનકર્તા તરીકે શું વપરાય છે ?
 (A) HNO_3 (B) H_2SO_4 (C) NO_2 (D) NaOH

જવાબો : 55. (D), 56. (A), 57. (A), 58. (D), 59. (A), 60. (A), 61. (A), 62. (D), 63. (A)

ફોસ્ફરસ અપર રૂપો

સફેદ (પીળો)	રાતો (લાલ)	કાળો
- ઝેરી, મીઠા જેવો સફેદ ઘન પદાર્થ - વિભિન્ન ચતુષ્ફલકીય P_4 અણુઓ - પાણીમાં અદ્રાવ્ય, CS_2માં દ્રાવ્ય - અંધારામાં ચળકે - ગલનબિંદુ 317K	- બનાવટ : સફેદ ફોસ્ફરસને હવાની ગેરહાજરીમાં 573K તાપમાને ગરમ કરવાથી બને. CS_2માં ઓછો દ્રાવ્ય અને ઓછો ક્રિયાશીલ - હવાના સંપર્કમાં સળગી ઊઠતો નથી. - ગલનબિંદુ 873K	- બે રૂપો જોવા મળે. (1) α-કાળો : - રાતા ફોસ્ફરસને બંધ નળીમાં 803K તાપમાને ગરમ કરવાથી (2) β-કાળો :



• અતિ ક્રિયાશીલ • હવામાં સળગી ઊઠે. પાણીમાં સંગ્રહ • સફેદ ફોસ્ફરસને હવાની ગેરહાજરીમાં 573K તાપમાને ગરમ કરવાથી તે વધુ સ્થાયી રાતા સ્વરૂપમાં ફેરવાય. • વધુ ક્રિયાશીલતા તેના અસાધારણ બંધારણને લીધે. • P_4 અણુમાં તણાવ • બંધકોણ 60° • P-P બંધ વળેલો • નબળો અને ક્રિયાશીલ • નિષ્ક્રિય વાતાવરણમાં ઉકળતા NaOH સાથેની રેડોક્ષ પ્રક્રિયાથી (PH_3) ફોસ્ફિન બને છે.  સફેદ (પીળો) ફોસ્ફરસ	 રાતો ફોસ્ફરસ	• સફેદ ફોસ્ફરસને ઊંચા દબાણે 473K તાપમાને ગરમ કરવાથી 
--	---	---

● ફોસ્ફરસનાં સંયોજનો


(1) ફોસ્ફીન (PH_3) :

બનાવટ :

(1) કેલ્શિયમ ફોસ્ફાઇડની પાણી અથવા મંદ HCl સાથે પ્રક્રિયા કરતાં ફોસ્ફિન મળે છે.



(2) પ્રયોગશાળામાં CO_2 ના નિષ્ક્રિય વાતાવરણમાં સફેદ ફોસ્ફરસની સાંદ્ર NaOH સાથે પ્રક્રિયા કરી ફોસ્ફિન બનાવાય છે.





ફોસ્ફિન સોડિયમ હાઇપો ફોસ્ફાઇટ

● ભૌતિક ગુણધર્મો


- ફોસ્ફિન રંગવિહીન, સડેલી માછલી જેવી દુર્ગંધવાળો, અતિઝેરી વાયુ છે.
- પાણીમાં અલ્પદ્રાવ્ય છે.

● રાસાયણિક ગુણધર્મો

ફોસ્ફોર : CuSO_4 (કોપર સલ્ફેટ) અથવા મરક્યુરિક ક્લોરાઇડ (HgCl_2) સાથે અનુરૂપ ફોસ્ફાઇડ બનાવે છે.



ધડાકો : HNO_3 , Cl_2 , Br_2 જેવા ઓક્સિડેશનકર્તાના સંપર્કમાં આવતાં નિર્બળ બેઈઝ છે. HBr સાથે ફોસ્ફોનિયમ બ્રોમાઇડ આપે.



ઉપયોગો :

PH_3 ના સ્વયંભૂ દહન થવાના ગુણધર્મને લીધે હોલ્મ્સ સિગ્નલમાં કેલ્શિયમ કાર્બાઇડ અને કેલ્શિયમ ફોસ્ફાઇડ ધરાવતા પાત્રમાં કાણું પાડીને દરિયામાં ફેંકતા ઉત્પન્ન થતો વાયુ સળગે છે, જે સિગ્નલનું કાર્ય કરે છે.


ધ્રૂમ પડદા બનાવવામાં થાય છે.

કેલ્શિયમ ફોસ્ફાઇડની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી ઉત્પન્ન થતો PH_3 સળગી હવા સાથે મિશ્રથી P_4O_{10} નું વાદળું રચે છે. જે ધ્રૂમ પડદા તરીકે કાર્ય કરે છે.


(2) PCl_3 (ફોસ્ફરસ ટ્રાયક્લોરાઇડ) :

બનાવટ :

(1) સફેદ ફોસ્ફરસની ઉપર શુષ્ક Cl_2 વાયુને ઊંચા તાપમાને પસાર કરવાથી....




(2) સફેદ ફોસ્ફરસની થાયોનિલ ક્લોરાઇડ (SOCl_2) સાથેની પ્રક્રિયાથી....




ભૌતિક ગુણધર્મો :



- રંગવિહીન, ધુમાયમાન પ્રવાહી
- તેનો આકાર પિરામિડલ છે.
- બેન્ઝિન, ક્લોરોફોર્મ, ઈથર, CS_2 માં દ્રાવ્ય



રાસાયણિક ગુણધર્મો : PCl_3 હવા કે પાણીના સંપર્કમાં આવતાં ધુમાડો ઉત્પન્ન કરે છે. કારણ કે PCl_3 માં રહેલા P-Cl બંધનું વિઘટન થઈ ફોસ્ફરસ એસિડ (H_3PO_3)માં પરિવર્તન પામે છે.




CH_3COOH અને $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ જેવા $-\text{OH}$ સમૂહવાળાં સંયોજનો સાથેની પ્રક્રિયા




● ફોસ્ફરસ પેન્ટાક્લોરાઇડ (PCl_5)

બનાવટ :

સફેદ ફોસ્ફરસની સૂકા ક્લોરિન વાયુ સાથેની પ્રક્રિયાથી.....



સફેદ ફોસ્ફરસની સલ્ફ્યુરાઈલ ક્લોરાઈડ (SO_2Cl_2) સાથેની પ્રક્રિયાથી....





ભૌતિક ગુણધર્મો :

PCl_5 પીળાશપડતો સફેદ રંગનો ઘન પદાર્થ છે.


પ્રવાહી અને વાયુમય સ્થિતિમાં ટ્રાયગોનલ બાયપિરામિડ આકાર ધરાવે છે.

રાસાયણિક ગુણધર્મો :


(1) હવામાંના ભેજ સાથેની પ્રક્રિયાથી POCl_3 અને છેવટે H_3PO_4 બને છે.





(2) PCl_5 ને ગરમ કરતાં તે ઉદ્ભવતન પામે છે. જ્યારે વધુ ગરમ કરતા તે વિઘટન પામે છે.



(3) $-\text{OH}$ સમૂહ ધરાવતાં સંયોજનો સાથેની પ્રક્રિયા :



(4) ધાતુના ટુકડા સાથે ગરમ કરતાં અનુવર્તી ધાતુ ક્લોરાઈડ બને છે.



● ફોસ્ફરસનાં ઓક્સોએસિડ


ફોસ્ફરસના ઓક્સાઈડની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી ફોસ્ફરસનાં ઓક્સોએસિડ મેળવાય છે.



H_3PO_3 (ઓર્થોફોસ્ફરસ એસિડ)


Pનો ઓક્સિડેશન આંક = +3

નિર્બળ ડાયપ્રોટીક એસિડ




ફોસ્ફરસ સાથે સીધા જ જોડાયેલા હાઈડ્રોજન એસિડિક નથી. ($\because$ P – H બંધ અધ્રુવીય છે.) (વિઘટન ઋણતા સમાન હોવાથી)

$$\text{Ka}_1 = 1.0 \times 10^{-2}, \text{Ka}_2 = 2.6 \times 10^{-7}$$



● H_3PO_4 (ઓર્થો ફોસ્ફોરિક એસિડ)

Pનો ઓક્સિડેશન આંક = +5



નિર્બળ ટ્રાયપ્રોટીક એસિડ

$$K_{a_1} = 7.5 \times 10^{-3}, K_{a_2} = 6.2 \times 10^{-8}, K_{a_3} = 4.8 \times 10^{-13}$$

ઉપરના બંને અણુમાં ક્રમિક વિયોજન અચળાંક લગભગ 10^5 ના ગુણકથી ઘટતો જાય છે.


● ડાય ફોસ્ફોરિક એસિડ ($\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7$)

● પાયરો ફોસ્ફોરિક એસિડ


● ઓક્સિડેશન આંક P = +5

● ટેટ્રા બેઝિક

બનાવટ : બે H_3PO_4 ના સંયોજન દરમિયાન પાણીનો એક અણુ દૂર થવાથી મળે છે.




H_3PO_2 (ફોસ્ફીનિક એસિડ) (હાઈપો ફોસ્ફરસ એસિડ)



● ટ્રાય મેટા ફોસ્ફોરિક એસિડ ($\text{H}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$)

તેમાં HPO_3 એકમ ત્રણ વખત પુનરાવર્તિત થાય છે.


બંધારણીય સૂત્ર :



● ટ્રાય મેટા ફોસ્ફોરિક એસિડ ($\text{H}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$)

પોલિ મેટા ફોસ્ફોરિક એસિડ : $(\text{HPO}_3)_n$

HPO_3 એકમ પુનરાવર્તિત થાય છે. ઓક્સિડેશન આંક = +5




હાઈપો ફોસ્ફોરિક એસિડ : $(\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_6)$

ટેટ્રા બેઝિક

Pનો ઓક્સિડેશન આંક = +4

બંધારણીય સૂત્ર :




(2) પેરોક્ષો મોનોફોસ્ફોરિક એસિડ : (H_3PO_5)

ટ્રાય બેઝિક

Pનો ઓક્સિડેશન આંક = +5


બંધારણીય સૂત્ર :



(3) પેરોક્ષો ડાયફોસ્ફોરિક એસિડ : $(\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_8)$


ટેટ્રાબેઝિક

Pનો ઓક્સિડેશન આંક = +5



(4) સાઈકલો ટ્રાઈ મેટા ફોસ્ફોરિક એસિડ :

ટ્રાયબેઝિક $(\text{HPO}_3)_3$



Pનો ઓક્સિડેશન આંક = +5