

(133) પરવલય $x^2 = 8y$ અને ઉપવલય $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$ નાં છેદબિંદુમાંથી પસાર થતી રેખાનું સમીકરણ

- (A) $y - 3 = 0$ (B) $y + 3 = 0$ (C) $3y + 1 = 0$ (D) $3y - 1 = 0$

ઉકેલ : $x^2 = 8y$ અને $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$ ઉકેલતાં, બીજી રીત : માંગેલ વક્ર $x^2 - 8y + \lambda \left(\frac{x^2}{3} + y^2 - 1 \right) = 0$
 તે રેખા હોવાથી $\lambda = -3$
 $\therefore 3y^2 + 8y - 3 = 0$
 માંગેલ રેખાઓ $y = \frac{1}{3}$ અથવા $y = -3$ છે.
 પરંતુ $x^2 = 8y$ હોવાથી $y > 0$
 $\therefore y = \frac{1}{3}$ અથવા $y = -3$
 $\therefore$ માંગેલ રેખા $3y - 1 = 0$ છે. જવાબ : (D)

જો $y = \frac{1}{3}$ તો $x^2 = \frac{8}{3}$. આથી $x = \pm \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

અને જો $y = -3$ તો $x^2 = -24$ જે શક્ય નથી.

$\therefore$ બંને વક્રનાં છેદબિંદુઓ $\left(\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \frac{1}{3} \right)$ અને $\left(-\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \frac{1}{3} \right)$

$\therefore$ અહીં, બંને બિંદુઓના y -યામ સમાન છે તેથી બંને બિંદુઓમાંથી પસાર થતી રેખા સમક્ષિતિજ રેખા મળે.

$\therefore$ માંગેલ રેખાનું સમીકરણ $y = \frac{1}{3}$ એટલે કે $3y - 1 = 0$. જવાબ : (D)


(134) જો a અને c ધન વાસ્તવિક સંખ્યાઓ હોય અને ઉપવલય $\frac{x^2}{4c^2} + \frac{y^2}{c^2} = 1$ નાં ચાર ભિન્ન બિંદુઓ વર્તુળ

$x^2 + y^2 = 9a^2$ પર પણ હોય, તો

- (A) $9ac - 9a^2 - 2c^2 < 0$ (B) $6ac - 9a^2 - 2c^2 < 0$
 (C) $9ac - 9a^2 - 2c^2 > 0$ (D) $6ac + 9a^2 - 2c^2 > 0$

ઉકેલ : આપેલ ઉપવલય $\frac{x^2}{4c^2} + \frac{y^2}{c^2} = 1$ પરથી $a^2 = 4c^2, b^2 = c^2$. આથી $a > b$,

વળી, વર્તુળ $x^2 + y^2 = 9a^2$ નું કેન્દ્ર $(0, 0)$ તથા ત્રિજ્યા $3a$ છે.



આકૃતિ 9.62

આકૃતિ પરથી સ્પષ્ટ છે કે $3a > c$ અને $3a < 2c$ થશે.

$\therefore c < 3a < 2c$

હવે, $c < 3a < 2c \Rightarrow c^2 < 9a^2 < 4c^2$

(1)

$$\text{તથા } c < 3a < 2c \Rightarrow 2c^2 < 6ac < 4c^2 \quad (2)$$

$$(1) \text{ અને } (2) \text{ પરથી, } c^2 + 2c^2 < 9a^2 + 6ac < 4c^2 + 4c^2$$

$$\therefore 3c^2 < 9a^2 + 6ac < 8c^2$$

$$\therefore 3c^2 - 2c^2 < 9a^2 + 6ac - 2c^2 < 8c^2 - 2c^2$$

$$\therefore c^2 < 9a^2 + 6ac - 2c^2 < 6c^2$$

$$\therefore 9a^2 + 6ac - 2c^2 > 0$$

જવાબ : (D)

(135) જો $\overline{OB}$ એ ઉપવલયની અર્ધ ગૌણ અક્ષ હોય, S_1 તથા S_2 તેની નાભિઓ હોય અને $\overline{S_1B}$ અને $\overline{S_2B}$ વચ્ચેનો ખૂણો કાટખૂણો હોય, તો ઉપવલયની ઉત્કેન્દ્રતાનો વર્ગ

$$(A) \frac{1}{2}$$

$$(B) \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$(C) \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$(D) \frac{1}{4}$$

ઉકેલ : અહીં $O(0, 0)$, $B(0, b)$ તથા નાભિ $S_1(ae, 0)$ અને $S_2(-ae, 0)$ છે.

$$\text{હવે, } m \angle S_1 B S_2 = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \overline{S_1B} \text{ નો ઢાળ} \times \overline{S_2B} \text{ નો ઢાળ} = -1$$

$$\therefore \left(\frac{b-0}{0-ae} \right) \left(\frac{b-0}{0+ae} \right) = -1$$


$$\therefore b^2 = a^2 e^2$$

$$\therefore a^2(1-e^2) = a^2 e^2$$

$$\therefore 1-e^2 = e^2$$

$$\therefore 2e^2 = 1$$

$$\text{આથી } e^2 = \frac{1}{2}$$



આકૃતિ 9.63

જવાબ : (A)

(136) $5x + 7y = 0$ જેનો અનંત સ્પર્શક હોય અને $(-7, 0)$ શિરોબિંદુવાળા અતિવલયનું સમીકરણ

$$(A) \frac{x^2}{49} - \frac{y^2}{25} = 1$$

$$(B) \frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{49} = 1$$

$$(C) \frac{y^2}{49} - \frac{x^2}{25} = 1$$

$$(D) \frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{49} = 1$$

ઉકેલ : $5x + 7y = 0$ અનંત સ્પર્શક છે. તેથી સ્પષ્ટ છે કે બીજો અનંત સ્પર્શક $5x - 7y = 0$ મળે તથા શિરોબિંદુ $(-7, 0)$ છે.

$$\therefore \text{ માંગેલ અતિવલયનું સમીકરણ } \frac{x^2}{49} - \frac{y^2}{25} = 1.$$

જવાબ : (A)

(137) જો $(k-6)x^2 + (k-2)y^2 = 24$ લંબાતિવલય દર્શાવે, તો $k = \dots\dots$

$$(A) 6$$

$$(B) 2$$

$$(C) 4$$

$$(D) \text{ એક પણ કિંમત ન મળે.}$$

ઉકેલ : આપેલ વક્ર $(k-6)x^2 + (k-2)y^2 = 24$ લંબાતિવલય દર્શાવે, તો $k-6 \neq 0$, $k-2 \neq 0$.

$$\text{આપેલ વક્ર } \frac{x^2}{\frac{24}{k-6}} + \frac{y^2}{\frac{24}{k-2}} = 1$$

તથા x^2 નો સહગુણક $+ y^2$ નો સહગુણક $= 0$.

$$\therefore k - 6 + k - 2 = 0$$

$$\therefore 2k = 8$$

$$\therefore k = 4$$

જવાબ : (C)

(138) જો $|m| < \frac{b}{a}$ તો અતિવલય $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ના m ઢાળવાળા સ્પર્શક મળે.

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 0

ઉકેલ : રેખા $y = mx + d$ સ્પર્શક બને તે માટેની જરૂરી શરત : $c^2 = a^2 m^2 - b^2$

$$\therefore \frac{c^2}{a^2} = m^2 - \frac{b^2}{a^2}$$

હવે, જો $|m| < \frac{b}{a}$, તો $m^2 < \frac{b^2}{a^2}$

$$\therefore m^2 - \frac{b^2}{a^2} < 0. \text{ આથી, } \frac{c^2}{a^2} < 0 \text{ આ શક્ય નથી.}$$

$\therefore$ જો $|m| < \frac{b}{a}$, તો અતિવલયનો m ઢાળવાળો કોઈ સ્પર્શક ન મળે.

જવાબ : (D)

(139) અતિવલય $\frac{4x^2}{81} - \frac{2y^2}{25} = 1$ પરના બિંદુ $\left(\frac{9}{\sqrt{2}}, \frac{-5}{\sqrt{2}}\right)$ ના ઉત્કેન્દ્રીકોણનું માપ

(A) $\frac{\pi}{2}$

(B) $-\frac{\pi}{4}$

(C) $-\frac{\pi}{3}$

(D) $-\frac{\pi}{6}$

ઉકેલ : અહીં અતિવલય $\frac{4x^2}{81} - \frac{2y^2}{25} = 1$ પરથી $a^2 = \frac{81}{4}, b^2 = \frac{25}{2}$.

જો અતિવલય પરનું બિંદુ $\left(\frac{9}{2} \sec \theta, \frac{5}{\sqrt{2}} \tan \theta\right)$ હોય, તો $\frac{9}{2} \sec \theta = \frac{9}{\sqrt{2}}, \frac{5}{\sqrt{2}} \tan \theta = \frac{-5}{\sqrt{2}}$

$$\therefore \sec \theta = \sqrt{2}, \tan \theta = -1$$

$$\therefore P(\theta) \text{ ચતુર્થ ચરણમાં છે તથા } \theta = -\frac{\pi}{4}$$

જવાબ : (B)

(140) અતિવલય $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ની ઉત્કેન્દ્રતા e હોય તથા અતિવલયના અનંત સ્પર્શકો વચ્ચેના ખૂણાનું માપ α હોય, તો $e = \dots\dots$

(A) $\tan \frac{\alpha}{2}$

(B) $\sec \frac{\alpha}{2}$

(C) $\sec \frac{\alpha}{2} \cdot \tan \frac{\alpha}{2}$

(D) એક પણ નહિ.

ઉકેલ : જો અતિવલય $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ની ઉત્કેન્દ્રતા e હોય, તો

$$e^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2}. \text{ આથી, } e^2 = \frac{a^2 + b^2}{a^2}$$

હવે, જો અતિવલયના અનંત સ્પર્શકો વચ્ચેના ખૂણાનું માપ α હોય, તો $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{b}{a}$

$$\therefore \sec^2 \frac{\alpha}{2} = 1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{a^2 + b^2}{a^2} = e^2$$

$$\therefore e = \sec \frac{\alpha}{2} \quad (e > 1)$$

જવાબ : (B)

(141) અતિવલય $3\sqrt{3}x^2 - 7\sqrt{3}y^2 = 63$ ના અનંત સ્પર્શકો પર અતિવલય પરના કોઈ બિંદુમાંથી દોરેલ લંબની લંબાઈઓનો ગુણકાર

- (A) $21\sqrt{3}$ (B) $\frac{21\sqrt{3}}{5}$ (C) $\frac{21\sqrt{3}}{10}$ (D) $\frac{21\sqrt{3}}{50}$

ઉકેલ : આપેલ અતિવલય $\frac{3\sqrt{3}x^2}{63} - \frac{7\sqrt{3}y^2}{63} = 1$ છે.

$$\therefore \frac{x^2}{7\sqrt{3}} - \frac{y^2}{3\sqrt{3}} = 1. \text{ આથી } a^2 = 7\sqrt{3}, b^2 = 3\sqrt{3}$$

અતિવલય પરના (x_1, y_1) માંથી અતિવલયના અનંત સ્પર્શકો પર દોરેલા લંબની લંબાઈ અનુક્રમે p_1 અને p_2 હોય, તો,

$$p_1 = \frac{|bx_1 - ay_1|}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad p_2 = \frac{|bx_1 + ay_1|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$p_1 p_2 = \frac{b^2 x_1^2 - a^2 y_1^2}{a^2 + b^2} = \frac{a^2 b^2 \left(\frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} \right)}{a^2 + b^2} = \frac{a^2 b^2}{a^2 + b^2}$$

$$\therefore p_1 p_2 = \frac{(7\sqrt{3})(3\sqrt{3})}{7\sqrt{3} + 3\sqrt{3}} = \frac{21 \times 3}{10\sqrt{3}} = \frac{21\sqrt{3}}{10}$$

જવાબ : (C)

(142) અતિવલય $7x^2 - 12y^2 = 84$ પરના કોઈ બિંદુથી નાભિ સુધીના અંતરનો તફાવત

- (A) $2\sqrt{3}$ (B) $3\sqrt{3}$ (C) $4\sqrt{3}$ (D) $5\sqrt{3}$

ઉકેલ : આપેલ અતિવલય $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{7} = 1$ પરથી $a^2 = 12, b^2 = 7$.

આપણે જાણીએ છીએ કે, અતિવલય પરનું કોઈ બિંદુ P હોય તથા નાભિઓ અનુક્રમે S અને S' હોય, તો

$$|SP - S'P| = 2a = 2\sqrt{12} = 4\sqrt{3}$$

જવાબ : (C)

(143) જેની નાભિઓ $(3, 4)$ અને $(24, 7)$ હોય તથા ઊગમબિંદુમાંથી પસાર થતાં હોય, તેવા અતિવલયની ઉત્કેન્દ્રતા =

- (A) $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ (B) $\frac{3\sqrt{5}}{4}$ (C) $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ (D) $\frac{3\sqrt{5}}{4}$

ઉકેલ : ધારો કે $S(3, 4)$ અને $S'(24, 7)$ છે તથા $P(0, 0)$ અતિવલય પરનું બિંદુ છે.

$$\therefore |S'P - SP| = 2a \text{ પરથી,}$$

$$\left| \sqrt{(24-0)^2 + (7-0)^2} - \sqrt{(3-0)^2 + (4-0)^2} \right| = 2a$$

$$\therefore \sqrt{625} - \sqrt{25} = 2a. \text{ આથી, } 2a = 20$$

$$\text{વળી, } SS' = \sqrt{(24-3)^2 + (7-4)^2} = \sqrt{441+9} = \sqrt{450} = 15\sqrt{2}$$

પરંતુ $SS' = 2ae$, જ્યાં e ઉત્કેન્દ્રતા છે.

$$\therefore 2a = \frac{SS'}{e}$$

$$\therefore 15\sqrt{2} = 20e$$

$$\therefore e = \frac{15\sqrt{2}}{20} = \frac{3\sqrt{2}}{4}$$

જવાબ : (C)

(144) અતિવલય અને તેના અનુબદ્ધ અતિવલયની ઉત્કેન્દ્રતા અનુક્રમે e_1 અને e_2 હોય, તો e_1 અને e_2 વચ્ચેનો સંબંધ

$$(A) \quad e_1 + e_2 = 2 \quad (B) \quad \frac{1}{e_1} - \frac{1}{e_2} = 1 \quad (C) \quad e_1^2 + e_2^2 = 2 \quad (D) \quad \frac{1}{e_1^2} + \frac{1}{e_2^2} = 1$$

ઉકેલ : અતિવલયનું સમીકરણ $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ છે તથા તેની ઉત્કેન્દ્રતા e_1 લઈએ તથા અનુબદ્ધ અતિવલય $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ ની ઉત્કેન્દ્રતા e_2 લઈએ.

$$\therefore b^2 = a^2(e_1^2 - 1) \quad \text{તથા} \quad a^2 = b^2(e_2^2 - 1)$$

$$\therefore e_1^2 = \frac{a^2 + b^2}{a^2} \quad \text{તથા} \quad e_2^2 = \frac{a^2 + b^2}{b^2}$$

$$\therefore \frac{1}{e_1^2} + \frac{1}{e_2^2} = \frac{a^2}{a^2 + b^2} + \frac{b^2}{a^2 + b^2} = \frac{a^2 + b^2}{a^2 + b^2} = 1$$

જવાબ : (D)

(145) અતિવલય $x^2 - y^2 = 16$ ના અનંત સ્પર્શકો વચ્ચેના ખૂણાનું માપ

$$(A) \quad \frac{\pi}{4} \quad (B) \quad \frac{\pi}{3} \quad (C) \quad \frac{\pi}{6} \quad (D) \quad \frac{\pi}{2}$$

ઉકેલ : આપેલ અતિવલય $x^2 - y^2 = 16$ લંબાતિવલય દર્શાવે છે. તેથી તેના અનંત સ્પર્શકો વચ્ચેના ખૂણાનું માપ $\frac{\pi}{2}$ છે.

જવાબ : (D)

(146) લંબાતિવલયની ઉત્કેન્દ્રતા $e =$

$$(A) \quad \sqrt{2} \quad (B) \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (C) \quad -\sqrt{2} \quad (D) \quad -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

ઉકેલ : લંબાતિવલયમાં પ્રધાન અક્ષની લંબાઈ = ગૌણ અક્ષની લંબાઈ

$$\therefore \text{લંબાતિવલયનું સમીકરણ } x^2 - y^2 = a^2 \text{ છે. આથી, } a^2 = a^2(e^2 - 1)$$

$$\therefore e^2 = 2 \quad \text{આથી } e = \sqrt{2}$$

જવાબ : (A)

(147) જો $(a-3)x^2 + ay^2 = 9$ વક્ર લંબાતિવલય હોય, તો $a =$

$$(A) \quad 0 \quad (B) \quad \frac{3}{2} \quad (C) \quad -\frac{3}{2} \quad (D) \quad \pm \frac{3}{2}$$

ઉકેલ : લંબાતિવલયનું પ્રમાણિત સમીકરણ $x^2 - y^2 = a^2$ અર્થાત્ $a = b$

$$\therefore a - 3 = -a$$

$$\therefore a = \frac{3}{2}$$

જવાબ : (B)

(148) અતિવલય $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{25} = -1$ ના સહાયકવૃત્તનું સમીકરણ

- (A) $x^2 + y^2 = 16$ (B) $x^2 + y^2 = 25$ (C) $x^2 + y^2 = 9$ (D) $x^2 + y^2 = 41$

ઉકેલ : આપેલ અતિવલય $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{25} = -1$

$$\therefore \frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{16} = 1 \text{ પરથી } b^2 = 25, a^2 = 16$$

$$\therefore \text{સહાયકવૃત્તનું સમીકરણ } x^2 + y^2 = b^2 \text{ પરથી, } x^2 + y^2 = 25$$

જવાબ : (B)

(149) અતિવલય $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$ ના અનંત સ્પર્શકોના સમીકરણ

- (A) $x = \pm \frac{25}{16}y$ (B) $x = \pm \frac{4}{5}y$ (C) $y = \pm \frac{5}{4}x$ (D) $y = \pm \frac{4}{5}x$

ઉકેલ : આપેલ અતિવલય $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$ પરથી $a = 5, b = 4$.

$\therefore$ માંગેલ અતિવલયના અનંત સ્પર્શકોનાં સમીકરણો,

$$y = \pm \frac{b}{a}x \text{ પરથી } y = \pm \frac{4}{5}x$$

જવાબ : (D)

(150) અતિવલય $y^2 - 16x^2 = 16$ ના નાભિલંબની લંબાઈ

- (A) 2 (B) -2 (C) $-\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{2}$

ઉકેલ : અતિવલય $y^2 - 16x^2 = 16$ પરથી $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{1} = 1$. આથી $a^2 = 1, b^2 = 16$. આથી, મુખ્ય અક્ષ Y-અક્ષ છે.

$$\therefore \text{નાભિલંબની લંબાઈ} = \frac{2a^2}{b} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

જવાબ : (D)

(151) અતિવલય $y^2 - 64x^2 = 64$ ના મુખ્ય અક્ષની લંબાઈ

- (A) 16 (B) 32 (C) 4 (D) 8

ઉકેલ : આપેલ અતિવલય $y^2 - 64x^2 = 64$ પરથી,

$$\therefore \frac{y^2}{64} - \frac{x^2}{1} = 1$$

$$\therefore a^2 = 1, b^2 = 64. \text{ આથી } b = 8 \text{ અહીં મુખ્ય અક્ષ Y-અક્ષ છે.}$$

$$\therefore \text{મુખ્ય અક્ષની લંબાઈ} = 2b = 2(8) = 16$$

જવાબ : (A)

(152) જો વક્ર $xy = c^2$ પરના બિંદુ $(ct, \frac{c}{t})$ પરનો અભિલંબ વક્રને ફરી $(ct', \frac{c}{t'})$ આગળ છેદે તો

- (A) $t' = -\frac{1}{t^3}$ (B) $t' = -\frac{1}{t}$ (C) $t' = -\frac{1}{t^2}$ (D) $t' = -\frac{1}{t^4}$

ઉકેલ : વક્ર $xy = c^2$ પરના બિંદુ $(ct, \frac{c}{t})$ આગળના અભિલંબનું સમીકરણ મેળવીએ,

$$xy = c^2$$

$$\therefore x \frac{dy}{dx} + y = 0. \quad \text{આથી} \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$$

$$\therefore \text{અભિલંબનો ઢાળ} = \frac{x}{y} = \frac{ct}{\frac{c}{t}} = t^2$$

$$\therefore \left(ct, \frac{c}{t}\right) \text{ આગળ અભિલંબનું સમીકરણ } y - \frac{c}{t} = t^2(x - ct)$$

$$\therefore t^3x - ty - ct^4 + c = 0 \quad \text{એટલે કે } ty = t^3x - ct^4 + c \quad \text{છે.}$$

$$\text{તે } \left(ct', \frac{c}{t'}\right) \text{ માંથી પસાર થાય છે.}$$

$$\therefore \frac{t \cdot c}{t'} = t^3(ct') - ct^4 + c$$

$$\therefore t = t^3t'^2 - t^4t' + t'$$

$$\therefore t - t' = t' \cdot t^3(t' - t) \quad \text{આથી} \quad t' \cdot t^3 = \frac{t - t'}{t' - t} = -1 \quad \text{આથી} \quad t' = -\frac{1}{t^3} \quad (t - t' \neq 0) \quad \text{જવાબ : (A)}$$

(153) અતિવલય $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{9} = 1$ પરના બિંદુ $(6\sqrt{2}, 3)$ આગળના અભિલંબનું સમીકરણ

$$(A) \quad \sqrt{2}x + y - 15 = 0$$

$$(B) \quad \sqrt{2}x + y + 15 = 0$$

$$(C) \quad \sqrt{2}x - y - 15 = 0$$

$$(D) \quad \sqrt{2}x - y + 15 = 0$$

ઉકેલ : અતિવલય $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ પરના બિંદુ (x_1, y_1) આગળના અભિલંબનું સમીકરણ $\frac{x - x_1}{a^2} + \frac{y - y_1}{b^2} = 0$ છે.

તેથી આપેલા અતિવલય $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{9} = 1$ પરના બિંદુ $(6\sqrt{2}, 3)$ આગળના અભિલંબનું સમીકરણ,

$$\frac{x - 6\sqrt{2}}{\frac{36}{2}} + \frac{y - 3}{\frac{9}{2}} = 0$$

$$\therefore 3\sqrt{2}(x - 6\sqrt{2}) + 3(y - 3) = 0$$

$$\therefore \sqrt{2}x + y - 15 = 0$$

જવાબ : (A)

(154) રેખા $y = \alpha x + \beta$ એ અતિવલય $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ નો સ્પર્શક હોય, તો બિંદુ $P(\alpha, \beta)$ ના બિંદુગણનું સમીકરણ

વક્ર દર્શાવે છે.

(A) વર્તુળ

(B) ઉપવલય

(C) પરવલય

(D) અતિવલય

ઉકેલ : અહીં રેખા $y = \alpha x + \beta$ પરથી $m = \alpha, c = \beta$,

હવે, રેખા $y = \alpha x + \beta$ એ અતિવલય $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ નો સ્પર્શક છે.

$$\therefore c^2 = a^2m^2 - b^2 \quad \text{આથી,} \quad \beta^2 = a^2\alpha^2 - b^2 \quad \text{એટલે કે} \quad a^2\alpha^2 - \beta^2 = b^2$$

$$\therefore \text{તે વ્યાપક રીતે } \frac{x^2}{\frac{b^2}{a^2}} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{છે.}$$

$\therefore$ સમીકરણ અતિવલય દર્શાવે છે.

જવાબ : (D)

(155) અતિવલય $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ તથા અતિવલય $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ ના સામાન્ય સ્પર્શકનું સમીકરણ

(A) $y = \pm x \pm \sqrt{b^2 - a^2}$

(B) $y = -x \pm \sqrt{a^2 - b^2}$

(C) $y = \pm x \mp (a^2 - b^2)$

(D) એક પણ નહિ.

ઉકેલ : ધારો કે આપેલા અતિવલય $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ તથા અતિવલય $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ ના સામાન્ય સ્પર્શકનું સમીકરણ $y = mx + c$ છે.

તે માટેની જરૂરી શરત અનુક્રમે $c^2 = a^2 m^2 - b^2$ અને $c^2 = a^2 - b^2 m^2$

$a^2 m^2 - b^2 = a^2 - b^2 m^2$

$\therefore m^2(a^2 + b^2) = a^2 + b^2$

$\therefore m = \pm 1$

$\therefore c^2 = a^2 - b^2$. આથી, $c = \pm \sqrt{a^2 - b^2}$

$\therefore$ માંગેલ સામાન્ય સ્પર્શકનું સમીકરણ $y = x \pm \sqrt{a^2 - b^2}$, $y = -x \pm \sqrt{a^2 - b^2}$ જવાબ : (B)

(156) અતિવલય $x^2 - y^2 = a^2$ અને $xy = a^2$ ની ઉત્કેન્દ્રતાનો ગુણોત્તર =

(A) 1:1

(B) $\sqrt{2}:1$

(C) $2a^2:a^2$

(D) $a^2:2a^2$

ઉકેલ : આપેલ વક્ર $x^2 - y^2 = a^2$ લંબાતિવલય દર્શાવે છે, તેથી તેની ઉત્કેન્દ્રતા e_1 હોય, તો $e_1 = \sqrt{2}$ આપેલ વક્ર $xy = a^2$ પણ લંબાતિવલય દર્શાવે છે, તેથી તેની ઉત્કેન્દ્રતા e_2 હોય, તો $e_2 = \sqrt{2}$

$\therefore \frac{e_1}{e_2} = 1$.

આથી માંગેલ ગુણોત્તર = 1:1

જવાબ : (A)

(157) અતિવલય $\frac{x^2}{7} - \frac{y^2}{3} = 1$ ના સ્પર્શકો કાટખૂણે છેદતાં હોય, તો તેનાં છેદબિંદુઓ જેના પર હોય તેવા વક્રનું સમીકરણ

(A) $x^2 + y^2 = 3$

(B) $x^2 + y^2 = 4$

(C) $x^2 + y^2 = 7$

(D) ન મળે.

ઉકેલ : અતિવલય $\frac{x^2}{7} - \frac{y^2}{3} = 1$ પરથી $a^2 = 7$, $b^2 = 3$. સમતલમાં આવેલ કોઈક બિંદુમાંથી અતિવલયને દોરેલા સ્પર્શકો પરસ્પર લંબ છે. આથી તે બિંદુ નિયામિકાવૃત્ત પર આવેલું છે.

$\therefore$ માંગેલ વક્રનું બિંદુગણનું સમીકરણ $x^2 + y^2 = a^2 - b^2$ પરથી,

$x^2 + y^2 = 4$

જવાબ : (B)

(158) ઉપવલય $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (જ્યાં $a > b$) અને અતિવલય $x^2 - y^2 = c^2$ પરસ્પર લંબચ્છેદી વક્રો હોય, તો

(A) $a^2 + b^2 = 2c^2$

(B) $b^2 - a^2 = 2c^2$

(C) $a^2 b^2 = 2c^2$

(D) $a^2 - b^2 = 2c^2$

ઉકેલ : આપેલ ઉપવલયના સમીકરણ $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ નું x ને સાપેક્ષ વિકલન લેતાં,

$\frac{2x}{a^2} + \frac{2y}{b^2} \frac{dy}{dx} = 0$. આથી $\frac{dy}{dx} = \frac{-b^2 x}{a^2 y}$

આપેલ લંબાતિવલયના સમીકરણ $x^2 - y^2 = c^2$ નું x ને સાપેક્ષ વિકલન લેતાં,

$$2x - 2y \frac{dy}{dx} = 0. \text{ આથી } \frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$$

બંને વક્રો પરસ્પર લંબચ્છેદી છે.

છેદબિંદુ આગળ (પ્રથમ વક્રનો ઢાળ) (બીજા વક્રનો ઢાળ) $= -1$

$$\therefore \left(\frac{-b^2x}{a^2y} \right) \left(\frac{x}{y} \right) = -1. \text{ આથી } \frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} \quad (1)$$

$$\text{આપેલ ઉપવલયમાં (1) ની કિંમત મૂકતા } \frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} = \frac{1}{2} \quad (2)$$

$$\text{આપેલ લંબાતિવલય } x^2 - y^2 = c^2 \text{ છે.} \quad (3)$$

$$(2) \text{ અને } (3) \text{ પરથી, } \frac{a^2}{2} - \frac{b^2}{2} = c^2$$

$$\therefore a^2 - b^2 = 2c^2 \quad \text{જવાબ : (D)}$$

(159) અતિવલય $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ની બે નાભિઓ વચ્ચેના અંતર અને બે નિયામિકાઓ વચ્ચેના અંતરનો ગુણોત્તર 3:2

હોય, તો $a:b = \dots\dots$

$$(A) \quad 1:2 \quad (B) \quad 2:1 \quad (C) \quad \sqrt{2}:1 \quad (D) \quad \sqrt{3}:\sqrt{2}$$

ઉકેલ : આપેલ અતિવલય $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ની બે નાભિઓ વચ્ચેનું અંતર $= 2ae$. બે નિયામિકા વચ્ચેનું અંતર $= \frac{2a}{e}$

$$\text{આપેલ શરત મુજબ, } \frac{2ae}{\frac{2a}{e}} = \frac{3}{2}. \text{ આથી, } e^2 = \frac{3}{2}$$

$$\text{હવે, } b^2 = a^2(e^2 - 1)$$

$$\therefore \frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{2}. \text{ આથી, } \frac{a^2}{b^2} = \frac{2}{1}$$

$$\therefore a:b = \sqrt{2}:1 \quad \text{જવાબ : (C)}$$

(160) $16x^2 - 36y^2 + 32x + 72y - 596 = 0$ ની નાભિના યામ $\dots\dots$

$$(A) \quad (2\sqrt{13}, 0) \quad (B) \quad (-2\sqrt{13}, 0) \quad (C) \quad (\pm 2\sqrt{13}, 0) \quad (D) \quad \text{આમાંથી એક પણ નહિ}$$

ઉકેલ : આપેલ સમીકરણ $16x^2 - 36y^2 + 32x + 72y - 596 = 0$ પરથી,

$$16x^2 + 32x + 16 - 36y^2 + 72y - 36 - 576 = 0$$

$$\therefore 16(x^2 + 2x + 1) - 36(y^2 - 2y + 1) = 576$$

$$\therefore \frac{(x+1)^2}{36} - \frac{(y-1)^2}{16} = 1$$

મુખ્ય અક્ષ X-અક્ષ છે તથા $a^2 = 36$, $b^2 = 16$

હવે, $b^2 = a^2(e^2 - 1)$ પરથી, $e^2 = \frac{16}{36} + 1 = \frac{13}{9}$. આથી, $e = \frac{\sqrt{13}}{3}$

અતિવલય $\frac{(x+1)^2}{36} - \frac{(y-1)^2}{16} = 1$ ની નાભિના યામ $(x', y') = (\pm ae, 0) = \left(\pm \frac{6 \times \sqrt{13}}{3}, 0\right) = (\pm 2\sqrt{13}, 0)$

તેથી $x+1 = 2\sqrt{13}$, $y-1 = 0$

$\therefore x = \pm 2\sqrt{13} - 1$, $y = 1$

$\therefore$ નાભિના યામ $(2\sqrt{13}-1, 1)$, $(-2\sqrt{13}-1, 1)$

જવાબ : (D)

(161) અતિવલય $3x^2 + 10xy + 3y^2 - 7x - 5y + 11 = 0$ ના અનંત સ્પર્શકો વચ્ચેના ખૂણાનું માપ

(A) $\tan^{-1} \frac{3}{4}$ (B) $\tan^{-1} \left(-\frac{3}{4}\right)$ (C) $\tan^{-1} \frac{4}{3}$ (D) આમાંથી એક પણ નહિ.

ઉકેલ : આપેલ અતિવલય $3x^2 + 10xy + 3y^2 - 7x - 5y + 11 = 0$ પરથી,

$a = 3$, $2h = 10$, $b = 3$

અનંત સ્પર્શકો વચ્ચેના ખૂણાનું માપ $= \tan^{-1} \left(\frac{2\sqrt{h^2 - ab}}{a+b} \right)$

$$= \tan^{-1} \frac{2\sqrt{25-9}}{6}$$


$$= \tan^{-1} \frac{4}{3}$$

જવાબ : (C)

(162) બે વર્તુળો $x^2 + y^2 = ax$ અને $x^2 + y^2 = c^2$ ($c > 0$) એકબીજાને સ્પર્શે, તો

(A) $|a| = c$ (B) $a = 2c$ (C) $|a| = 2c$ (D) $2|a| = c$

(AIEEE : 2011)



આકૃતિ 9.64

ઉકેલ : $x^2 + y^2 = ax$ પરથી $x^2 + y^2 - ax = 0$

તેને $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ સાથે સરખાવતાં, $2g = -a$, $2f = 0$, $c = 0$

$\therefore$ કેન્દ્ર $C_1 = \left(\frac{a}{2}, 0\right)$, ત્રિજ્યા $r_1 = \sqrt{g^2 + f^2 - c} = \frac{|a|}{2}$

વળી, વર્તુળ $x^2 + y^2 = c^2$ નું કેન્દ્ર $C_2 = (0, 0)$, $r_2 = c$

અહીં, સ્પષ્ટ છે કે, બંને વર્તુળોના સમીકરણ પરથી એક વર્તુળનું કેન્દ્ર $(0, 0)$ છે અને બીજું વર્તુળ $(0, 0)$ માંથી પસાર થાય છે.

$\therefore$ બંને વર્તુળો અંદરથી સ્પર્શે છે.

$$\therefore C_1 C_2 = |r_1 - r_2|$$

$$\therefore \left(\frac{a}{2} - 0\right)^2 + (0 - 0)^2 = \left(\frac{|a|}{2} - c\right)^2$$

$$\therefore \frac{a^2}{4} = \frac{a^2}{4} - 2\left(\frac{|a|}{2}\right)c + c^2$$

$$\therefore c = |a| \quad (c \neq 0)$$

જવાબ : (A)

(163) $(0, 3)$ કેન્દ્ર અને 2 ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળને સ્પર્શતા અને X -અક્ષને સ્પર્શતા વર્તુળના કેન્દ્રના બિંદુગણનું સમીકરણ

(A) વર્તુળ (B) ઉપવલય (C) પરવલય (D) અતિવલય (AIEEE : 2005)

ઉકેલ : ધારો કે માંગેલ વર્તુળનું કેન્દ્ર (h, k) છે અને r_1 અને r_2 બે વર્તુળોની ત્રિજ્યા છે.

$$\therefore r_1 = 2, \quad r_2 = |k|$$

હવે, બે વર્તુળ એકબીજાને સ્પર્શે છે.

$$\therefore C_1 C_2 = |r_1 \pm r_2|$$

$$\therefore (h-0)^2 + (k-3)^2 = |2 \pm |k||^2$$

$$\therefore h^2 + k^2 - 6k + 9 = 4 \pm 4|k| + k^2$$

$$\therefore h^2 - 6k + 5 = 4k \quad \text{અથવા} \quad h^2 - 6k + 5 = -4k$$

$$\therefore h^2 - 10k + 5 = 0 \quad \text{અથવા} \quad h^2 - 2k + 5 = 0$$

$\therefore$ વ્યાપક સ્વરૂપે કેન્દ્રના બિંદુગણનું સમીકરણ,

$$x^2 = 10y - 5 \quad \text{અથવા} \quad x^2 = 2y - 5$$

આ સમીકરણો પરવલય દર્શાવે છે.

જવાબ : (C)

(164) (a, b) માંથી પસાર થતા અને વર્તુળ $x^2 + y^2 = p^2$ ને લંબચ્છેદી વર્તુળના કેન્દ્રના બિંદુગણનું સમીકરણ

(AIEEE : 2005)

$$(A) \quad 2ax + 2by - (a^2 - b^2 + p^2) = 0$$

$$(B) \quad x^2 + y^2 - 3ax - 4by - (a^2 + b^2 - p^2) = 0$$

$$(C) \quad 2ax + 2by - (a^2 + b^2 + p^2) = 0$$

$$(D) \quad x^2 + y^2 - 2ax - 3by + (a^2 - b^2 - p^2) = 0$$

ઉકેલ : ધારો કે (a, b) માંથી પસાર થતા વર્તુળનું કેન્દ્ર $C_1(h, k)$ અને ત્રિજ્યા r_1 છે.

તથા $x^2 + y^2 = p^2$ નું કેન્દ્ર $C_2(0, 0)$ અને ત્રિજ્યા $r_2 = p$ થશે.

$\therefore$ બંને વર્તુળો કાટખૂણે છેદે છે, તો

$$(C_1 C_2)^2 = r_1^2 + r_2^2$$

$$\therefore h^2 + k^2 = r_2^2 + (h-a)^2 + (k-b)^2$$

$$\therefore h^2 + k^2 = p^2 + h^2 + k^2 - 2ha - 2kb + a^2 + b^2$$

$$\therefore p^2 + a^2 + b^2 - 2ha - 2kb = 0$$

$\therefore$ વ્યાપક સ્વરૂપે માંગેલ બિંદુગણનું સમીકરણ,

$$p^2 + a^2 + b^2 - 2ax - 2by = 0 \text{ એટલે કે}$$

$$2ax + 2by = (a^2 + b^2 + p^2)$$

જવાબ : (C)

(165) વર્તુળ $A(p, q)$ માંથી પસાર થાય અને X -અક્ષને સ્પર્શે, તો બિંદુ A માંથી પસાર થતા વ્યાસના બીજા અંત્યબિંદુના બિંદુગણનું સમીકરણ

(AIEEE : 2004)

$$(A) \quad (x-p)^2 = 4qy \quad (B) \quad (x-q)^2 = 4qy \quad (C) \quad (y-p)^2 = 4qx \quad (D) \quad (y-q)^2 = 4px$$

ઉકેલ : ધારો કે $A(p, q)$ અને વ્યાસ $\overline{AB}$ નું બીજું અંત્યબિંદુ $B(x_1, y_1)$ છે.

$\therefore$ વ્યાસાંત બિંદુઓવાળા વર્તુળનું સમીકરણ

$$(x-p)(x-x_1) + (y-q)(y-y_1) = 0$$

$$\therefore x^2 + y^2 - x(p+x_1) - y(q+y_1) + px_1 + qy_1 = 0 \quad (1)$$

વર્તુળ X -અક્ષને સ્પર્શે છે તેથી (1) માં $y = 0$ લેતાં,

$$x^2 - x(p+x_1) + px_1 + qy_1 = 0. \quad X\text{-અક્ષ એ સ્પર્શક હોવાથી } \Delta = 0.$$

$$\therefore (p+x_1)^2 - 4(1)(px_1 + qy_1) = 0$$

$$\therefore p^2 - 2px_1 + x_1^2 = 4qy_1 \text{ અર્થાત્ } (p-x_1)^2 = 4qy_1$$

$$\text{વ્યાપક સ્વરૂપે માંગેલ બિંદુગણ } (p-x)^2 = 4qy \text{ એટલે કે } (x-p)^2 = 4qy$$

જવાબ : (A)

(166) રેખા $y=x$ અને વર્તુળ $x^2 + y^2 - 2x = 0$ એકબીજાને A અને B આગળ છેદે છે. $\overline{AB}$ વર્તુળનો વ્યાસ હોય, તેવા વર્તુળનું સમીકરણ

(AIEEE : 2004)

$$(A) \quad x^2 + y^2 + x + y = 0$$

$$(B) \quad x^2 + y^2 - x + y = 0$$

$$(C) \quad x^2 + y^2 - (x+y) = 0$$

$$(D) \quad x^2 + y^2 + x - y = 0$$

ઉકેલ : રેખા $y=x$ અને વર્તુળ $x^2 + y^2 - 2x = 0$ ને ઉકેલતાં $A(0, 0)$ અને $B(1, 1)$ મળે.

હવે $\overline{AB}$ વર્તુળનો વ્યાસ થશે.

$$\therefore \text{વર્તુળનું સમીકરણ } (x-0)(x-1) + (y-0)(y-1) = 0$$

(169) $\left(m_i, \frac{1}{m_i}\right), i = 1, 2, 3, 4$ એ વર્તુળ પરનાં ચાર ભિન્ન બિંદુઓ હોય, તો (ચક્રીય બિંદુઓ હોય.) (IIT : 1998)

(A) $m_1 m_2 m_3 m_4 = 1$

(B) $m_1 m_2 m_3 m_4 = -1$

(C) $m_1 \cdot m_2 \cdot m_3 \cdot m_4 = \frac{1}{2}$

(D) $\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} + \frac{1}{m_3} + \frac{1}{m_4} = \frac{1}{4}$

ઉકેલ : ધારો કે વર્તુળનું સમીકરણ $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ છે.

$\left(m_i, \frac{1}{m_i}\right), i = 1, 2, 3, 4$ એ વર્તુળ પરનાં બિંદુઓ છે.

$\therefore m_i^2 + \frac{1}{m_i^2} + 2gm_i + \frac{2f}{m_i} + c = 0$ (જ્યાં $i = 1, 2, 3, 4$)

$\therefore m_i^4 + 2gm_i^3 + cm_i^2 + 2fm_i + 1 = 0$ (જ્યાં $i = 1, 2, 3, 4$)

$\therefore m_1, m_2, m_3$ અને m_4 એ આ સમીકરણનાં બીજ હોય.

$m_1 \cdot m_2 \cdot m_3 \cdot m_4 = 1$

જવાબ : (A)

(170) ધારો કે બિંદુ $P(1, 0)$ અને બિંદુ Q પરવલય $y^2 = 8x$ પરનું બિંદુ છે, તો $\overline{PQ}$ ના મધ્યબિંદુના બિંદુગણનું સમીકરણ (AIEEE : 2005)

(A) $x^2 + 4y + 2 = 0$ (B) $x^2 - 4y + 2 = 0$ (C) $y^2 - 4x + 2 = 0$ (D) $y^2 + 4x + 2 = 0$

ઉકેલ : ધારો કે $P(1, 0)$ તથા $Q(at_1^2, 2at_1) = Q(2t_1^2, 4t_1)$ તથા જો $\overline{PQ}$ નું મધ્યબિંદુ (α, β) છે.

$\therefore (\alpha, \beta) = \left(\frac{2t_1^2 + 1}{2}, \frac{4t_1}{2}\right)$ અર્થાત્ $\alpha = \frac{2t_1^2 + 1}{2}, \beta = 2t_1$

$\therefore 2\alpha = 2\left(\frac{\beta}{2}\right)^2 + 1$. અર્થાત્ $2\alpha = \frac{\beta^2 + 2}{2}$

$\therefore \beta^2 - 4\alpha + 2 = 0$. અર્થાત્ માંગેલ બિંદુગણનું સમીકરણ $y^2 - 4x + 2 = 0$

જવાબ : (C)


(171) પરવલય $y^2 = 4x$ પરનું બિંદુ (x, y) છે. બિંદુ $(0, 0)$ તથા (x, y) ને જોડતા રેખાખંડનું 1:3 ભાગમાં વિભાજન કરતા બિંદુના બિંદુગણનું સમીકરણ = (IIT : 2011)

(A) $y^2 = 2x$

(B) $y^2 = x$

(C) $x^2 = 2y$

(D) $x^2 = y$



આકૃતિ 9.66

ઉકેલ : ધારો કે $O(0,0)$ તથા $P(at^2, 2at) = P(t^2, 2t)$ પરવલય $y^2 = 4x$ પરનું બિંદુ છે તથા $\overline{OP}$ નું 1:3માં વિભાજન કરતું બિંદુ $M(\alpha, \beta)$ હોય, તો

$$(\alpha, \beta) = \left(\frac{t^2+0}{1+3}, \frac{2t+0}{1+3} \right) = \left(\frac{t^2}{4}, \frac{t}{2} \right). \quad \text{આથી, } \alpha = \frac{t^2}{4}, \beta = \frac{t}{2}$$

$$\therefore \beta^2 = \alpha$$

આથી, વ્યાપક રીતે માંગેલ બિંદુગણ $y^2 = x$

જવાબ : (B)

(172) પરવલય $y^2 = 4ax$ પરના કોઈ પણ બિંદુને તેની નાભિ સાથે જોડતા મળતા રેખાખંડના મધ્યબિંદુના બિંદુગણનું સમીકરણ બીજો પરવલય હોય, તો બીજા પરવલયની નિયામિકાનું સમીકરણ

(IIT : 2002)

(A) $x = -a$

(B) $x = \frac{-a}{2}$

(C) $x = 0$

(D) $x = \frac{a}{2}$

ઉકેલ : ધારો કે પરવલય $y^2 = 4ax$ પરનું બિંદુ $P(at^2, 2at)$ છે અને પરવલયનું નાભિ $S(a, 0)$ છે.

$$\text{જો } \overline{SP} \text{ નું મધ્યબિંદુ } M(x, y) \text{ હોય, તો } (x, y) = \left(\frac{a+at^2}{2}, \frac{2at+0}{2} \right)$$

$$\therefore x = \frac{a}{2}(1+t^2), y = at$$

$$\therefore x = \frac{a}{2} + \frac{a}{2} \left(\frac{y^2}{a^2} \right) = \frac{a}{2} + \frac{y^2}{2a} = \frac{a^2 + y^2}{2a}$$

$$\therefore y^2 = 2ax - a^2$$

$$y^2 = 2a \left(x - \frac{a}{2} \right)$$

ઊગમબિંદુનું $\left(\frac{a}{2}, 0 \right)$ આગળ સ્થાનાંતર કરતાં, $x = x' + h$, $y = y' + k$ પરથી,

$$x' = x - \frac{a}{2}, y' = y - 0. \quad \text{આથી, } y'^2 = 2ax'$$

$$y'^2 = 4Ax' \text{ સાથે સરખાવતાં, } 4A = 2a \text{ આથી, } A = \frac{a}{2}$$

$$\therefore \text{પરવલયની નિયામિકા } x' = -A \text{ પરથી } x - \frac{a}{2} = -\frac{a}{2}$$

$$\therefore x = 0 \text{ માંગેલ નિયામિકા છે.}$$

જવાબ : (C)

(173) પરવલય $y^2 = 4x$ ને બિંદુ $(1, 4)$ માંથી દોરેલા સ્પર્શકો કેટલા માપનો ખૂણો બનાવે ?

(A) $\frac{\pi}{6}$

(B) $\frac{\pi}{4}$

(C) $\frac{\pi}{3}$

(D) $\frac{\pi}{2}$

ઉકેલ : પરવલય $y^2 = 4ax$ પરથી $a = 1$

∴ પરવલયના m ઢાળવાળા સ્પર્શકનું સમીકરણ $y = mx + \frac{1}{m}$ અને તે $(1, 4)$ માંથી પસાર થાય છે.

$$\therefore 4 = m + \frac{1}{m}$$

$$\therefore m^2 - 4m + 1 = 0$$

$$\therefore m = \frac{4 \pm \sqrt{16-4}}{2} = 2 \pm \sqrt{3}$$

ધારો કે $m_1 = 2 + \sqrt{3}$, $m_2 = 2 - \sqrt{3}$

જો તેમની વચ્ચેના ખૂણાનું માપ α હોય તો, $\tan \alpha = \left| \frac{(2+\sqrt{3}) - (2-\sqrt{3})}{1 + (2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})} \right| = \left| \frac{2\sqrt{3}}{1+4-3} \right| = \sqrt{3}$

$$\therefore \alpha = \frac{\pi}{3}$$

જવાબ : (C)

(174) પરવલય $y^2 = 4ax$ પરના બિંદુ $P(at_1^2, 2at_1)$ માંથી દોરેલો અભિલંબ પરવલય પરના બિંદુ $Q(at_2^2, 2at_2)$ માંથી પસાર થાય, તો

(AIEEE : 2003)

(A) $t_1 + t_2 = \frac{2}{t_1}$ (B) $t_1 + t_2 = \frac{-2}{t_1}$ (C) $t_1 \times t_2 = \frac{2}{t_1}$ (D) $t_1 \times t_2 = \frac{-2}{t_1}$

ઉકેલ : $(at_1^2, 2at_1)$ અને $(at_2^2, 2at_2)$ માંથી પસાર થતી જીવાનું સમીકરણ

$$y - 2at_1 = \frac{2a(t_2 - t_1)}{a(t_2^2 - t_1^2)} (x - at_1^2)$$

$$\therefore y(t_1 + t_2) - 2x + 2at_1^2 - 2at_1t_2 - 2at_1^2 = 0$$

$$\therefore -2x + (t_1 + t_2)y - 2at_1t_2 = 0 \quad (1)$$

$(at_1^2, 2at_1)$ આગળના પરવલયના અભિલંબનું સમીકરણ,

$$y = -t_1x + 2at_1 + at_1^3 \quad (2)$$

∴ (1) અને (2) પરથી

$$t_1x + y = 2at_1 + at_1^3 \quad \text{તથા} \quad -2x + (t_1 + t_2)y = 2at_1t_2 \quad \text{એક જ રેખા છે.}$$

$$\therefore \frac{t_1}{-2} = \frac{1}{t_1 + t_2}$$

$$\therefore t_1 + t_2 = \frac{-2}{t_1}$$


જવાબ : (B)

(175) ધારો કે વક્ર $C_1 : y^2 = 4x$ અને $C_2 : x^2 + y^2 - 6x + 1 = 0$, તો

- (A) C_1 અને C_2 એકબીજાને માત્ર એક બિંદુમાં સ્પર્શે. (B) C_1 અને C_2 એકબીજાને બે બિંદુમાં છેદે.
(C) C_1 તથા C_2 છેદે પરંતુ બે બિંદુમાં છેદે નહિ. (D) C_1 તથા C_2 છેદે પણ નહિ તથા સ્પર્શે પણ નહિ.

(IIT : 2008)

ઉકેલ :



આકૃતિ 9.67

અહીં વક્રનાં સમીકરણ $y^2 = 4x$ અને વક્ર $x^2 + y^2 - 6x + 1 = 0$ પરથી છેદબિંદુ મેળવવા,

$$x^2 + 4x - 6x + 1 = 0. \text{ અર્થાત્, } x^2 - 2x + 1 = 0$$

$$\therefore (x-1)^2 = 0$$

$$\therefore x=1 \text{ પરથી } y^2 = 4. \text{ અર્થાત્, } y = \pm 2$$

$\therefore C_1$ અને C_2 ના છેદબિંદુ $(1, 2)$ તથા $(1, -2)$ થાય.

જવાબ : (B)

(176) ઊગમબિંદુ પરવલયનું નાભિ હોય તથા નિયામિકા $x = 2$ હોય, તેવા પરવલયનું શિરોબિંદુ = થાય. (AIEEE : 2008)

- (A) $(1, 0)$ (B) $(2, 0)$ (C) $(0, 1)$ (D) $(0, 2)$

ઉકેલ : $S = (0, 0)$, $l : x - 2 = 0$

$$SP = PM \text{ પરથી } x^2 + y^2 = (x-2)^2$$

$$\therefore y^2 = -4(x-1)$$

$\therefore$ શિરોબિંદુ $(1, 0)$ છે.

જવાબ : (A)

(177) પરવલય $y^2 = 8x$ પરનો એક સ્પર્શક $y = x + 2$ હોય તથા પરવલયનો બીજો સ્પર્શક એ આપેલા સ્પર્શકને કાટખૂણે છેદતો હોય, તો બંને સ્પર્શકોના છેદબિંદુના યામ (AIEEE : 2007)

- (A) $(-1, 1)$ (B) $(0, 2)$ (C) $(2, 4)$ (D) $(-2, 0)$

ઉકેલ : પરવલયનો આપેલ સ્પર્શક $y = x + 2$ છે તથા પરવલયનો બીજો સ્પર્શક જે આપેલા સ્પર્શકને કાટખૂણે છેદતો હોવાથી, બંને સ્પર્શકોનું છેદબિંદુ પરવલયની નિયામિકા $x = -2$ પર હોય. ($x = -a$, $a = 2$)

આમ, $x = -2$ અને $y = x + 2$ ઉકેલતાં $(-2, 0)$ મળે.

$\therefore$ છેદબિંદુના યામ $(-2, 0)$ થશે.

જવાબ : (D)

(178) ઉપવલય $\frac{x^2}{27} + \frac{y^2}{1} = 1$ પરનાં બિંદુ $(3\sqrt{3}\cos\theta, \sin\theta)$ આગળ સ્પર્શક દોરવામાં આવે અને સ્પર્શકના અક્ષો સાથેના અંતઃખંડોનો સરવાળો ન્યૂનતમ હોય, તો $\theta = \dots\dots$ (IIT : 2003)

- (A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{2\pi}{3}$ (C) $\frac{3\pi}{8}$ (D) $\frac{3\pi}{4}$

ઉકેલ : ઉપવલય $\frac{x^2}{27} + \frac{y^2}{1} = 1$ પરનાં બિંદુ $(3\sqrt{3}\cos\theta, \sin\theta)$ આગળનાં સ્પર્શકનું સમીકરણ,

$$\frac{x(3\sqrt{3}\cos\theta)}{27} + \frac{y(\sin\theta)}{1} = 1$$

$$\therefore \frac{x}{3\sqrt{3}\sec\theta} + \frac{y}{\operatorname{cosec}\theta} = 1$$

$$\therefore x\text{-અંતઃખંડ} = 3\sqrt{3}\sec\theta, \quad y\text{-અંતઃખંડ} = \operatorname{cosec}\theta$$

$$\text{હવે, ધારો કે } f(\theta) = \text{અંતઃખંડોનો સરવાળો} = 3\sqrt{3}\sec\theta + \operatorname{cosec}\theta$$

$$\therefore f'(\theta) = 3\sqrt{3}\sec\theta\tan\theta - \operatorname{cosec}\theta\cot\theta$$

અંતઃખંડોનો સરવાળો ન્યૂનતમ થવા માટે $f'(\theta) = 0$ થવું જોઈએ.

$$\therefore 3\sqrt{3}\sec\theta\tan\theta - \operatorname{cosec}\theta\cot\theta = 0$$

$$\therefore \frac{3\sqrt{3}\sin\theta}{\cos^2\theta} - \frac{\cos\theta}{\sin^2\theta} = 0$$

$$\therefore \tan^3\theta = \frac{1}{3\sqrt{3}}. \text{ આથી } \tan\theta = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ આથી, } \theta = \frac{\pi}{6}$$

$$\text{તથા } f''(\theta) = f''\left(\frac{\pi}{6}\right) > 0 \text{ ચકાસો. આથી, } \theta = \frac{\pi}{6}$$

જવાબ : (A)


(179) ઉપવલય $x^2 + 9y^2 = 9$ ના મુખ્ય અક્ષનાં અંત્યબિંદુ A અને ગૌણ અક્ષનાં અંત્યબિંદુ Bમાંથી પસાર થતી રેખા સહાયક વૃત્તને M માં મળે છે, તો ત્રિકોણના AMOનું ક્ષેત્રફળ = , જ્યાં O(0, 0). (IIT : 2009)

(A) $\frac{21}{10}$

(B) $\frac{27}{10}$

(C) $\frac{29}{10}$

(D) $\frac{31}{10}$



આકૃતિ 9.68

ઉકેલ : અહીં, ઉપવલય $x^2 + 9y^2 = 9$ એટલે કે $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{1} = 1$ (1)

સહાયક વૃત્તનું સમીકરણ $x^2 + y^2 = 9$ (2)

વળી, $A(3,0)$, $B(0,1)$ હોવાથી $\overleftrightarrow{AB}$ નું સમીકરણ $\frac{x}{3} + \frac{y}{1} = 1$ (3)

સમીકરણ (2) અને (3) ઉકેલતાં, $(3-3y)^2 + y^2 = 9$

$\therefore 9 - 18y + 9y^2 + y^2 = 9$

$\therefore 10y^2 - 18y = 0$

$\therefore y = 0$ અથવા $y = \frac{9}{5}$. પરંતુ $y = 0$ તો $x = 3$ અને A બિંદુ મળે.

$\therefore y = \frac{9}{5}$. તેથી $x = \frac{-12}{5}$

$\therefore M$ ના યામ $= \left(\frac{-12}{5}, \frac{9}{5}\right)$

અહીં $A(3,0)$, $O(0,0)$, $M\left(\frac{-12}{5}, \frac{9}{5}\right)$ હોવાથી,

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ \frac{-12}{5} & \frac{9}{5} & 1 \end{vmatrix} = \frac{27}{5}$$

$\therefore \Delta AOM$ નું ક્ષેત્રફળ $= \frac{1}{2} \times |D| = \frac{1}{2} \times \left|\frac{27}{5}\right| = \frac{27}{10}$

જવાબ : (B)


(180) ઉપવલય $x^2 + 4y^2 = 16$ પરના બિંદુ P આગળનો અભિલંબ X -અક્ષને Q માં છેદે છે. જો M એ $\overline{PQ}$ નું મધ્યબિંદુ હોય, અને M નો બિંદુગણ ઉપવલયના નાભિલંબને છેદે તો છેદબિંદુના યામ

(A) $\left(\frac{3\sqrt{5}}{2}, \pm \frac{2}{7}\right), \left(\frac{-3\sqrt{5}}{2}, \pm \frac{2}{7}\right)$

(B) $\left(\frac{3\sqrt{5}}{2}, \pm \frac{\sqrt{19}}{4}\right), \left(\frac{-3\sqrt{5}}{2}, \pm \frac{\sqrt{19}}{4}\right)$

(C) $\left(2\sqrt{3}, \pm \frac{1}{7}\right), \left(-2\sqrt{3}, \pm \frac{1}{7}\right)$

(D) $\left(2\sqrt{3}, \pm \frac{4\sqrt{3}}{7}\right), \left(-2\sqrt{3}, \pm \frac{4\sqrt{3}}{7}\right)$ (IIT : 2009)



આકૃતિ 9.69

ઉકેલ : આપેલ ઉપવલય $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$

આથી, $a = 4$, $b = 2$

$\therefore$ ઉપવલય પરનું બિંદુ $P(a \cos \theta, b \sin \theta) = P(4 \cos \theta, 2 \sin \theta)$

$\therefore$ ઉપવલય પરના બિંદુ P આગળનો સ્પર્શક $\frac{x}{4} \cos \theta + \frac{y}{2} \sin \theta - 1 = 0$

∴ ઉપવલય પરના બિંદુ P આગળનો અભિલંબ, $\left(\frac{1}{2}\sin\theta\right)x - \left(\frac{1}{4}\cos\theta\right)y + k = 0$. વળી તે $(4\cos\theta, 2\sin\theta)$ માંથી પસાર થાય છે.

$$\therefore 2\sin\theta\cos\theta - \frac{\sin\theta\cos\theta}{2} + k = 0 \quad \text{આથી } k = \frac{-3}{2}\sin\theta\cos\theta$$

$$\therefore \text{P આગળના અભિલંબનું સમીકરણ } (2\sec\theta)x - (\csc\theta)y - 6 = 0$$

અભિલંબ X-અક્ષને Qમાં છેદે છે તેથી $y = 0$ લેતાં $x = 3\cos\theta$

$$\therefore \text{Qના યામ} = (3\cos\theta, 0)$$

$$\therefore \overline{PQ} \text{ ના મધ્યબિંદુ Mના યામ} = \left(\frac{7\cos\theta}{2}, \sin\theta\right)$$

$$\text{મધ્યબિંદુ } M(x, y) \text{ લઈએ, તો } x = \frac{7\cos\theta}{2}, y = \sin\theta$$

$$\therefore \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1 \Rightarrow \left(\frac{2x}{7}\right)^2 + y^2 = 1$$

$$\therefore \frac{4x^2}{49} + y^2 = 1$$

$$\therefore \text{મધ્યબિંદુના બિંદુગણનું સમીકરણ } \frac{4x^2}{49} + y^2 = 1$$

$$\text{હવે, } \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1 \text{ પરથી } a^2 = 16, b^2 = 4. \text{ તેથી } e = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore \text{ઉપવલયની નાભિઓ} = (\pm ae, 0) = (\pm 2\sqrt{3}, 0). \text{ નાભિલંબનાં સમીકરણ } x = \pm 2\sqrt{3}.$$


$$\therefore x = \pm 2\sqrt{3} \text{ ની કિંમત } \frac{4x^2}{49} + y^2 = 1 \text{ માં મૂકતાં, } y^2 = \frac{1}{49}. \text{ આથી, } y = \pm \frac{1}{7}$$

$$\therefore \text{માંગેલ બિંદુઓ } \left(-2\sqrt{3}, \pm \frac{1}{7}\right) \text{ અને } \left(2\sqrt{3}, \pm \frac{1}{7}\right)$$

જવાબ : (C)

(181) ઉપવલય $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ ના નાભિલંબના અંત્યબિંદુ આગળ દોરેલા સ્પર્શકો વડે બનતાં ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ =

(IIT : 2003)



આકૃતિ 9.70

(A) $\frac{27}{2}$

(B) $\frac{27}{4}$

(C) $\frac{27}{5}$

(D) 27

ઉકેલ : અહીં, ઉપવલય $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ પરથી, $a^2 = 9$, $b^2 = 5$. આથી, $a > b$

$$\text{હવે, } b^2 = a^2(1 - e^2) \text{ પરથી, } 5 = 9(1 - e^2)$$

$$\therefore 1 - e^2 = \frac{5}{9}. \text{ આથી, } e^2 = \frac{4}{9}. \text{ આથી, } e = \frac{2}{3}$$

$$\therefore \text{નાભિલંબના અંત્યબિંદુ } L_1\left(2, \frac{5}{3}\right), L_2\left(-2, \frac{5}{3}\right), L_3\left(-2, -\frac{5}{3}\right) \text{ અને } L_4\left(2, -\frac{5}{3}\right) \text{ છે.}$$

$$\therefore L_1\left(2, \frac{5}{3}\right) \text{ આગળનાં સ્પર્શકનું સમીકરણ } \frac{2x}{9} + \frac{y}{3} = 1$$

$$\therefore \frac{x}{\frac{9}{2}} + \frac{y}{3} = 1$$

$$\therefore \Delta OPQ \text{ નું ક્ષેત્રફળ } = \frac{1}{2} \left(\frac{9}{2}\right)(3) = \frac{27}{4}$$

$$\text{માંગેલ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ } = 4(\Delta OPQ \text{ નું ક્ષેત્રફળ}) = 27$$

જવાબ : (D)

(182) ઉપવલયની નાભિઓ વચ્ચેનું અંતર 6 અને ગૌણ અક્ષની લંબાઈ 8 હોય, તો તેની ઉત્કેન્દ્રતા = $(a > b)$

(AIEEE : 2006)

$$(A) \frac{3}{5} \quad (B) \frac{1}{2} \quad (C) \frac{4}{5} \quad (D) \frac{1}{\sqrt{5}}$$

ઉકેલ : ઉપવલયની બે નાભિઓ વચ્ચેનું અંતર 6 છે.

$$\therefore 2ae = 6 \text{ તથા ગૌણ અક્ષની લંબાઈ } 2b = 8 \text{ છે.}$$

$$\therefore b = 4, ae = 3$$

$$\text{હવે, } b^2 = a^2(1 - e^2). \text{ આથી, } 16 = a^2 - 9. \text{ આથી, } a^2 = 25$$

$$\therefore 1 - e^2 = \frac{b^2}{a^2} = \frac{16}{25}. \text{ આથી, } e^2 = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}. \text{ આથી, } e = \frac{3}{5}$$

જવાબ : (A)

(183) જેની નાભિ $(\pm 2, 0)$ અને ઉત્કેન્દ્રતા $\frac{1}{2}$ હોય, તેવા ઉપવલયનું સમીકરણ

(AIEEE : 2002)

$$(A) \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{16} = 1 \quad (B) \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1 \quad (C) \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1 \quad (D) \text{ એક પણ નહિ.}$$

ઉકેલ : ઉપવલયની નાભિઓ $(\pm 2, 0) = (\pm ae, 0)$. તેથી $ae = 2$ તથા $e = \frac{1}{2}$ છે. આથી, $a = 4$

$$\therefore b^2 = a^2(1 - e^2) \text{ પરથી, } b^2 = 16\left(\frac{3}{4}\right) = 12$$

$$\therefore \text{ઉપવલયનું સમીકરણ } \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$$

જવાબ : (B)

(184) ઉપવલય $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ ના નાભિમાંથી પસાર થતા વર્તુળનું કેન્દ્ર $(0, 3)$ હોય, તો તેની ત્રિજ્યા = (AIEEE : 2002)

- (A) 4 (B) 3 (C) $\sqrt{12}$ (D) $\frac{7}{2}$

ઉકેલ : આપેલ ઉપવલય પરથી, $a^2 = 16$, $b^2 = 9$. આથી, $a > b$ થશે.

હવે, $b^2 = a^2(1 - e^2)$ પરથી,

$$e^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2} \Rightarrow e^2 = 1 - \frac{9}{16} = \frac{7}{16}. \text{ આથી, } e = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

$\therefore$ ઉપવલયની નાભિઓ $(\pm\sqrt{7}, 0)$

$\therefore$ વર્તુળની ત્રિજ્યા = કેન્દ્ર $(0, 3)$ થી નાભિઓ $(\pm\sqrt{7}, 0)$ વચ્ચેનું અંતર $= \sqrt{7+9} = 4$ જવાબ : (A)

(185) ઉપવલયની ઉત્કેન્દ્રતા $\frac{1}{2}$ હોય, નિયામિકા $x=4$ હોય તથા તેનું કેન્દ્ર ઊગમબિંદુ આગળ છે, તો ઉપવલયનું સમીકરણ

- (A) $3x^2 + 4y^2 = 12$ (B) $4x^2 + 3y^2 = 12$ (C) $3x^2 + 4y^2 = 1$ (D) $4x^2 + 3y^2 = 1$

ઉકેલ : અહીં ઉપવલયની ઉત્કેન્દ્રતા $e = \frac{1}{2}$ અને ઉપવલયની નિયામિકા $x=4$ છે. તેથી $\frac{a}{e} = 4$.

આથી, $a = 2$

હવે $b^2 = a^2(1 - e^2) = 4(1 - \frac{1}{4}) = 3$. આથી, $b = \sqrt{3}$


$\therefore$ માંગેલ ઉપવલયનું સમીકરણ $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

$\therefore 3x^2 + 4y^2 = 12$

જવાબ : (A)

(186) ઉપવલય $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ માં અંતર્ગત ઘેરાયેલા લંબચોરસનું મહત્તમ ક્ષેત્રફળ

- (A) ab (B) $2ab$ (C) $\frac{a}{b}$ (D) $\sqrt{ab}$



આકૃતિ 9.71

ઉકેલ : ધારો કે ઉપવલય પરનું કોઈક બિંદુ $P(a\cos\theta, b\sin\theta)$ છે. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ, પ્રથમ ચરણમાં આવેલા ભાગનું ક્ષેત્રફળ $= l \times b$

$$= a\cos\theta \cdot b\sin\theta$$

$$\therefore \text{લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ} = 4(a\cos\theta)(b\sin\theta)$$

$$= 4ab\cos\theta\sin\theta$$

$$= 2ab\sin 2\theta$$

અહીં $\sin 2\theta = 1$ ત્યારે ક્ષેત્રફળ મહત્તમ બને.

$$\therefore \text{મહત્તમ ક્ષેત્રફળ} = 2ab$$

જવાબ : (B)

(187) ઉપવલયની નાભિ ઊગમબિંદુ, નિયામિકા $x=4$ અને ઉત્કેન્દ્રતા $\frac{1}{2}$ હોય, તો ઉપવલયના અર્ધ મુખ્ય અક્ષની લંબાઈ =


(AIEEE : 2008)

(A) $\frac{2}{3}$

(B) $\frac{4}{3}$

(C) $\frac{5}{3}$

(D) $\frac{8}{3}$



આકૃતિ 9.72

ઉકેલ : અહીં નિયામિકા $x=4$ છે. સ્પષ્ટ છે કે ઉપવલયની મુખ્ય અક્ષ X-અક્ષ છે.

O(0,0) છે. તેથી નાભિ (0,0) થી નિયામિકાનું લંબઅંતર $= 4$ છે.

$$\therefore \left| \frac{a}{e} - ae \right| = 4$$

$$\therefore \frac{a}{e} - ae = 4 \quad \left(e = \frac{1}{2} \right)$$

$$a \left(\frac{1-e^2}{e} \right) = 4$$

$$\therefore a \left(\frac{3}{2} \right) = 4 \quad \text{આથી, અર્ધ પ્રધાન અક્ષની લંબાઈ } a = \frac{8}{3}$$

જવાબ : (D)

(188) ઉપવલયની ઉત્કેન્દ્રતા $\sqrt{\frac{2}{5}}$ હોય તે બિંદુ $(-3,1)$ માંથી પસાર થાય તથા જેની અક્ષો યામાક્ષો હોય, તેવા ઉપવલયનું સમીકરણ

(AIEEE : 2011)

(A) $3x^2 + 5y^2 - 32 = 0$

(B) $5x^2 + 3y^2 - 48 = 0$

(C) $3x^2 + 5y^2 - 15 = 0$

(D) $5x^2 + 3y^2 - 32 = 0$

ઉકેલ : ધારો કે જેની અક્ષો યામાક્ષો હોય, તેવા ઉપવલયનું સમીકરણ $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ છે.

તે $(-3, 1)$ માંથી પસાર થાય છે.

$$\therefore \frac{9}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$$

$$\therefore \frac{9}{a^2} + \frac{1}{\frac{3a^2}{5}} = 1 \quad \left(b^2 = a^2 \left(1 - \frac{2}{5} \right) = \frac{3a^2}{5} \right)$$

$$\therefore \frac{1}{a^2} \left(9 + \frac{5}{3} \right) = 1 \text{ તેથી, } a^2 = \frac{32}{3}$$

$$\text{હવે } b^2 = \frac{3}{5} \times a^2 = \frac{3}{5} \times \frac{32}{3} = \frac{32}{5}$$

$$\therefore \text{ માંગેલ ઉપવલયનું સમીકરણ } 3x^2 + 5y^2 - 32 = 0$$

$$\text{જો } a < b \text{ હોય તો } a^2 = b^2 (1 - e^2)$$

$$\therefore a^2 = b^2 \left(1 - \frac{2}{5} \right) = \frac{3b^2}{5}$$

$$\therefore \frac{9}{\frac{3b^2}{5}} + \frac{1}{b^2} = 1. \quad \text{આથી } b^2 = 16$$

$$\text{જો } b^2 = 16, \text{ તો } a^2 = \frac{3b^2}{5} = \frac{48}{5}$$

$$\therefore \frac{5x^2}{48} + \frac{y^2}{16} = 1$$

$$\therefore 5x^2 + 3y = 48$$

જવાબ : (A, B)

(189) ઉપવલય $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ અને અતિવલય $\frac{x^2}{144} - \frac{y^2}{81} = \frac{1}{25}$ માટે બંને વક્રોની નાભિ સમાન હોય, તો $b^2 = \dots\dots$

(AIEEE : 2003)

(A) 1

(B) 5

(C) 7

(D) 9

ઉકેલ : આપેલ અતિવલય $\frac{x^2}{144} - \frac{y^2}{81} = \frac{1}{25}$ પરથી, $\frac{x^2}{\frac{144}{25}} - \frac{y^2}{\frac{81}{25}} = 1$ તેથી $a^2 = \frac{144}{25}$, $b^2 = \frac{81}{25}$ છે.

$$\text{હવે, } b^2 = a^2 (e^2 - 1) \text{ પરથી, } \frac{81}{25} = \frac{144}{25} (e^2 - 1)$$

$$\therefore e^2 = \frac{9}{16} + 1 = \frac{25}{16}. \quad \text{આથી, } e = \frac{5}{4}$$

$$\therefore \text{ આપેલા અતિવલયની નાભિ } = (\pm 3, 0) \quad (1)$$

હવે, ઉપવલય માટે, $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ આપેલ છે. $4 > b$ જરૂરી છે. $(a > b)$ (નાભિ સમાન હોવા માટે)

$$\therefore b^2 = a^2 (1 - (e')^2). \quad \text{આથી, } (e')^2 = 1 - \frac{b^2}{16} \quad (2)$$

$$\therefore \text{ઉપવલયની નાભિ} = (\pm 4e', 0) \quad (3)$$

આપેલ શરત મુજબ (1) અને (3) પરથી $4e' = 3$. આથી, $e' = \frac{3}{4}$

$$\therefore \text{સમીકરણ (2) પરથી } (e')^2 = 1 - \frac{b^2}{16}$$

$$\therefore \frac{b^2}{16} = 1 - \frac{9}{16} = \frac{7}{16}$$

$$\therefore b^2 = 7.$$

$$\therefore b = \sqrt{7} < 4 \text{ છે જ.}$$

જવાબ : (C)

(190) અતિવલય $\frac{x^2}{\cos^2 \alpha} - \frac{y^2}{\sin^2 \alpha} = 1$ માં α ની કિંમતથી સ્વતંત્ર છે. (જ્યાં $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$)

(A) ઉત્કેન્દ્રતા (B) નાભિના યામ (C) નિયામિકાનાં સમીકરણ (D) શિરોબિંદુ

ઉકેલ : આપેલ અતિવલય $\frac{x^2}{\cos^2 \alpha} - \frac{y^2}{\sin^2 \alpha} = 1$ છે.

$$\therefore a^2 = \cos^2 \alpha, b^2 = \sin^2 \alpha$$

$$\text{હવે, } b^2 = a^2(e^2 - 1)$$

$$\therefore e^2 - 1 = \tan^2 \alpha$$

$$\therefore e^2 = \sec^2 \alpha. \text{ આથી, ઉત્કેન્દ્રતા } e = \sec \alpha \quad (\text{જ્યાં } 0 < \alpha < \frac{\pi}{2})$$

$$\text{અતિવલયની નિયામિકાનાં સમીકરણ } x = \pm \frac{a}{e} = \pm \frac{\cos \alpha}{\sec \alpha} \Rightarrow x = \pm \cos^2 \alpha$$

$$\text{અતિવલયનાં શિરોબિંદુના યામ } = (\pm a, 0) = (\pm \cos \alpha, 0)$$

$$\text{અતિવલયની નાભિના યામ } = (\pm ae, 0) = (\pm 1, 0)$$

$\therefore$ સ્પષ્ટ છે કે નાભિના યામ એ α થી સ્વતંત્ર છે.

જવાબ : (B)

(191) ઉપવલય $3x^2 + 4y^2 = 12$ ના પ્રધાન અક્ષ અને ગૌણ અક્ષ એ અતિવલયની મુખ્ય અક્ષ તથા સહાયક અક્ષ હોય, તથા અતિવલયના મુખ્ય અક્ષની લંબાઈ $2\sin\theta$ હોય, તેવા અતિવલયનું સમીકરણ

$$(A) x^2 \cos^2 \theta - y^2 \sec^2 \theta = 1$$

$$(B) x^2 \sec^2 \theta - y^2 \cos^2 \theta = 1$$

$$(C) x^2 \sec^2 \theta - y^2 \cos^2 \theta = 1$$

$$(D) x^2 \cos^2 \theta - y^2 \sin^2 \theta = 1 \quad (\text{IIT : 2007})$$

ઉકેલ : આપેલ ઉપવલય $3x^2 + 4y^2 = 12$ પરથી, $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

$$\therefore a^2 = 4, b^2 = 3$$

$$\text{હવે, } b^2 = a^2(1 - e^2). \text{ આથી, } e^2 = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4} \text{ અને આથી, } e = \frac{1}{2}$$

માંગેલ અતિવલય માટે મુખ્ય અક્ષની લંબાઈ $2d = 2\sin\theta$, ($a = d = \sin\theta$) છે. અહીં $ae = 1$ છે.

$$\therefore e \sin\theta = 1$$

$$\therefore e = \operatorname{cosec} \theta$$

$$\text{હવે, } b^2 = a^2(e^2 - 1) \text{ પરથી, } (b')^2 = \sin^2 \theta (\operatorname{cosec}^2 \theta - 1)$$

$$(b')^2 = \cos^2 \theta$$

$$\therefore \text{ માંગેલ અતિવલયનું સમીકરણ } \frac{x^2}{\sin^2 \theta} - \frac{y^2}{\cos^2 \theta} = 1$$

$$\therefore x^2 \operatorname{cosec}^2 \theta - y^2 \sec^2 \theta = 1$$

જવાબ : (A)

(192) જેની નાભિઓ $(-2, 0)$ અને $(2, 0)$ હોય તથા ઉત્કેન્દ્રતા 2 હોય તેવા અતિવલયનું સમીકરણ

$$(A) \quad x^2 - 3y^2 = 3 \quad (B) \quad 3x^2 - y^2 = 3 \quad (C) \quad 3y^2 - x^2 = 3 \quad (D) \quad y^2 - 3x^2 = 3$$

(AIEEE : 2011)

ઉકેલ : અહીં નાભિ $(2, 0) = (ae, 0)$ લઈએ. $ae = 2$ અને $e = 2$ હોવાથી $a = 1$.

$$\therefore b^2 = a^2(e^2 - 1) \text{ પરથી } b^2 = 3.$$

$$\therefore \text{ અતિવલયનું સમીકરણ } \frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{3} = 1$$

$$\therefore 3x^2 - y^2 = 3$$

જવાબ : (B)

JEE માં પુછાયેલા દાખલાઓ

(193) જો રેખાઓ $5x + 8y = 13$ અને $4x - y = 3$ એ વર્તુળ

$$x^2 + y^2 - 2(a^2 - 7a + 11)x - 2(a^2 - 6a + 6)y + b^3 + 1 = 0 \text{ ના વ્યાસને સમાવે તો } \dots$$

(JEEonline April : 2013)

$$(A) \quad a = 5 \text{ અને } b \in (-\infty, 1)$$

$$(B) \quad a = 5 \text{ અને } b \notin (-1, 1)$$

$$(C) \quad a = 1 \text{ અને } b \notin (-1, 1)$$

$$(D) \quad a = 2 \text{ અને } b \in (-\infty, 1)$$

ઉકેલ : અહીં, $5x + 8y = 13$ અને $4x - y = 3$ એ આપેલા વર્તુળના વ્યાસને સમાવતી રેખાઓ છે.

તેથી બંને રેખાઓનું છેદબિંદુ $(1, 1)$ એ આપેલ વર્તુળનું કેન્દ્ર થશે.

$$\text{આપેલ વર્તુળ } x^2 + y^2 - 2(a^2 - 7a + 11)x - 2(a^2 - 6a + 6)y + b^3 + 1 = 0$$

$$\text{પરથી, } g = -(a^2 - 7a + 11), f = -(a^2 - 6a + 6), c = b^3 + 1$$

$$\therefore \text{ વર્તુળનું કેન્દ્ર } = (a^2 - 7a + 11, a^2 - 6a + 6)$$

$$\therefore (1, 1) = (a^2 - 7a + 11, a^2 - 6a + 6)$$

$$\therefore a^2 - 7a + 10 = 0 \text{ અને } a^2 - 6a + 5 = 0$$

$$\therefore (a - 5)(a - 2) = 0 \text{ અને } (a - 5)(a - 1) = 0$$

$$\therefore a - 5 = 0 \text{ હોવું જોઈએ. આથી } a = 5$$

$$\text{વળી, વર્તુળ થવા માટે } g^2 + f^2 - c > 0$$

$$\therefore 1+1-(b^3+1) > 0$$

$$\therefore b^3 < 1$$

$$\therefore b < 1$$

$$\therefore b \in (-\infty, 1)$$

આમ, $a = 5$ અને $b \in (-\infty, 1)$

જવાબ : (A)

(194) જો વર્તુળ C એ $(4, 0)$ માંથી પસાર થાય અને વર્તુળ $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 12 = 0$ ને $(1, -1)$ આગળ બહારથી સ્પર્શે, તો C ની ત્રિજ્યા


(A) 5

(B) $2\sqrt{5}$

(C) 4

(D) $\sqrt{57}$

(JEE online April : 2013)



આકૃતિ 9.73

ઉકેલ : વર્તુળ $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 12 = 0$ નું કેન્દ્ર $= (-2, 3)$

ધારો કે વર્તુળ C નું સમીકરણ $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ છે. આ વર્તુળ $(4, 0)$ અને $(1, -1)$ માંથી પસાર થાય છે.

$$\therefore 16 + 8g + c = 0 \quad (1)$$

$$2g - 2f + c + 2 = 0 \quad (2)$$

$$\text{સમીકરણ (1) અને (2) પરથી, } 3g + f + 7 = 0 \quad (3)$$

હવે, બંને વર્તુળો $(1, -1)$ આગળ બહારથી સ્પર્શે છે.

$\therefore$ બંને વર્તુળોનાં કેન્દ્રો અને સ્પર્શબિંદુ સમરેખ હોય.

અર્થાત્ $(-2, 3)$, $(-g, -f)$, $(1, -1)$ સમરેખ છે.

$$\therefore \begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ -g & -f & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\therefore -2(-f+1)-3(-g-1)+1(g+f)=0$$

$$\therefore 4g+3f+1=0 \quad (4)$$

સમીકરણ (3) અને (4) ઉકેલતાં, $g = -4$, $f = 5$. તેથી $c = 16$ મળે.

$$\therefore \text{માંગેલ વર્તુળની ત્રિજ્યા} = \sqrt{g^2 + f^2 - c} = 5$$

જવાબ : (A)

(195) જો વર્તુળ $x^2 + y^2 - 6x - 8y + (25 - a^2) = 0$ એ X-અક્ષને સ્પર્શે તો $a = \dots$

- (A) 0 (B) ± 4 (C) ± 2 (D) ± 3 (JEE online April : 2013)

ઉકેલ : વર્તુળ $x^2 + y^2 - 6x - 8y + (25 - a^2) = 0$ પરથી,

$$2g = -6, 2f = -8, c = 25 - a^2$$

$$\therefore \text{વર્તુળનું કેન્દ્ર} = (-g, -f) = (3, 4)$$

$$\text{વર્તુળની ત્રિજ્યા} = \sqrt{g^2 + f^2 - c} = \sqrt{9 + 16 - 25 + a^2} = |a|$$

અહીં, વર્તુળ X-અક્ષને સ્પર્શે છે.

$$\therefore \text{ત્રિજ્યા} = | \text{કેન્દ્રનો } y\text{-યામ} |$$

$$|a| = |4|$$

$$\therefore a = \pm 4$$

બીજી રીત :

$y = 0$ લેતાં $x^2 - 6x + 25 - a^2 = 0$ ને સમાન બીજ છે.

$$\therefore 36 = 4(25 - a^2)$$

$$\therefore a^2 = 16$$


$$\therefore a = \pm 4$$

જવાબ : (B)

(196) (1, -2) માંથી પસાર થતું અને X-અક્ષને (3, 0) આગળ સ્પર્શતું વર્તુળ બિંદુમાંથી પણ પસાર થાય છે.

- (A) (-5, 2) (B) (2, -5) (C) (5, -2) (D) (-2, 5)

(JEE April : 2013)



આકૃતિ 9.74

ઉકેલ : અહીં વર્તુળ X-અક્ષને (3, 0) આગળ સ્પર્શે છે અને (1, -2) માંથી પસાર થાય છે.

ધારો કે વર્તુળનું કેન્દ્ર (3, -r) છે.

કેન્દ્રથી વર્તુળ પરના બિંદુ સુધીનું અંતર ત્રિજ્યા જેટલું હોય.

$$\therefore \text{ત્રિજ્યા} = \sqrt{(3-1)^2 + (-r+2)^2}$$

$$r^2 = 4 + 4 - 4r + r^2$$

$$\therefore 4r = 8. \text{ આથી, } r = 2$$

$$\therefore \text{વર્તુળનું કેન્દ્ર } (3, -2) \text{ છે.}$$

$$\therefore \text{વર્તુળનું સમીકરણ } (x-3)^2 + (y+2)^2 = 4$$

વળી (5, -2) એ વર્તુળના સમીકરણનું સમાધાન કરે છે.

$\therefore$ આપેલ વર્તુળ (5, -2) માંથી પણ પસાર થાય છે.

જવાબ : (C)

(197) વર્તુળો $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 6 = 0$ અને $x^2 + y^2 - 10x - 10y + \lambda = 0$ હોય, તો બંને વર્તુળોને બરાબર બે સામાન્ય સ્પર્શકો દોરી શકાય તેવી λ ની તમામ કિંમતોનો ગણ (JEE online April : 2014)

- (A) (12, 32) (B) (18, 42) (C) (11, 24) (D) (18, 48)

ઉકેલ : અહીં વર્તુળને બરાબર બે સામાન્ય સ્પર્શકો દોરી શકાય છે. તેથી બંને વર્તુળો બે ભિન્ન બિંદુઓમાં છેદે.

હવે, $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 6 = 0$ નું કેન્દ્ર, $C_1(2, 2)$, ત્રિજ્યા $r_1 = \sqrt{2}$

હવે, આપેલાં વર્તુળો $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 6 = 0$ અને $x^2 + y^2 - 10x - 10y + \lambda = 0$ ની સામાન્ય જોવાને સમાવતી રેખાનું સમીકરણ $6x + 6y + 6 - \lambda = 0$ મળે.

અહીં, બંને વર્તુળો બે ભિન્ન બિંદુઓમાં છેદતાં હોવાથી, વર્તુળના કેન્દ્રનું રેખા $6x + 6y + 6 - \lambda = 0$ સુધીનું અંતર ત્રિજ્યા કરતાં ઓછું થાય.

$$\therefore \left| \frac{6(2) + 6(2) + 6 - \lambda}{\sqrt{(6)^2 + (6)^2}} \right| < \sqrt{2}$$

$$\therefore |30 - \lambda| < 12$$

$$\therefore -12 < 30 - \lambda < 12$$

$$\therefore 30 - \lambda > -12, \text{ અને } 30 - \lambda < 12$$

$$\therefore \lambda < 42, \quad \lambda > 18$$

$$\therefore 18 < \lambda < 42$$

$$\therefore \lambda \in (18, 42)$$

જવાબ : (B)

બીજી રીત :

$$C_1(2, 2), C_2(5, 5)$$

$$|r_1 - r_2| < C_1 C_2 < r_1 + r_2$$

$$|\sqrt{2} - \sqrt{50 - \lambda}| < \sqrt{18} < \sqrt{2} + \sqrt{50 - \lambda}$$

$$\therefore 52 - \lambda - 2\sqrt{100 - 2\lambda} < 18 < 52 - \lambda + 2\sqrt{100 - 2\lambda}$$

$$\therefore 34 - \lambda < -2\sqrt{100 - 2\lambda} \quad \text{તથા} \quad \lambda - 34 < 2\sqrt{100 - 2\lambda}$$

$$\therefore (34 - \lambda)^2 < 400 - 8\lambda$$

$$\therefore 1156 - 68\lambda + \lambda^2 < 400 - 8\lambda$$

$$\therefore \lambda^2 - 60\lambda + 756 < 0$$

$$(\lambda - 18)(\lambda - 42) < 0$$

$$\therefore \lambda \in (18, 42)$$

(198) બે વર્તુળો $x^2 + y^2 = 16$ અને $x^2 + y^2 - 2y = 0$ ને સામાન્ય સ્પર્શકો દોરી શકાય.

(A) એક

(B) બે

(C) ત્રણ

(D) શૂન્ય

(JEE online April : 2014)

ઉકેલ : અહીં $x^2 + y^2 = 16$ નું કેન્દ્ર $C_1(0,0)$ તથા ત્રિજ્યા $r_1 = 4$ તથા વર્તુળ $x^2 + y^2 - 2y = 0$ નું કેન્દ્ર $C_2(0,1)$ તથા ત્રિજ્યા $r_2 = 1$

અહીં $C_1C_2 = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1$ તથા $|r_1 - r_2| = 3$

$\therefore C_1C_2 < |r_1 - r_2|$

એક વર્તુળ બીજા વર્તુળના અંદરના ભાગમાં છે તેમ કહી શકાય.

$\therefore$ એક પણ સ્પર્શક ન દોરી શકાય.

જવાબ : (D)

(199) વર્તુળ $x^2 + y^2 = 16$ ની જીવાને સમાવતી રેખા $3x + y + 5 = 0$ ને વ્યાસ તરીકે લઈ દોરેલ વર્તુળનું સમીકરણ


(JEE online April : 2014)

(A) $x^2 + y^2 + 3x + y + 1 = 0$

(B) $x^2 + y^2 + 3x + y - 11 = 0$

(C) $x^2 + y^2 + 3x + y - 2 = 0$

(D) $x^2 + y^2 + 3x + y - 22 = 0$



આકૃતિ 9.75

ઉકેલ : અહીં આપેલ માહિતી પરથી માંગેલ વર્તુળ $x^2 + y^2 = 16$ ની સામાન્ય જીવાને સમાવતી રેખા $3x + y + 5 = 0$ છે.

તેથી, માંગેલ વર્તુળ $x^2 + y^2 = 16$ અને $3x + y + 5 = 0$ ના છેદબિંદુમાંથી પસાર થાય છે.

તેથી, ધારો કે માંગેલ વર્તુળનું સમીકરણ $(x^2 + y^2 - 16) + \lambda(3x + y + 5) = 0$ છે.

$\therefore x^2 + y^2 + 3\lambda x + \lambda y + 5\lambda - 16 = 0$ છે.

$\therefore$ માંગેલ વર્તુળનું કેન્દ્ર $= \left(\frac{-3\lambda}{2}, \frac{-\lambda}{2} \right)$ થશે અને તે રેખા $3x + y + 5 = 0$ પર છે.

$$3\left(\frac{-3\lambda}{2}\right) + \left(\frac{-\lambda}{2}\right) + 5 = 0$$

$$\text{આથી } -5\lambda + 5 = 0$$

$$\therefore \lambda = 1$$

તેથી માંગેલ વર્તુળનું સમીકરણ, $x^2 + y^2 + 3x + y - 11 = 0$

જવાબ : (B)

(200) ધારો કે C એ $(1, 1)$ કેન્દ્ર અને 1 ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ C છે. જો T એ $(0, y)$ કેન્દ્રવાળું, ઊગમબિંદુમાંથી પસાર થતું અને વર્તુળ C ને બહારથી સ્પર્શતું વર્તુળ હોય, તો વર્તુળ T ની ત્રિજ્યા =


(JEE April : 2014)

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $\frac{1}{4}$

(C) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$

(D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$



ઉકેલ : અહીં વર્તુળ C નું કેન્દ્ર $C_1(1, 1)$ અને ત્રિજ્યા $r_1 = 1$ છે.

વર્તુળ T નું કેન્દ્ર $C_2(0, y)$ અને ત્રિજ્યા r_2 છે.

હવે, વર્તુળ T નું કેન્દ્ર Y -અક્ષ પર છે અને ઊગમબિંદુમાંથી પસાર થાય છે એટલે કે વર્તુળ T , X -અક્ષને ઊગમબિંદુ આગળ સ્પર્શે છે.

$$\therefore \text{ત્રિજ્યા } r_2 = |\text{કેન્દ્રનો } y\text{-યામ}| = y \text{ (બંને વર્તુળો બહારથી સ્પર્શતા હોવાથી } y > 0)$$

હવે, બંને વર્તુળો પરસ્પર બહારથી સ્પર્શે છે.

$$\therefore C_1C_2 = r_1 + r_2$$

$$\therefore (1-0)^2 + (y-1)^2 = (1+y)^2$$

$$\therefore 1 + y^2 - 2y + 1 = y^2 + 2y + 1$$

$$\therefore 4y = 1. \text{ આથી, } y = \frac{1}{4}$$

$$\therefore \text{વર્તુળ } T \text{ની ત્રિજ્યા } r_2 = \frac{1}{4}$$

જવાબ : (B)

(201) જો બિંદુ $(1, 4)$ એ વર્તુળ $x^2 + y^2 - 6x - 10y + p = 0$ ની અંદરના ભાગમાં હોય અને વર્તુળ અક્ષોને સ્પર્શતું કે કાપતું ન હોય, તો p ની તમામ કિંમતોનો ગણ

(A) $(0, 25)$

(B) $(25, 39)$

(C) $(9, 25)$

(D) $(25, 29)$

(JEE online April : 2014)

ઉકેલ : બિંદુ $(1, 4)$ એ વર્તુળ $x^2 + y^2 - 6x - 10y + p = 0$ ના અંદરના ભાગમાં છે.

$$\therefore 1 + 16 - 6(1) - 10(4) + p < 0$$

$$\therefore p < 29$$

હવે, વર્તુળ $x^2 + y^2 - 6x - 10y + p = 0$ નું કેન્દ્ર $(3, 5)$ તથા ત્રિજ્યા $= \sqrt{34 - p}$

આપેલ શરત મુજબ, વર્તુળ અક્ષોને સ્પર્શતું કે કાપતું નથી.

$$\therefore \text{વર્તુળની ત્રિજ્યા} < 3 \quad (< 5 \text{ પણ})$$

$$\therefore \sqrt{34 - p} < 3$$

$$\therefore 34 - p < 9$$

$$\therefore p > 25$$

આમ, $25 < p < 29$. આથી $p \in (25, 29)$

જવાબ : (D)

(202) જો પરવલય $y^2 = 6x$ ની નાભિમાંથી જવા દોરવામાં આવે છે કે જેથી પરવલયનાં શિરોબિંદુથી નાભિજવાનું

અંતર $\frac{\sqrt{5}}{2}$ હોય તો તેનો ઢાળ..... હશે.


(A) $\frac{\sqrt{5}}{2}$

(B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(C) $\frac{2}{\sqrt{5}}$

(D) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (JEE online)

ઉકેલ :



આકૃતિ 9.77

અહીં $y^2 = 6x$ પરથી $a = \frac{3}{2}$.

$$\therefore \text{નાભિ } S(a, 0) = \left(\frac{3}{2}, 0\right) \text{ છે.}$$

ધારો કે નાભિજવાનું એક અંત્યબિંદુ $A(at^2, 2at) = \left(\frac{3}{2}t^2, 3t\right)$ છે. ($t > 0$)

$$\therefore \text{નાભિજવાનો ઢાળ} = \frac{3t - 0}{\frac{3}{2}t^2 - \frac{3}{2}} = \frac{2t}{t^2 - 1}$$

$$\therefore \text{નાભિજવાનું સમીકરણ } y - 0 = \frac{2t}{t^2 - 1} \left(x - \frac{3}{2}\right)$$

$$\therefore 2tx + (1-t^2)y - 3t = 0 \text{ મળે.}$$

હવે, ઊગમબિંદુ (શિરોબિંદુ) (0,0)થી નાભિજીવાનું અંતર $\frac{\sqrt{5}}{2}$ છે.

$$\therefore \frac{|3t|}{\sqrt{4t^2 + (1-t^2)^2}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$\therefore 6|t| = \sqrt{5}(1+t^2)$$

$$\therefore \sqrt{5}t^2 - 6|t| + \sqrt{5} = 0$$

$$\therefore (\sqrt{5}t - 1)(t - \sqrt{5}) = 0 \quad (|t| = t)$$

$$\therefore t = \sqrt{5} \text{ અથવા } t = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\therefore \text{જો } t = \sqrt{5}, \text{ તો નાભિજીવાનો ઢાળ} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$\text{જો } t = \frac{1}{\sqrt{5}} \text{ તો ઢાળ} = \frac{-\sqrt{5}}{2}$$

જવાબ : (A)

(203) ઉપવલય $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ ની નાભિઓમાંથી પસાર થતા (0, 3) કેન્દ્ર ધરાવતાં વર્તુળનું સમીકરણ છે.

$$(A) \quad x^2 + y^2 - 6y + 7 = 0$$

$$(B) \quad x^2 + y^2 - 6y - 5 = 0$$

$$(C) \quad x^2 + y^2 - 6y - 7 = 0$$

$$(D) \quad x^2 + y^2 - 6y + 5 = 0$$

(JEE : 2013)

ઉકેલ : આપેલ ઉપવલય $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ પરથી $a^2 = 16, b^2 = 9$. આથી $a > b$

$$\text{હવે, } b^2 = a^2(1-e^2). \text{ આથી, } 9 = 16(1-e^2)$$

$$\therefore e^2 = \frac{7}{16}. \text{ આથી, } e = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

$$\text{ઉપવલયની નાભિઓ } (\pm ae, 0) = (\pm\sqrt{7}, 0)$$

વર્તુળ $(\sqrt{7}, 0), (-\sqrt{7}, 0)$ માંથી પસાર થાય છે અને વર્તુળનું કેન્દ્ર (0, 3) છે.

$$\text{તેથી, વર્તુળની ત્રિજ્યા} = \sqrt{7+9} = 4$$

$$\therefore \text{ માંગેલ વર્તુળનું સમીકરણ } (x-0)^2 + (y-3)^2 = (4)^2$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 6y - 7 = 0$$

જવાબ : (C)

એક કરતાં વધુ વિકલ્પો સાચા હોય તેવા પ્રશ્નો :


(204) પરવલય $y^2 = 2ax$ નું નાભિ એ વર્તુળનું કેન્દ્ર હોય તથા પરવલય $y^2 = 2ax$ ની નિયામિકા તે વર્તુળનો એક સ્પર્શક હોય, તો તે વર્તુળ અને પરવલયના છેદબિંદુના યામ ($a > 0$)

$$(A) \quad \left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)$$

$$(B) \quad \left(\frac{a}{2}, -a\right)$$

$$(C) \quad \left(\frac{a}{2}, -\frac{a}{2}\right)$$

$$(D) \quad \left(\frac{a}{2}, a\right)$$



ઉકેલ : પરવલયના નાભિલંબની લંબાઈ = $2a$ તથા નાભિના યામ $\left(\frac{a}{2}, 0\right)$ અને પરવલયની નિયામિકા $x = -\frac{a}{2}$

આપેલ માહિતી પરથી, વર્તુળનું કેન્દ્ર $= \left(\frac{a}{2}, 0\right)$ તથા રેખા $x = -\frac{a}{2}$ વર્તુળને સ્પર્શે છે.

$\therefore$ વર્તુળની ત્રિજ્યા $= a$ થશે.

$\therefore$ વર્તુળનું સમીકરણ $\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + y^2 = a^2$

$\therefore$ સમીકરણ $y^2 = 2ax$ અને $\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + y^2 = a^2$ ઉકેલતાં,

$$x^2 - ax + \frac{a^2}{4} + 2ax - a^2 = 0$$

$$\therefore x^2 + ax - \frac{3a^2}{4} = 0 \text{ એટલે કે } 4x^2 + 4ax - 3a^2 = 0$$

$$\therefore (2x + 3a)(2x - a) = 0. \text{ તેથી } x = \frac{a}{2} \quad (x > 0)$$

$$\therefore \text{ માંગેલ છેદબિંદુ } = \left(\frac{a}{2}, \pm a\right)$$

જવાબ : (B), (D)


(205) જો A અને B એ પરવલય $y^2 = 4x$ પરનાં બે ભિન્ન બિંદુઓ હોય તથા r ત્રિજ્યાવાળું અને $\overline{AB}$ જેનો વ્યાસ હોય તેવું વર્તુળ પરવલયની અક્ષને સ્પર્શે, તો $\overline{AB}$ નો ઢાળ

(A) $\frac{1}{r}$

(B) $-\frac{1}{r}$

(C) $\frac{2}{r}$

(D) $-\frac{2}{r}$



આકૃતિ 9.79

ઉકેલ : અહીં, પરવલય $y^2 = 4ax$ પરથી $4a = 4$. આથી, $a = 1$

A અને B પરવલય પરના બિંદુ છે.

ધારો કે A ના યામ $= (at_1^2, 2at_1) = (t_1^2, 2t_1)$ તથા B ના યામ $= (at_2^2, 2at_2) = (t_2^2, 2t_2)$

$\overline{AB}$ વર્તુળનો વ્યાસ છે. તેથી, વર્તુળનું કેન્દ્ર $\left(\frac{t_1^2 + t_2^2}{2}, t_1 + t_2 \right)$

હવે, વર્તુળ પરવલયની અક્ષને સ્પર્શ છે અર્થાત્ વર્તુળ X -અક્ષને સ્પર્શ છે.

$\therefore$ વર્તુળના કેન્દ્રથી X -અક્ષ સુધીનું અંતર = ત્રિજ્યા

$$\therefore r = |t_1 + t_2|$$

$$\therefore t_1 + t_2 = r \quad \text{અથવા} \quad t_1 + t_2 = -r$$

$$\therefore \overline{AB} \text{ નો ઢાળ} = \frac{2t_2 - 2t_1}{t_2^2 - t_1^2} = \frac{2}{t_1 + t_2} \quad \therefore \text{મિંગેલ ઢાળ} = \frac{2}{r} \text{ અથવા } = -\frac{2}{r}$$

જવાબ : (C), (D)

(206) પરવલય $y^2 - kx + 12 = 0$ ની નિયામિકા $x + 2 = 0$ હોય, તો k ની કિંમત =

- (A) 4 (B) -4 (C) 12 (D) 16

ઉકેલ : અહીં, $y^2 = kx - 12$

$$\therefore (y-0)^2 = k\left(x - \frac{12}{k}\right)$$

ઊગમબિંદુનું $\left(\frac{12}{k}, 0\right)$ આગળ સ્થાનાંતર કરતાં, $x' = x - \frac{12}{k}$, $y' = y - 0$

$\therefore$ પરવલયનું સમીકરણ $y'^2 = kx'$ આથી, $4a = k$. આથી, $a = \frac{k}{4}$

$\therefore y'^2 = kx'$ પરવલયની નિયામિકા $x' = -a$ પરથી $x' = -\frac{k}{4}$ પરંતુ $x' = x - \frac{12}{k}$

$\therefore x - \frac{12}{k} = -\frac{k}{4}$. આથી, $x = \frac{12}{k} - \frac{k}{4}$. વળી, તે તો $x = -2$ છે.

$$\therefore -2 = \frac{48 - k^2}{4k}$$

$$\therefore k^2 - 8k - 48 = 0$$

$$\therefore k = 12 \quad \text{અથવા} \quad k = -4$$

જવાબ : (B), (C)

(207) જો પરવલય $x^2 - 2y - 4x + 4 = 0$ નું શિરોબિંદુ M હોય, નાભિલંબની લંબાઈ L હોય તો જે પરવલયનું

શિરોબિંદુ M , નાભિલંબની લંબાઈ $\frac{1}{2}L$ તથા જેનો અક્ષ આપેલ પરવલયના અક્ષને લંબ હોય, તેવા પરવલયનું સમીકરણ

(AIEEE : 2005)

- (A) $y^2 = 2x - 1$ (B) $y^2 = x - 2$ (C) $y^2 = 2 - x$ (D) $y^2 = x - 1$

ઉકેલ : પરવલય $x^2 - 2y - 4x + 4 = 0$ પરથી, $x^2 - 4x + 4 = 2y$

$$\therefore (x-2)^2 = 2y$$

$$\therefore x'^2 = 2y' \quad (x' = x-2, y' = y-0)$$

નાભિલંબની લંબાઈ $= 4|a| = 2$. આથી, $|a| = \frac{1}{2}$

પરવલયનું શિરોબિંદુ $M(2, 0)$ છે. વળી $L = 2$

હવે, માંગેલ પરવલયના નાભિલંબની લંબાઈ $= \frac{1}{2}(2) = 1$

$\therefore$ માંગેલ પરવલયનું સમીકરણ, $(y-0)^2 = \pm 1(x-2)$

$$\therefore y^2 = x-2 \text{ અથવા } y^2 = 2-x$$

જવાબ : (B), (C)


(208) પરવલય $y^2 = 16x$ ની નાભિજીવા વર્તુળ $(x-6)^2 + y^2 = 2$ નો સ્પર્શક હોય, તો નાભિજીવાનો ઢાળ =

(A) 1

(B) -1

(C) 2

(D) -2



આકૃતિ 9.80

ઉકેલ : વર્તુળ $(x-6)^2 + y^2 = 2$ નું કેન્દ્ર $(6, 0)$ તથા ત્રિજ્યા $= \sqrt{2}$

પરવલય $y^2 = 16x$ પરથી $a = 4$ આથી, પરવલયનું નાભિ $(4, 0)$ થશે.

$\therefore$ પરવલયની નાભિજીવા $\overleftrightarrow{PQ}$ નું સમીકરણ $y = m(x-4)$

રેખા $mx - y - 4m = 0$ એ વર્તુળ $(x-6)^2 + y^2 = 2$ નો સ્પર્શક છે.

$\therefore$ કેન્દ્ર $(6, 0)$ થી $mx - y - 4m = 0$ નું લંબઅંતર = વર્તુળની ત્રિજ્યા

$$\therefore \frac{|m(6) - 4m|}{\sqrt{1+m^2}} = \sqrt{2}$$

$$\therefore 4m^2 = 2(1+m^2)$$

$$\therefore 2m^2 = 2$$

$$\therefore m^2 = 1 \text{ આથી, } m = \pm 1$$

જવાબ : (A), (B)

(209) ધારો કે L_1 એ વક્રો $x^2 + y^2 = 9$ અને $y^2 = 8x$ ની સામાન્ય જીવાની લંબાઈ છે અને L_2 એ $y^2 = 8x$ ના નાભિલંબની લંબાઈ છે, તો

- (A) $L_1 > L_2$ (B) $L_1 = L_2$ (C) $L_1 < L_2$ (D) $\frac{L_2}{L_1} = \sqrt{2}$ (JEE online)

ઉકેલ : આપેલ વક્રો $x^2 + y^2 = 9$ અને $y^2 = 8x$ પરથી છેદબિંદુ શોધીએ.

$$x^2 + 8x - 9 = 0$$

$$\therefore (x + 9)(x - 1) = 0$$

$$\therefore x = -9 \text{ અથવા } x = 1$$

પરંતુ $x = -9$, તો $y^2 = -72 < 0$ જે શક્ય નથી.

$$\therefore x = 1 \text{ તો } y^2 = 8. \text{ આથી, } y = \pm 2\sqrt{2}$$

$$\therefore \text{ બંને વક્રોના છેદબિંદુ } (1, 2\sqrt{2}) \text{ અને } (1, -2\sqrt{2})$$

$$\therefore L_1 = \text{ બંને વક્રોના સામાન્ય જીવાની લંબાઈ } = 4\sqrt{2}$$

$$\text{હવે, } y^2 = 8x \text{ પરથી } a = 2$$

$$\therefore \text{ વક્ર } y^2 = 8x \text{ ના નાભિલંબની લંબાઈ } L_2 = 4|a| = 8$$

$$\therefore L_2 = \sqrt{2} L_1, \text{ તથા } L_2 > L_1$$

જવાબ : (C), (D)

(210) ઉપવલય $4x^2 + 9y^2 = 1$ પરનાં જે બિંદુઓ આગળ દોરેલા સ્પર્શકો રેખા $8x - 9y = 0$ ને સમાંતર હોય, તેવાં બિંદુઓના યામ =

- (A) $\left(\frac{2}{5}, \frac{1}{5}\right)$ (B) $\left(\frac{-2}{5}, \frac{1}{5}\right)$ (C) $\left(\frac{2}{5}, \frac{-1}{5}\right)$ (D) $\left(\frac{-2}{5}, \frac{-1}{5}\right)$

ઉકેલ : ઉપવલયનો સ્પર્શક અને રેખા $8x - 9y = 0$ સમાંતર રેખાઓ હોવાથી બંનેના ઢાળ સમાન થશે.

$$\text{રેખા } 8x - 9y = 0 \text{ નો ઢાળ } = \frac{8}{9} = m$$

$$\text{ઉપવલય } 4x^2 + 9y^2 = 1 \Rightarrow 8x + 18y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\therefore \text{ ઉપવલયના સ્પર્શકનો ઢાળ } \frac{dy}{dx} = \frac{-4x}{9y}$$

$$\text{આપેલ શરત મુજબ } \frac{-4x}{9y} = \frac{8}{9} \text{ આથી, } x = -2y$$

$$\text{ઉપવલય } 4x^2 + 9y^2 = 1 \text{ પરના બિંદુનો } x\text{-યામ } = -2y \text{ હોવાથી } 16y^2 + 9y^2 = 1$$

$$\therefore 25y^2 = 1. \text{ આથી, } y = \pm \frac{1}{5}$$

$$y = \frac{1}{5} \Rightarrow x = -2y \text{ પરથી } x = \frac{-2}{5}$$

$$y = \frac{-1}{5} \Rightarrow x = -2y \text{ પરથી } x = \frac{2}{5}$$

$$\therefore \text{ માંગેલ બિંદુઓ } \left(\frac{-2}{5}, \frac{1}{5}\right), \left(\frac{2}{5}, \frac{-1}{5}\right)$$

બીજી રીત :

સ્પર્શકના સમીકરણ

$$y = mx \pm \sqrt{a^2 m^2 + b^2} \text{ પરથી,}$$

$$y = \frac{8}{9}x \pm \sqrt{\left(\frac{1}{4} \times \frac{64}{81}\right) + \frac{1}{9}} \quad \text{એટલે કે } y = \frac{8x}{9} \pm \frac{5}{9}$$

$$\text{સ્પર્શબિંદુના યામ} = \left(\frac{-a^2m}{c}, \frac{b^2}{c} \right)$$

$$= \left(\frac{-\frac{1}{4} \times \frac{8}{9}}{\pm \frac{5}{9}}, \frac{\frac{1}{9}}{\pm \frac{5}{9}} \right) = \left(\mp \frac{2}{5}, \pm \frac{1}{5} \right)$$

$$= \left(\frac{-2}{5}, \frac{1}{5} \right) \text{ અથવા } \left(\frac{2}{5}, \frac{-1}{5} \right)$$

જવાબ : (B), (C)

(211) ધારો કે d એ ઉપવલય $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ના કેન્દ્રથી ઉપવલય પરના બિંદુ P એ દોરેલા સ્પર્શક પરનું લંબઅંતર છે.

જો S અને S' ઉપવલયની નાભિઓ હોય તો $(PS - PS')^2 = \dots\dots$

$$(A) \quad 4a^2e^2 \cos^2 \theta \quad (B) \quad 2a^2e^2 \cos^2 \theta \quad (C) \quad 4a^2 \left(1 + \frac{b^2}{d^2} \right) \quad (D) \quad 4a^2 \left(1 - \frac{b^2}{d^2} \right)$$

ઉકેલ : ધારો કે ઉપવલય $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ માં $a > b$ છે તથા e તેની ઉત્કેન્દ્રતા છે.

$S(ae, 0)$, $S'(-ae, 0)$ ઉપવલયની નાભિઓ છે.

હવે, ઉપવલય પરનાં બિંદુ $P(a \cos \theta, b \sin \theta)$ આગળના સ્પર્શકનું સમીકરણ $\frac{x}{a} \cos \theta + \frac{y}{b} \sin \theta = 1$ છે.

હવે, $SP = a - ex = a - ae \cos \theta$, $S'P = a + ex = a + ae \cos \theta$

$$(SP - S'P)^2 = 4a^2e^2 \cos^2 \theta$$

અહીં, $d = (0, 0)$ થી બિંદુ P આગળના સ્પર્શક સુધીનું લંબઅંતર

$$\therefore d^2 = \frac{a^2b^2}{b^2 \cos^2 \theta + a^2 \sin^2 \theta}$$

$$\text{હવે, } 4a^2 \left(1 - \frac{b^2}{d^2} \right) = 4a^2 \left(1 - \frac{b^2 \cos^2 \theta + a^2 \sin^2 \theta}{a^2} \right)$$

$$= 4a^2e^2 \cos^2 \theta$$

જવાબ : (A), (D)


(212) ઉપવલય $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ પરનાં બિંદુ P ના યામ શોધો કે જેથી ΔPON નું ક્ષેત્રફળ મહત્તમ થાય, જ્યાં O ઊગમબિંદુ તથા ON એ કેન્દ્રથી સ્પર્શક પરનું લંબઅંતર છે. P ઉપવલય પરનું ચલ બિંદુ છે.

$$(A) \quad \left(\frac{a^2}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{b^2}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

$$(B) \quad \left(\frac{-a^2}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{-b^2}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

$$(C) \quad \left(\frac{a^2}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{-b^2}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

$$(D) \quad \left(\frac{-a^2}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{b^2}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$



આકૃતિ 9.81

ઉકેલ : અહીં, ઉપવલય પરના બિંદુ $P(a \cos \theta, b \sin \theta)$ આગળના સ્પર્શકનું સમીકરણ $\frac{x}{a} \cos \theta + \frac{y}{b} \sin \theta = 1$ છે.

$$\therefore ON = \frac{ab}{\sqrt{b^2 \cos^2 \theta + a^2 \sin^2 \theta}}$$

આકૃતિ પરથી, $NP = OR$

જ્યાં $OR =$ કેન્દ્રથી સ્પર્શબિંદુ P માંથી પસાર થતા અભિલંબ પરનું લંબઅંતર

હવે, P માંથી પસાર થતા અભિલંબનું સમીકરણ $bx \cos \theta - ay \sin \theta + a^2 \sin \theta \cos \theta - b^2 \sin \theta \cos \theta = 0$ હોવાથી,

$$OR = \frac{(a^2 - b^2) |\sin \theta \cos \theta|}{\sqrt{b^2 \cos^2 \theta + a^2 \sin^2 \theta}}$$

$$\begin{aligned} \therefore \Delta ONP \text{ નું ક્ષેત્રફળ} &= \frac{1}{2} \times ON \times NP \\ &= \frac{1}{2} \frac{ab(a^2 - b^2) \tan \theta}{(b^2 + a^2 \tan^2 \theta)} \end{aligned}$$

ΔONP નું ક્ષેત્રફળ A મહત્તમ થવા માટે $\frac{dA}{d\theta} = 0$ થવું જોઈએ.

$$\therefore (b^2 + a^2 \tan^2 \theta) \sec^2 \theta - \tan \theta (2a^2 \tan \theta \sec^2 \theta) = 0$$

$$\therefore \sec^2 \theta (b^2 - a^2 \tan^2 \theta) = 0$$

$$\therefore \tan \theta = \pm \frac{b}{a} \text{ થવું જોઈએ.} \quad (\sec^2 \theta \neq 0)$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \sin \theta = \frac{\pm b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \text{તથા} \quad \cos \theta = \frac{-a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \sin \theta = \frac{\pm b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\therefore \text{ માંગેલ બિંદુ } P \text{ ના યામ} = \left(\frac{a^2}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \pm \frac{b^2}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), \left(\frac{-a^2}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{\pm b^2}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

જવાબ : (A), (B), (C), (D)

(213) ઉપવલય $\frac{x^2}{15} + \frac{y^2}{3} = 1$ ના કેન્દ્રથી 3 એકમ અંતરે આવેલ ઉપવલયના બિંદુનો ઉત્કેન્દ્રીકોણ =

- (A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{6}$ (C) $\frac{2\pi}{3}$ (D) $\frac{3\pi}{4}$

ઉકેલ : ધારો કે માંગેલ બિંદુનો ઉત્કેન્દ્રીકોણ θ છે.

અહીં, ઉપવલય $\frac{x^2}{15} + \frac{y^2}{3} = 1$ પરથી $a^2 = 15$, $b^2 = 3$

ધારો કે ઉપવલય પરનું બિંદુ $P(\theta) = P(a \cos \theta, b \sin \theta)$ તથા $O(0, 0)$ છે.

તેથી $P(\sqrt{15} \cos \theta, \sqrt{3} \sin \theta)$. હવે, $OP = 3 \Rightarrow OP^2 = 9$

$\therefore 15 \cos^2 \theta + 3 \sin^2 \theta = 9$

$\therefore 15 \cos^2 \theta + 3(1 - \cos^2 \theta) = 9$

$\therefore 12 \cos^2 \theta = 6$. તેથી, $\cos^2 \theta = \frac{1}{2}$

$\therefore \cos \theta = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$. આથી, $\theta = \frac{\pi}{4}$ અથવા $\theta = \frac{3\pi}{4}$ જવાબ : (A), (D)

(214) ઉપવલય $25x^2 + 50x + 16y^2 - 64y - 311 = 0$ ની નાભિઓના યામ =

- (A) $(-1, 1)$ (B) $(-1, -1)$ (C) $(-1, 5)$ (D) $(-5, 5)$

ઉકેલ : આપેલ ઉપવલય પરથી,

$25x^2 + 50x + 25 + 16y^2 - 64y + 64 - 400 = 0$

$\therefore 25(x^2 + 2x + 1) + 16(y^2 - 4y + 4) = 400$

$\therefore \frac{(x+1)^2}{16} + \frac{(y-2)^2}{25} = 1$ (1)

ઊગમબિંદુનું $(-1, 2)$ આગળ સ્થાનાંતર કરતાં,

$\therefore$ ઉપવલયનું સમીકરણ $\frac{x'^2}{16} + \frac{y'^2}{25} = 1$. આથી, $a^2 = 16$, $b^2 = 25$. આથી, $a < b$ (2)

$\therefore a^2 = b^2(1 - e^2)$ પરથી,

$e^2 = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}$. તેથી, $e = \frac{3}{5}$

$\therefore$ ઉપવલયની નાભિઓ $S(0, be) = S(0, 3)$ તથા $S'(0, -be) = S'(0, -3)$ મળે.

$x+1=0$, $y-2=3$ તથા $x+1=0$, $y-2=-3$ પરથી,

$\therefore$ આપેલ ઉપવલયની નાભિઓ $= (-1, 5)$, $(-1, -1)$ જવાબ : (B), (C)

(215) ઉપવલય $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{81} = 1$ ની નિયામિકાનું સમીકરણ =

- (A) $y = \frac{81}{4\sqrt{2}}$ (B) $y = \frac{81}{3\sqrt{2}}$ (C) $y = \frac{-81}{4\sqrt{2}}$ (D) $y = \frac{-81}{3\sqrt{2}}$

ઉકેલ : ઉપવલય $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{81} = 1$ પરથી, $a^2 = 49$, $b^2 = 81$

$$\therefore a < b \text{ હોવાથી, } a^2 = b^2(1 - e^2)$$

$$\therefore \text{ઉત્કેન્દ્રતા } e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}} = \sqrt{1 - \frac{49}{81}} = \sqrt{\frac{32}{81}} = \frac{4\sqrt{2}}{9}$$

$$\therefore \text{ઉપવલયની નિયામિકા } y = \pm \frac{b}{e} = \pm \frac{9}{\frac{4\sqrt{2}}{9}}$$

$$y = \pm \frac{81}{4\sqrt{2}}$$

$$\therefore \text{ માંગેલ નિયામિકા } y = \frac{81}{4\sqrt{2}}, y = \frac{-81}{4\sqrt{2}}$$

જવાબ : (A), (C)

(216) ધારો કે $E_1 : \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ અને $E_2 : \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ બે ઉપવલયનાં સમીકરણો છે. બંને ઉપવલયની ઉત્કેન્દ્રતાઓનો

ગુણાકાર $\frac{1}{2}$ હોય, તો E_2 ના ગૌણ અક્ષની લંબાઈ

(A) 8

(B) 9

(C) 2

(D) 4

ઉકેલ : ઉપવલય $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ માં $a^2 = 3$, $b^2 = 2$, $a > b$ છે.

જો ઉપવલયની ઉત્કેન્દ્રતા e_1 હોય, તો $e_1^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2} = \frac{3 - 2}{3} = \frac{1}{3}$. આથી, $e_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}$

ઉપવલય $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ માં $a^2 = 16$, $a > b$ હોઈએ.

જો ઉપવલયની ઉત્કેન્દ્રતા e_2 હોય, તો $e_2^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2} = \frac{16 - b^2}{16}$

$$\therefore e_1^2 \times e_2^2 = \frac{1}{3} \left(\frac{16 - b^2}{16} \right) = \frac{16 - b^2}{48}$$

$$\therefore \frac{1}{4} = \frac{16 - b^2}{48} \quad (e_1 e_2 = \frac{1}{2} \text{ આપેલ છે.})$$

$$\therefore b^2 = 4. \text{ આથી, } b = 2$$

$$\therefore E_2 \text{ ના ગૌણ અક્ષની લંબાઈ } = 2b = 4$$

જો $a < b$ હોય તો એટલે કે $b > a$ હોય, તો

$$e_2^2 = \frac{b^2 - a^2}{b^2} = \frac{b^2 - 16}{b^2}. \text{ આથી, } e_1 e_2 = \frac{1}{2} \Rightarrow e_1^2 e_2^2 = \frac{1}{4}$$

$$\therefore \frac{1}{4} = \frac{1}{3} \left(\frac{b^2 - 16}{b^2} \right)$$

$$\therefore 3b^2 = 4b^2 - 64. \text{ આથી, } b^2 = 64$$

$$\text{તો ગૌણ અક્ષ } = 2a = 8$$

જવાબ : (A), (D)

(217) અતિવલય $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ ના સ્પર્શકો રેખા $2x - y - 1 = 0$ ને સમાંતર સ્પર્શકો છે, તો અતિવલય પરના સ્પર્શબિંદુના યામ

(A) $\left(\frac{9}{2\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ (B) $\left(\frac{-9}{2\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}\right)$ (C) $(3\sqrt{3}, -2\sqrt{2})$ (D) $(-3\sqrt{3}, 2\sqrt{2})$

(IIT : 2012)

ઉકેલ : સ્પર્શકો રેખા $2x - y - 1 = 0$ ને સમાંતર છે. આથી, સ્પર્શકોનો ઢાળ = 2.

$$a^2 = 9, b^2 = 4, c^2 = a^2 m^2 - b^2 = 36 - 4 = 32$$

$$\text{સ્પર્શબિંદુના યામ } \left(\frac{-a^2 m}{c}, \frac{-b^2}{c}\right) = \left(\frac{-18}{\pm 4\sqrt{2}}, \frac{-4}{\pm 4\sqrt{2}}\right)$$

$$= \left(\frac{9}{2\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \left(\frac{-9}{2\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}\right)$$

જવાબ : (A), (B)

(218) ઉપવલય $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ ની નાભિમાંથી પસાર થતા તથા જેની મુખ્ય અક્ષ અને અનુબદ્ધ અક્ષો એ ઉપવલયની મુખ્ય અક્ષ અને ગૌણ અક્ષ હોય અને ઉત્કેન્દ્રતાનો ગુણાકાર 1 હોય તેવા અતિવલય માટે

(A) સમીકરણ $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$

(B) નાભિ $(5, 0)$

(C) સમીકરણ $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{25} = 1$

(D) નાભિ $(5\sqrt{3}, 0)$

(IIT : 2006)

ઉકેલ : આપેલ ઉપવલય $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ માટે $a^2 = 25, b^2 = 16, a > b$

∴ ઉપવલયનો પ્રધાન અક્ષ X-અક્ષ અને ગૌણ અક્ષ Y-અક્ષ છે.

∴ માંગેલ અતિવલયનો મુખ્ય અક્ષ X-અક્ષ અને અનુબદ્ધ અક્ષ Y-અક્ષ થશે.

ધારો કે, માંગેલા અતિવલયનું સમીકરણ $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ છે તથા તેની ઉત્કેન્દ્રતા e_1 છે.

$$\therefore e_1 = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}}$$

જો ઉપવલયની ઉત્કેન્દ્રતા e_2 લઈએ, તો $e_2 = \sqrt{1 - \frac{16}{25}} = \frac{3}{5}$

આપેલ શરત મુજબ $e_1 \times e_2 = 1$

$$\therefore \left(\sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}}\right) \left(\frac{3}{5}\right) = 1$$

$$\therefore \left(\frac{9}{25}\right) \left(1 + \frac{b^2}{a^2}\right) = 1$$

$$\therefore \frac{b^2}{a^2} = \frac{16}{9}$$

(1)

અહીં $e_2 = \frac{3}{5}, a^2 = 25, b^2 = 16$. આથી ઉપવલયની નાભિ $= (\pm 3, 0)$

માંગેલ અતિવલય $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ એ ઉપવલયની નાભિ $(\pm 3, 0)$ માંથી પસાર થાય છે.

$$\therefore \frac{9}{a^2} = 1. \text{ આથી } a^2 = 9$$

$$(1) \text{ પરથી } \frac{b^2}{a^2} = \frac{16}{9} \text{ માં } a^2 = 9 \text{ લેતાં } b^2 = 16.$$

$$e_1 = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \frac{5}{3}. \quad ae = 5$$

$$\therefore \text{ માંગેલ અતિવલયનું સમીકરણ } \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1, \text{ નાભિ } (\pm 5, 0) \text{ છે.} \quad \text{જવાબ : ((A), (B))}$$

(219) અતિવલય $7x^2 - 9y^2 - 28x + 18y - 44 = 0$ મુખ્ય અક્ષ સાથે $\frac{\pi}{4}$ માપનો ખૂણો બનાવતા સ્પર્શકનું સમીકરણ

$$(A) \quad x + y + \sqrt{2} - 1 = 0$$

$$(B) \quad x - y + \sqrt{2} - 1 = 0$$

$$(C) \quad x - y + \sqrt{2} + 1 = 0$$

$$(D) \quad x - y - (\sqrt{2} + 1) = 0$$

ઉકેલ : આપેલ અતિવલયનું સમીકરણ,

$$7x^2 - 28x + 28 - 9y^2 + 18y - 9 - 63 = 0$$

$$\therefore 7(x^2 - 4x + 4) - 9(y^2 - 2y + 1) = 63$$

$$\therefore \frac{(x-2)^2}{9} - \frac{(y-1)^2}{7} = 1$$

$$\therefore \frac{X^2}{9} - \frac{Y^2}{7} = 1 \quad (X = x - 2, Y = y - 1 \text{ લેતાં})$$

$\therefore$ માંગેલ સ્પર્શકનું સમીકરણ,

$$Y = mX \pm \sqrt{a^2 m^2 - b^2} \text{ પરથી,}$$

$$\therefore (y-1) = \tan \frac{\pi}{4} (x-2) \pm \sqrt{9 \tan^2 \frac{\pi}{4} - 7}$$

$$\therefore y-1 = (x-2) \pm \sqrt{9-7}$$

$$\therefore y-1 = (x-2) \pm \sqrt{2}$$

$$\therefore x - y + \sqrt{2} - 1 = 0 \text{ અથવા } x - y - (\sqrt{2} + 1) = 0$$

જવાબ : (B), (D)

(220) અતિવલય $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ પરના કોઈ બિંદુમાંથી તેના અનંત સ્પર્શકો પર દોરેલા લંબની લંબાઈઓનો ગુણાકાર અને b^2 નો ગુણોત્તર મળે.

$$(A) \quad \frac{b^2}{a^2 + b^2}$$

$$(B) \quad \frac{a^2}{a^2 + b^2}$$

$$(C) \quad \frac{1}{e^2}$$

$$(D) \quad e^2$$

ઉકેલ : અતિવલય $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ના અનંત સ્પર્શકો $y = \pm \frac{b}{a}x$ છે. એટલે કે $bx \pm ay = 0$

હવે, ધારો કે અતિવલય $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ પરના બિંદુ $(a \sec \theta, b \tan \theta)$ માંથી સ્પર્શક $bx - ay = 0$ પર દોરેલા

લંબની લંબાઈ p_1 તથા સ્પર્શક $bx + ay = 0$ પર દોરેલા લંબની લંબાઈ p_2 હોય, તો

$$p_1 = \frac{lab \sec \theta - ab \tan \theta}{\sqrt{b^2 + a^2}}, \quad p_2 = \frac{lab \sec \theta + ab \tan \theta}{\sqrt{b^2 + a^2}}$$

$$\therefore p_1 p_2 = \frac{a^2 b^2 \sec^2 \theta - a^2 b^2 \tan^2 \theta}{a^2 + b^2}$$

$$\therefore p_1 p_2 = \frac{a^2 b^2}{a^2 + b^2}$$

$$\therefore \frac{p_1 p_2}{b^2} = \frac{a^2}{a^2 + b^2}$$

$$\text{વળી } b^2 = a^2(e^2 - 1) \quad \text{પરથી } e^2 = \frac{b^2 + a^2}{a^2}$$

$$\therefore \frac{p_1 p_2}{b^2} = \frac{a^2}{a^2 + b^2} = \frac{1}{e^2}$$

જવાબ : (B), (C)

(221) જો અતિવલય $x^2 - y^2 \sec^2 \alpha = 7$ ની ઉત્કેન્દ્રતા ઉપવલય $x^2 \sec^2 \alpha + y^2 = 49$ ની ઉત્કેન્દ્રતા કરતા $\sqrt{3}$ ગણી હોય, તો α ની કિંમત =

(A) $\frac{\pi}{4}$

(B) $\frac{3\pi}{4}$

(C) $\frac{\pi}{3}$

(D) $\frac{\pi}{6}$

ઉકેલ : અતિવલય $\frac{x^2}{7} - \frac{y^2}{7 \cos^2 \alpha} = 1$ ની ઉત્કેન્દ્રતા e_1 હોય, તો $e_1^2 = \frac{a^2 + b^2}{a^2} = \frac{7 + 7 \cos^2 \alpha}{7} = 1 + \cos^2 \alpha$

ઉપવલય $x^2 \sec^2 \alpha + y^2 = 49$ ની ઉત્કેન્દ્રતા e_2 હોય, તો $(a = 7 \cos \alpha, b = 7)$

$$e_2^2 = \frac{b^2 - a^2}{b^2} = \frac{49 - 49 \cos^2 \alpha}{49} = 1 - \cos^2 \alpha$$

$$\text{આપેલ શરત મુજબ, } e_1 = \sqrt{3} e_2. \quad \text{આથી, } e_1^2 = 3 e_2^2$$

$$\therefore 1 + \cos^2 \alpha = 3 - 3 \cos^2 \alpha. \quad \text{આથી, } 4 \cos^2 \alpha = 2$$

$$\therefore \cos^2 \alpha = \frac{1}{2}. \quad \text{આથી, } \cos \alpha = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore \alpha = \frac{\pi}{4} \quad \text{અથવા} \quad \alpha = \frac{3\pi}{4}$$

જવાબ : (A), (B)

(222) અતિવલય $\frac{x^2}{7} - \frac{y^2}{5} = 1$ ને દોરેલા સ્પર્શક, રેખા $3x + 2y - 7 = 0$ ને સમાંતર હોય, તો તેમનાં સમીકરણ

(A) $3x + 2y - \sqrt{43} = 0$

(B) $3x + 2y + \sqrt{45} = 0$

(C) $3x + 2y + \sqrt{43} = 0$

(D) $3x + 2y - \sqrt{45} = 0$

ઉકેલ : ધારો કે અતિવલય $\frac{x^2}{7} - \frac{y^2}{5} = 1$ ને દોરેલ સ્પર્શક $y = mx + c$ છે. $m = \frac{-3}{2}$ છે.

$$\therefore c^2 = m^2 a^2 - b^2 \quad \text{પરથી, } c^2 = \frac{9}{4} \times 7 - 5 = \frac{63}{4} - 5 = \frac{43}{4} \quad \text{આથી } c = \pm \frac{\sqrt{43}}{2}$$

$$\therefore \text{ માંગેલ સ્પર્શક } y = mx + c \quad \text{પરથી, } y = -\frac{3}{2}x + \frac{\sqrt{43}}{2} \quad \text{અને } y = -\frac{3}{2}x - \frac{\sqrt{43}}{2}$$

$$\therefore 3x + 2y - \sqrt{43} = 0, \quad 3x + 2y + \sqrt{43} = 0$$

જવાબ : (A), (C)

(223) અતિવલય $x^2 - y^2 \sec^2 \theta = 9$ ની ઉત્કેન્દ્રતા એ ઉપવલય $x^2 \sec^2 \theta + y^2 = 81$ ની ઉત્કેન્દ્રતા કરતા બમણી હોય, તો θ ની કિંમત

- (A) $\tan^{-1} \sqrt{3}$ (B) $\tan^{-1} \sqrt{2}$ (C) $\tan^{-1} \sqrt{\frac{2}{3}}$ (D) $\tan^{-1} \left(-\sqrt{\frac{2}{3}} \right)$

ઉકેલ : અતિવલય $x^2 - y^2 \sec^2 \theta = 9$ પરથી, $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{9 \cos^2 \theta} = 1$

અતિવલયની ઉત્કેન્દ્રતા e_1 લઈએ, તો $e_1^2 = \frac{b^2}{a^2} + 1 = \cos^2 \theta + 1$

ઉપવલય $x^2 \sec^2 \theta + y^2 = 81$ પરથી, $\frac{x^2}{81 \cos^2 \theta} + \frac{y^2}{81} = 1$

જો ઉપવલયની ઉત્કેન્દ્રતા e_2 લઈએ, તો $e_2^2 = 1 - \frac{a^2}{b^2}$ ($a < b$)

$$\therefore e_2^2 = 1 - \cos^2 \theta$$

હવે, આપેલ શરત મુજબ,

$$e_1 = 2 e_2. \text{ આથી, } e_1^2 = 4 e_2^2$$

$$\therefore 1 + \cos^2 \theta = 4 (1 - \cos^2 \theta)$$

$$\therefore 5 \cos^2 \theta = 3. \text{ આથી, } \cos^2 \theta = \frac{3}{5}. \text{ આથી, } \sin^2 \theta = 1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$$

$$\therefore \tan^2 \theta = \frac{2}{3}. \text{ આથી, } \tan \theta = \pm \sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$\therefore \theta = \tan^{-1} \left(\sqrt{\frac{2}{3}} \right) \text{ અથવા } \theta = \tan^{-1} \left(-\sqrt{\frac{2}{3}} \right)$$

જવાબ : (C), (D)

(224) રેખા $7x - 3y + k = 0$ અતિવલય $7x^2 - 9y^2 = 63$ ને સ્પર્શી તો $k = \dots\dots$

- (A) $3\sqrt{42}$ (B) $2\sqrt{42}$ (C) $-3\sqrt{42}$ (D) $-2\sqrt{42}$

ઉકેલ : આપેલ અતિવલય $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{7} = 1$ પરથી $a^2 = 9, b^2 = 7$.

આપેલ રેખા $7x - 3y + k = 0$ પરથી $y = \frac{7}{3}x + \frac{k}{3}$

$$\therefore m = \frac{7}{3}, c = \frac{k}{3}$$

રેખા, અતિવલયને સ્પર્શી છે તેથી $c^2 = a^2 m^2 - b^2$.

$$\frac{k^2}{9} = 9 \times \frac{49}{9} - 7 = 42$$

$$\therefore k^2 = 42 \times 9$$

$$\therefore k = \pm 3\sqrt{42}$$

જવાબ : (A), (C)

નિષ્કર્ષ અને કારક પ્રકારના દાખલાઓ

નિષ્કર્ષ અને કારક પ્રકારના પ્રશ્નો :

આ પ્રકારના પ્રશ્નોમાં બે વિધાન હોય છે :

વિધાન 1 : નિષ્કર્ષ વિધાન

વિધાન 2 : કારક વિધાન

આ પ્રકારના પ્રશ્નોમાં ચાર વિકલ્પો નીચે પ્રમાણે હોય છે :

- (A) વિધાન 1 અને વિધાન 2 બંને સત્ય છે અને વિધાન 1 એ વિધાન 2ની યોગ્ય સમજૂતી માટે પર્યાપ્ત છે.
 (B) વિધાન 1 અને વિધાન 2 બંને સત્ય છે અને વિધાન 2 એ વિધાન 1ની યોગ્ય સમજૂતી માટે પર્યાપ્ત નથી.
 (C) વિધાન 1 સત્ય છે અને વિધાન 2 અસત્ય છે.
 (D) વિધાન 1 અસત્ય છે અને વિધાન 2 સત્ય છે.

(225) વિધાન 1 : વર્તુળ $x^2 + y^2 = \frac{5}{2}$ તથા પરવલય $y^2 = 4\sqrt{5}x$ ના સામાન્ય સ્પર્શકનું સમીકરણ $y = x + \sqrt{5}$ છે.

વિધાન 2 : જો $y = mx + \frac{\sqrt{5}}{m}$ ($m \neq 0$) એ સામાન્ય સ્પર્શકનું સમીકરણ હોય, તો m ની કિંમત $m^4 - 3m^2 + 2 = 0$ ને સંતોષે છે.

ઉકેલ : અહીં પરવલય $y^2 = 4\sqrt{5}x$ પરથી $a = \sqrt{5}$

$\therefore$ પરવલયના સ્પર્શકનું સમીકરણ $y = mx + \frac{\sqrt{5}}{m}$ ($m \neq 0$).

આ સ્પર્શક વર્તુળને પણ સ્પર્શે છે.

$\therefore$ વર્તુળના કેન્દ્ર $(0, 0)$ થી સ્પર્શક $m^2x - my + \sqrt{5} = 0$ નું લંબઅંતર = વર્તુળની ત્રિજ્યા

$$\therefore \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{m^4 + m^2}}$$

$$\therefore m^4 + m^2 - 2 = 0$$

$$\therefore (m^2 + 2)(m^2 - 1) = 0$$

પરંતુ $m^2 = -2$ શક્ય નથી. આથી, $m = \pm 1$

$\therefore y = -x + \sqrt{5}$ અને $y = x + \sqrt{5}$ બંને સામાન્ય સ્પર્શકોના સમીકરણ થશે.

વળી $m^2 = 1 \Rightarrow m^4 - 3m^2 + 2 = 1 - 3 + 2 = 0$ મળે છે.

$\therefore$ વિધાન 1 સત્ય છે તથા વિધાન 2 પણ સત્ય છે. વિધાન 2 એ વિધાન 1ની સમજૂતી માટે પર્યાપ્ત છે.

જવાબ : (A)

(226) વિધાન 1 : વર્તુળ $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$ અને $y^2 = 2x$ પરવલયને સામાન્ય સ્પર્શકો નથી.

વિધાન 2 : વર્તુળ $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$ અને પરવલય $y^2 = 2x$ ને છેદબિંદુ નથી.

ઉકેલ : પરવલય $y^2 = 2x$ પરથી $a = \frac{1}{2}$

$$\therefore \text{પરવલયના સ્પર્શકનું સમીકરણ } y = mx + \frac{1}{2m} \quad (m \neq 0)$$

તે $x^2 - 4x + 4 + y^2 - 1 = 0$ ને સ્પર્શે છે.

$$\therefore (x-2)^2 + (y-0)^2 = 1 \text{ ને સ્પર્શે છે.}$$

$\therefore$ વર્તુળના કેન્દ્ર $(2, 0)$ થી સ્પર્શક સુધીનું લંબઅંતર = ત્રિજ્યા

$$\therefore \frac{\left| 2m - 0 + \frac{1}{2m} \right|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 1$$

$$\therefore 4m^2 + 1 = 2m\sqrt{m^2 + 1}$$

$$\therefore (4m^2 + 1)^2 = 4m^2 (m^2 + 1)$$

$$\therefore 16m^4 + 8m^2 + 1 = 4m^4 + 4m^2$$

$$\therefore 12m^4 + 4m^2 + 1 = 0$$

$\therefore m$ ની કોઈ પણ કિંમત માટે $12m^4 + 4m^2 + 1 = 0$ ના મળે.

$\therefore$ કોઈ પણ $m \in R$ ના મળે.

$\therefore$ વર્તુળ તથા પરવલયને સામાન્ય સ્પર્શક નથી.

$\therefore$ આપેલ પરવલય અને વર્તુળને સામાન્ય સ્પર્શક ન મળે.

છેદબિંદુ માટે $x^2 + 2x - 4x + 3 = 0$

$\therefore x^2 - 2x + 3 = 0$ નો ઉકેલ R માં શક્ય નથી.

$\therefore$ બંને પરસ્પર છેદતા નથી.

$\therefore$ વર્તુળ તથા પરવલય છેદતા નથી.

આમ, વિધાન 1 સત્ય છે અને વિધાન 2 પણ સત્ય છે.

પરંતુ, વિધાન 2 એ વિધાન 1 ની સમજૂતી માટે પર્યાપ્ત નથી.

જવાબ : (B)

(227) વિધાન 1 : વક્ર $y = \frac{-x^2}{2} + x + 1$ એ $x = 1$ ને પ્રત્યે સંમિત વક્ર છે.

વિધાન 2 : પરવલય તેની અક્ષ પ્રત્યે સંમિત વક્ર છે.

$$\text{ઉકેલ : વક્ર } y = \frac{-x^2}{2} + x + 1$$

$$\therefore 2y = -x^2 + 2x + 2$$

$$\therefore x^2 - 2x - 2 = -2y$$

$$\therefore (x-1)^2 = -2\left(y - \frac{3}{2}\right)$$

ઊગમબિંદુનું $\left(1, \frac{3}{2}\right)$ આગળ સ્થાનાંતર કરતાં, $x' = x-1$, $y' = y - \frac{3}{2}$

$\therefore$ વક્ર $x'^2 = -2y'$ થશે.

તેને $x'^2 = 4by'$ સાથે સરખાવતાં $4b = -2$. આથી, $b = -\frac{1}{2}$

$\therefore$ વક્ર $x'^2 = -2y'$ ની નાભિ Y-અક્ષ પર છે.

$\therefore$ આ પરવલય Y-અક્ષ પરત્વે સંમિત છે.

વળી, આ પરવલય $x' = 0$ પરત્વે સંમિત છે.

$\therefore x-1=0$. આથી, $x=1$ તથા પરવલય તેની અક્ષ પ્રત્યે સંમિત છે.

આમ વિધાન 1, 2 બંને સત્ય છે તથા વિધાન 2 એ વિધાન 3ની સમજૂતી માટે પર્યાપ્ત છે. જવાબ : (A)

(228) વિધાન 1 : પરવલય $y^2 = 4ax$ ની નાભિ S છે. P પરવલય પર છે. $\overline{SP}$ ને વ્યાસ લઈને દોરેલું વર્તુળ હંમેશા Y-અક્ષને સ્પર્શે છે.

વિધાન 2 : પરવલય $y^2 = 4ax$ નો સ્પર્શક દોરેલ હોય, તો સ્પર્શકનો સ્પર્શબિંદુ અને નિયામિકા સાથેના છેદબિંદુને જોડતો રેખાખંડ નાભિ આગળ કાટખૂણો આંતરે છે.

ઉકેલ : ધારો કે પરવલય $y^2 = 4ax$ પરનું બિંદુ $P(at^2, 2at)$ છે તથા નાભિ $S(a, 0)$ છે. તેથી $\overline{SP}$ વ્યાસ

હોય તેવા વર્તુળનું સમીકરણ $(x-a)(x-at^2) + (y-0)(y-2at) = 0$

$$\therefore x^2 + y^2 - xat^2 - ax + a^2t^2 - 2aty = 0$$

$$\therefore x^2 + y^2 - (1+t^2)ax - 2aty + a^2t^2 = 0 \quad (1)$$

વર્તુળના Y-અક્ષ સાથેના છેદબિંદુ માટે $x=0$ લેતાં,

$$\therefore y^2 - 2aty + a^2t^2 = 0$$

$$\therefore (y-at)^2 = 0. \text{ આથી, } y = at$$

$\therefore$ વર્તુળ Y-અક્ષને માત્ર $(0, at)$ માં છેદે છે, એટલે કે સ્પર્શે છે.

$\therefore$ વિધાન 1 સત્ય છે.

હવે ધારો કે પરવલય $y^2 = 4ax$ પરનું બિંદુ $P(at^2, 2at)$ છે.

$$\therefore P(at^2, 2at) \text{ આગળના સ્પર્શકનું સમીકરણ, } x - ty + at^2 = 0 \text{ છે.}$$

$\therefore$ સ્પર્શક $x - ty + at^2 = 0$ નિયામિકાને છેદે છે.

$$\text{તેથી } x = -a \text{ લેતાં, } -a - ty + at^2 = 0. \text{ આથી, } y = \frac{a(t^2-1)}{t}$$

$$\therefore \text{નિયામિકા પરનું બિંદુ } Q = \left(-a, \frac{a(t^2 - 1)}{t} \right)$$

$$\text{અહીં } S(a, 0), P(at^2, 2at), Q \left(-a, \frac{a(t^2 - 1)}{t} \right)$$

$$\therefore \overline{SP} \text{ નો ઢાળ } = \frac{2t}{t^2 - 1}, \quad \overline{SQ} \text{ નો ઢાળ } = \frac{-(t^2 - 1)}{2t}$$

$$\therefore \overline{SP} \perp \overline{SQ}$$

$$\therefore m \angle PSQ = \frac{\pi}{2}$$

$\therefore$ વિધાન 2 પણ સત્ય છે, પરંતુ વિધાન 2 એ વિધાન 1ની સમજૂતી માટે પર્યાપ્ત નથી. **જવાબ : (B)**

(229) **વિધાન 1** : પરવલય $y^2 = 16\sqrt{3}x$ અને ઉપવલય $2x^2 + y^2 = 4$ ના સામાન્ય સ્પર્શકનું સમીકરણ $y = 2x + 2\sqrt{3}$ છે.

વિધાન 2 : જો $y = mx + \frac{4\sqrt{3}}{m}$ ($m \neq 0$) એ પરવલય $y^2 = 16\sqrt{3}x$ અને ઉપવલય $2x^2 + y^2 = 4$ ના સામાન્ય સ્પર્શકનું સમીકરણ હોય, તો m સમીકરણ $m^4 + 2m^2 = 24$ નો ઉકેલ છે.

ઉકેલ : પરવલય $y^2 = 16\sqrt{3}x$ પરથી $a = 4\sqrt{3}$

$\therefore$ પરવલયના m ઢાળવાળા સ્પર્શકનું સમીકરણ

$$y = mx + \frac{4\sqrt{3}}{m} \text{ છે.}$$

$$\text{ઉપવલય } \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4} = 1 \text{ પરથી } a^2 = 2, b^2 = 4 \quad (a < b \text{ છે.})$$

$\therefore$ ઉપવલયના m ઢાળવાળા સ્પર્શકનું સમીકરણ

$$x = my \pm \sqrt{b^2 m^2 + a^2} \text{ પરથી, } x = my \pm \sqrt{4m^2 + 2}$$

$$\therefore y = \frac{x}{m_1} - \sqrt{4 + \frac{2}{m_1^2}}$$

$$\therefore y = mx - \sqrt{4 + 2m^2} \quad (m = \frac{1}{m_1} \text{ લેતી})$$

$$\left(\frac{4\sqrt{3}}{m} \right)^2 = \left(-\sqrt{4 + 2m^2} \right)^2$$

$$\therefore \frac{48}{m^2} = 4 + 2m^2$$

$$\therefore m^4 + 2m^2 - 24 = 0$$

$$\therefore (m^2 + 6)(m^2 - 4) = 0$$

$$\text{પરંતુ } m^2 = -6. \text{ આથી } m^2 = 4$$

$$\therefore (m^2 + 6)(m^2 - 4) = 0 \text{ શક્ય નથી. આથી } m = \pm 2$$

$$\therefore y = mx + \frac{4\sqrt{3}}{m} = 2x + 2\sqrt{3}$$

વિધાન 2 : જો $y = mx + \frac{4\sqrt{3}}{m}$ એ પરવલય $y^2 = 16\sqrt{3}x$ અને ઉપવલય $2x^2 + y^2 = 4$ નો સામાન્ય સ્પર્શક હોય, તો $m^4 + 2m^2 - 24 = 0$ નું સમાધાન થાય છે. **જવાબ : (A)**

જોડકાં જોડો પ્રકારના પ્રશ્નો

(230)	સ્તંભ 1	સ્તંભ 2
(1)	પરવલય $y^2 = 16x$ પરના બિંદુ $(1, 4)$ આગળના સ્પર્શકનું સમીકરણ	(A) $x - 2 = 0$
(2)	પરવલય $x^2 - 4x - 3y + 10 = 0$ ના અક્ષનું સમીકરણ	(B) $x + y + 2 = 0$
(3)	પરવલય $y^2 - 4x - 6y + 8 = 0$ ની નિયામિકાનું સમીકરણ	(C) $2x - y + 1 = 0$
(4)	પરવલય $y^2 = 8x$ અને $x^2 = 8y$ ના સામાન્ય સ્પર્શકનું સમીકરણ	(D) $4x + 5 = 0$

ઉકેલ : (1) $(1, 4)$ એ પરવલય $y^2 = 16x$ પરનું બિંદુ છે.

$$\therefore \text{બિંદુ } (1, 4) \text{ આગળના સ્પર્શકનું સમીકરણ } yy_1 = 2a(x + x_1)$$

$$\therefore y(4) = 2(4)(x + 1) \quad (a = 4, (x_1, y_1) = (1, 4))$$

$$\therefore 2x - y + 1 = 0 \quad \text{જવાબ : (1} \rightarrow \text{C)}$$

$$(2) \quad x^2 - 4x - 3y + 10 = 0 \text{ પરથી, } x^2 - 4x + 4 - 3y + 6 = 0$$

$$\therefore (x - 2)^2 = 3(y - 2)$$

$$\therefore \text{પરવલયના અક્ષનું સમીકરણ : } x - 2 = 0 \quad \text{જવાબ : (2} \rightarrow \text{A)}$$

$$(3) \quad \text{પરવલય } (y - 3)^2 = 4\left(x + \frac{1}{4}\right)$$

$$\text{ઊગમબિંદુનું સ્થાનાંતર } \left(-\frac{1}{4}, 3\right) \text{ આગળ કરતી, } x' = x + \frac{1}{4}, \quad y' = y - 3$$

$$\therefore y'^2 = 4x' \Rightarrow a = 1$$

$$\therefore \text{નિયામિકા } x' = -a \text{ એટલે કે } x' = -1 \text{ આથી, } x + \frac{1}{4} = -1$$

$$\therefore 4x + 5 = 0 \text{ નિયામિકાનું સમીકરણ છે.} \quad \text{જવાબ : (3} \rightarrow \text{D)}$$

$$(4) \quad \text{પરવલય } y^2 = 8x \text{ પરથી } a = 2$$

$$\text{પરવલય } x^2 = 8y \text{ પરથી } b = 2$$

બંને પરવલયોના સામાન્ય સ્પર્શકનું સમીકરણ

$$2^{\frac{1}{3}} \cdot x + 2^{\frac{1}{3}} \cdot y + (4)^{\frac{2}{3}} = 0$$

$$\therefore x + y + 2 = 0$$

જવાબ : (4 → B)

જવાબ : (1 → C, 2 → A, 3 → D, 4 → B)

(231)

સ્તંભ 1	સ્તંભ 2
(1) પરવલય $y^2 = 8x$ ના સ્પર્શકનું સમીકરણ $y = x + 2$ છે. આ રેખા પરના કયા બિંદુ માટે પરવલયનો સ્પર્શક આપેલ સ્પર્શકને લંબ થાય ?	(A) $(-3, 0)$
(2) પરવલય $y^2 = 12x$ ના નાભિલંબના અંત્યબિંદુ આગળના સ્પર્શકોના છેદબિંદુના યામ શું થાય ?	(B) $(-1, 3)$
(3) પરવલય $y^2 - 2x - 6y + 7 = 0$ નું શિરોબિંદુ શું થાય ?	(C) $(5, 6)$
(4) રેખા $2x - 3y + 8 = 0$ એ પરવલય $y^2 = 8x$ ને P અને Q માં છેદે, તો $\overline{PQ}$ નું મધ્યબિંદુ શું થાય ?	(D) $(-2, 0)$

ઉકેલ : (1) ધારો કે માંગેલ બિંદુ P છે તથા અહીં $a = 2$ છે. પરવલયના બિંદુ P પાસે બે સ્પર્શકો પરસ્પર લંબ હોય, તો P ના બિંદુગણનું સમીકરણ પરવલયની નિયામિકા હોય.

$\therefore$ બિંદુ P પરવલયની નિયામિકા $x = -2$ પર હોય.

$\therefore P$ ના યામ $(-2, 0)$

જવાબ : (1 → D)

(2) પરવલય $y^2 = 12x$ પરથી $a = 3$

$\therefore$ નાભિલંબના અંત્યબિંદુ $L(a, 2a) = (3, 6)$ અને $L'(a, -2a) = (3, -6)$ મળે.

$$2y \frac{dy}{dx} = 12$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{12}{2y} = 1 \quad (L \text{ માટે})$$

$(3, 6)$ બિંદુ તથા $m = 1$ માટે સ્પર્શકનું સમીકરણ $(y - 6) = 1(x - 3)$ $x - y + 3 = 0$ એટલે કે સ્પર્શકોના સમીકરણ અનુક્રમે $x - y + 3 = 0$ અને $x + y + 3 = 0$

આથી $t_1 = 1, t_2 = -1$

$\therefore$ બંને સ્પર્શકોના છેદબિંદુના યામ = $(-3, 0)$ $((at_1t_2, a(t_1 + t_2)))$ સૂત્ર મુજબ

જવાબ : (2 → A)

(3) પરવલય $y^2 - 2x - 6y + 7 = 0$ પરથી, $y^2 - 6y + 9 = 2(x + 1)$

$$\therefore (y - 3)^2 = 2(x + 1)$$

ઊગમબિંદુનું સ્થાનાંતર $(-1, 3)$ આગળ લેતાં, $x' = x + 1, y' = y - 3$

$\therefore y'^2 = 2x'$ નું શિરોબિંદુ $(x', y') = (0, 0)$ થાય.

$$\therefore \text{ મૂળ પદ્ધતિમાં શિરોબિંદુ } x = x' + h = 0 - 1 = -1, y = y' + k = 3$$

$$\therefore \text{ માંગેલ શિરોબિંદુ } (-1, 3)$$

જવાબ : (3 → B)

(4) અહીં $2x - 3y + 8 = 0$ પરથી, $y = \frac{2x+8}{3}$

હવે રેખા, પરવલયને છેદે છે.

$$\therefore \left(\frac{2x+8}{3}\right)^2 = 8x$$

$$\therefore 4x^2 + 32x + 64 = 72x$$

$$\therefore 4x^2 - 40x + 64 = 0$$

$$\therefore x^2 - 10x + 16 = 0$$

$$\therefore (x-8)(x-2) = 0. \quad \text{આથી, } x = 8, x = 2$$

$$\text{હવે, } x = 8 \text{ તો } y = \frac{2x+8}{3} = \frac{16+8}{3} = 8. \quad x = 2 \text{ તો } y = \frac{2x+8}{3} = \frac{4+8}{3} = 4$$

$$\therefore \text{ છેદબિંદુના યામ } = (8, 8) \text{ અને } (2, 4) \text{ છે.}$$

$$\therefore \text{ મધ્યબિંદુના યામ } = (5, 6) \text{ થાય.}$$

જવાબ : (4 → C)

જવાબ : (1 → D, 2 → A, 3 → B, 4 → C)

(232)	સ્તંભ 1	સ્તંભ 2
(1)	$2x^2 + 3y^2 + 4x + 12y + 8 = 0$ ની ઉત્કેન્દ્રતા	(A) $\frac{\sqrt{5}}{3}$
(2)	$9x^2 + 4y^2 - 24y = 0$ ઉપવલયની ઉત્કેન્દ્રતા	(B) $\sqrt{\frac{2}{3}}$
(3)	ઉપવલયના નાભિલંબની લંબાઈ એ મુખ્ય અક્ષની લંબાઈના ત્રીજા ભાગ જેટલી હોય તો ઉત્કેન્દ્રતા ?	(C) $\frac{3\sqrt{5}}{7}$
(4)	ઉપવલયના પ્રધાન અક્ષની લંબાઈ એ ગૌણ અક્ષની લંબાઈ કરતા $\frac{7}{2}$ ગણી હોય, તો તેની ઉત્કેન્દ્રતા	(D) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

ઉકેલ : (1) અહીં ઉપવલય $2x^2 + 3y^2 + 4x + 12y + 8 = 0$ પરથી,

$$2x^2 + 4x + 2 + 3y^2 + 12y + 12 = 6$$

$$\therefore 2(x^2 + 2x + 1) + 3(y^2 + 4y + 4) = 6$$

$$\therefore \frac{(x+1)^2}{3} + \frac{(y+2)^2}{2} = 1. \quad \text{આથી, } a^2 = 3, b^2 = 2 \text{ તથા } a > b$$

$$\therefore e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{2}{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

જવાબ : (4 → D)

(2) અહીં ઉપવલય $9x^2 + 4y^2 - 24y = 0$ પરથી,

$$9(x-0)^2 + 4(y^2 - 6y + 9) = 36$$

$$\therefore \frac{(x-0)^2}{4} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1. \quad \text{અર્થાત્, } a^2 = 4, b^2 = 9 \text{ તેથી } a < b$$

$$\therefore e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}} = \sqrt{\frac{9-4}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

જવાબ : (2 $\rightarrow$ A)

(3) આપેલ શરત મુજબ $\frac{2b^2}{a} = \frac{1}{3}(2a)$. અર્થાત્, $a^2 = 3b^2$

$$\text{પરંતુ } b^2 = a^2(1 - e^2). \quad \text{અર્થાત્, } b^2 = 3b^2(1 - e^2)$$

$$\therefore e^2 = \frac{2}{3}. \quad \text{અર્થાત્, } e = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

જો $a < b$ હોય, તો $\frac{2a^2}{b} = \frac{1}{3}(2b)$ અર્થાત્, $b^2 = 3a^2$

$$\therefore e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{3}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

જવાબ : (3 $\rightarrow$ B)

(4) અહીં $2a = \frac{7}{2}(2b)$ અર્થાત્ $a = \frac{7b}{2}$

$$\therefore e^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2} = \frac{45}{49} \quad \text{અર્થાત્ } e = \frac{3\sqrt{5}}{7}$$

જવાબ : (4 $\rightarrow$ C)

જવાબ : 1 $\rightarrow$ (D), 2 $\rightarrow$ (A), 3 $\rightarrow$ (B), 4 $\rightarrow$ (C)

(233)

સ્તંભ 1	સ્તંભ 2
(1) $AS \cdot A'S = 36$, $e = \frac{1}{\sqrt{3}}$ હોય, તેવા ઉપવલયનું સમીકરણ	(A) $\frac{2x^2}{147} + \frac{y^2}{49} = 1$
(2) બે નાભિઓ વચ્ચેનું અંતર $7\sqrt{2}$ તથા ગૌણ અક્ષની લંબાઈ 14 હોય, તેવા ઉપવલયનું સમીકરણ. $a > b$	(B) $\frac{16x^2}{325} + \frac{4y^2}{65} = 1$
(3) જેની નાભિઓ $(\pm\sqrt{5}, 0)$ અને શિરોબિંદુ $(\pm 5, 0)$ હોય, તેવા ઉપવલયનું સમીકરણ	(C) $\frac{x^2}{54} + \frac{y^2}{36} = 1$
(4) નાભિલંબની લંબાઈ $2\sqrt{13}$ તથા ઉત્કેન્દ્રતા $e = \frac{1}{\sqrt{5}}$ તો ઉપવલયનું સમીકરણ. $a > b$	(D) $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{20} = 1$

ઉકેલ : (1) અહીં, $AS \cdot A'S = b^2$. તેથી $b^2 = 36$ તથા $e = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$$\text{હવે, } b^2 = a^2(1 - e^2) \quad \text{પરથી, } 36 = a^2\left(1 - \frac{1}{3}\right)$$

$$\text{અર્થાત્ } a^2 = 54$$

$$\therefore \text{ માંગેલ ઉપવલયનું સમીકરણ } \frac{x^2}{54} + \frac{y^2}{36} = 1$$

જવાબ : (1 $\rightarrow$ C)

(2) અહીં, બે નાભિઓ વચ્ચેનું અંતર = $7\sqrt{2}$, ગૌણ અક્ષની લંબાઈ = 14

$$\therefore 2ae = 7\sqrt{2} \text{ તથા } 2b = 14. \text{ આથી, } b = 7$$

$$\text{હવે, } b^2 = a^2 - a^2e^2$$

$$\text{આથી, } a^2 = b^2 + a^2e^2 = 49 + \frac{49}{2} = \frac{147}{2}$$

$$\therefore \text{ માંગેલ ઉપવલયનું સમીકરણ } \frac{2x^2}{147} + \frac{y^2}{49} = 1$$

જવાબ : (2 → A)

(3) અહીં, ઉપવલયની નાભિઓ = $(\pm\sqrt{5}, 0)$, શિરોબિંદુઓ = $(\pm 5, 0)$

$$\therefore ae = \sqrt{5}, a = 5. \text{ તેથી } e = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\text{પ્રધાન અક્ષ X-અક્ષ છે. તેથી } b^2 = a^2(1 - e^2)$$

$$\therefore b^2 = 25\left(1 - \frac{1}{5}\right) = 20$$

$$\therefore \text{ માંગેલ ઉપવલયનું સમીકરણ } \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{20} = 1$$

જવાબ : (3 → D)

(4) અહીં, $\frac{2b^2}{a} = 2\sqrt{13}$. આથી $b^2 = \sqrt{13}a$ તથા $e = \frac{1}{\sqrt{5}}$

$$\text{હવે, } b^2 = a^2(1 - e^2)$$

$$\sqrt{13}a = a^2\left(1 - \frac{1}{5}\right). \text{ આથી } a = \frac{5\sqrt{13}}{4}. \text{ તેથી } b^2 = \frac{65}{4}. \text{ આમ, } \frac{16x^2}{325} + \frac{4y^2}{65} = 1 \text{ જવાબ : (4 → B)}$$

જવાબ : 1 → (C), 2 → (A), 3 → (D), 4 → (B)

(234)	સ્તંભ 1	સ્તંભ 2
(1)	ઉપવલય $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ ના નિયામિકા વૃત્તનું સમીકરણ	(A) $x^2 + y^2 = 4$
(2)	$\frac{x^2}{10} + \frac{y^2}{12} = 1$ ના સહાયકવૃત્તનું સમીકરણ	(B) $x^2 + y^2 = 28$
(3)	$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1$ ના સહાયકવૃત્તનું સમીકરણ	(C) $x^2 + y^2 = 12$
(4)	પરવલય $y^2 = 12x$ નું શીર્ષ જેનું કેન્દ્ર હોય તથા ઉપવલય $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{10} = 1$ ના અર્ધ ગૌણ અક્ષની લંબાઈ જેની ત્રિજ્યા હોય, તેવા વર્તુળનું સમીકરણ	(D) $x^2 + y^2 = 16$

ઉકેલ : (1) ઉપવલય $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ માં $a^2 = 16, b^2 = 12, a > b$

$$\therefore \text{ નિયામિકાવૃત્તનું સમીકરણ } x^2 + y^2 = a^2 + b^2 \text{ પરથી,}$$

$$x^2 + y^2 = 28$$

જવાબ : (1 → B)

(2) ઉપવલય $\frac{x^2}{10} + \frac{y^2}{12} = 1$ માં $a^2 = 10, b^2 = 12, a < b$

$$\therefore \text{ સહાયકવૃત્તનું સમીકરણ } x^2 + y^2 = b^2 \text{ પરથી,}$$

$$x^2 + y^2 = 12$$

જવાબ : (2 → C)

(3) ઉપવલય $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1$ માં $a^2 = 16, b^2 = 8, a > b$

∴ સહાયકવૃત્તનું સમીકરણ $x^2 + y^2 = a^2$ પરથી,

$$x^2 + y^2 = 16$$

જવાબ : (3 → D)

(4) પરવલયનું શીર્ષ = (0, 0), ઉપવલયના ગૌણ અક્ષની લંબાઈ $2a = 4$

∴ અર્ધ ગૌણ અક્ષની લંબાઈ $a = 2$

∴ માંગેલ વર્તુળનું સમીકરણ $x^2 + y^2 = 4$

જવાબ : (4 → A)

જવાબ : (1) → (B), (2) → (C), (3) → (D), (4) → (A)

(235)	સ્તંભ 1	સ્તંભ 2
(1)	અતિવલય $y^2 - 49x^2 = 49$ ના નાભિલંબની લંબાઈ	(A) $\frac{32}{3}$
(2)	$3y^2 - 4x^2 = 12$ અતિવલયના મુખ્ય અક્ષની લંબાઈ	(B) $2\sqrt{2}$
(3)	$16x^2 - 9y^2 = 144$ ના નાભિલંબની લંબાઈ	(C) $\frac{2}{7}$
(4)	અતિવલય $2x^2 - y^2 = 4$ ના પ્રધાન અક્ષની લંબાઈ	(D) 4

ઉકેલ :

(1) અતિવલય $7y^2 - 49x^2 = 49$ પરથી $\frac{y^2}{7} - \frac{x^2}{1} = 1$

$$\therefore b^2 = 7, a^2 = 1$$

$$\therefore \text{અતિવલયના નાભિલંબની લંબાઈ} = \frac{2a^2}{b} = \frac{2(1)}{7} = \frac{2}{7}$$

જવાબ : (1) → C

(2) અતિવલય $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{3} = 1$ પરથી $b^2 = 4, a^2 = 3$

∴ મુખ્ય અક્ષ Y-અક્ષ થશે.

$$\therefore \text{મુખ્ય અક્ષની લંબાઈ} = 2(b) = 2(2) = 4$$

જવાબ : (2) → D

(3) અતિવલય $16x^2 - 9y^2 = 144$ પરથી $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$

∴ $a^2 = 9, b^2 = 16$. મુખ્ય અક્ષ X-અક્ષ છે.

$$\therefore \text{નાભિલંબની લંબાઈ} = \frac{2b^2}{a} = \frac{2(16)}{3} = \frac{32}{3}$$

જવાબ : (3) → A

(4) અતિવલય $2x^2 - y^2 = 4$ પરથી,

$$\therefore \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{4} = 1. \text{ આથી મુખ્ય અક્ષ X-અક્ષ છે.}$$

$$\therefore \text{મુખ્ય અક્ષની લંબાઈ} = 2(a) = 2\sqrt{2}$$

જવાબ : (4) → B

જવાબ : (1) → (C), (2) → (D), (3) → (A), (4) → (B)

