

$$(98) \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x - (\sin x)^{\sin x}}{1 - \sin x + \log_e(\sin x)} = \dots$$

- (A) 1 (B) 0 (C) 2 (D) -1

ઉકેલ : ધારે કે $\sin x = t$. જો $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ તો $t \rightarrow 1$

$$\text{અપેલ લક્ષ્ય} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t - t^t}{1 - t + \log_e t} \quad \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{1 - t^t (1 + \log_e t)}{-1 + \frac{1}{t}} \quad \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{-t^t (1 + \log_e t)^2 - t^t \cdot \frac{1}{t}}{-\frac{1}{t^2}} = \frac{-1-1}{-1} = 2$$

જવાબ : (C)

$$(99) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sum_{r=1}^{2016} (r+x)^{2016}}{x^{2016} + 2016^{2016}} = \dots$$

- (A) 2014 (B) 2015 (C) 2016 (D) લક્ષ્યનું અસ્તિત્વ નથી.

ઉકેલ : $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{(1+x)^{2016} + (2+x)^{2016} + \dots + (2016+x)^{2016}\}}{x^{2016} + 2016^{2016}}$ સ્વરૂપ

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{2016} \left\{ \left(\frac{1}{x} + 1 \right)^{2016} + \left(\frac{2}{x} + 1 \right)^{2016} + \dots + \left(\frac{2016}{x} + 1 \right)^{2016} \right\}}{x^{2016} \left(1 + \left(\frac{2016}{x} \right)^{2016} \right)}$$

$$= \frac{(0+1)^{2016} + (0+1)^{2016} + \dots + (0+1)^{2016}}{1+0} = 2016 \quad \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \right)$$

જવાબ : (C)

$$(100) \quad \text{જો } 5f(x) + 3f\left(\frac{1}{x}\right) = x + 2 \text{ અને } y = xf(x), \text{ તો } \left(\frac{dy}{dx} \right)_{x=1} = \dots$$

- (A) 14 (B) -1 (C) 1 (D) $\frac{7}{8}$

ઉકેલ : $5f(x) + 3f\left(\frac{1}{x}\right) = x + 2$ (1)

$$5f'(x) + 3f'\left(\frac{1}{x}\right) \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 1$$
 (2)

હવે, $y = xf(x)$ પરથી $\frac{dy}{dx} = f(x) + xf'(x)$

$$\left(\frac{dy}{dx} \right)_{x=1} = f(1) + f'(1)$$

(1) મિ $x = 1$ મૂકતાં, $5 f(1) + 3f(1) = 3$. આથી $f(1) = \frac{3}{8}$

(2) મિ $x = 1$ મૂકતાં, $5 f'(1) - 3f'(1) = 1$. આથી $f'(1) = \frac{1}{2}$

$$\therefore \left(\frac{dy}{dx} \right)_{x=1} = \frac{3}{8} + \frac{1}{2} = \frac{7}{8}$$

જવાબ : (D)

(101) ધારો કે વિધેય f એ દ્વિતીય વિકલિત ધરાવતું એવું વિધેય છે, જ્યાં $f''(x) = -f(x)$ અને $f'(x) = g(x)$. જો $h(x) = (f(x))^2 + (g(x))^2$ અને $h(5) = 3$ તો $h(10) = \dots$

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

ઉકેલ : $g(x) = f'(x)$

$$\therefore g'(x) = f''(x) = -f(x)$$

$$h(x) = (f(x))^2 + (g(x))^2$$

$$\therefore h'(x) = 2f(x)f'(x) + 2g(x)g'(x) = 2f(x)f'(x) + 2f'(x)(-f(x)) = 0$$

$\therefore h(x)$ અચળ વિધેય છે.

$$h(5) = 3 \text{ હોવાથી, } h(10) = 3$$

જવાબ : (D)

(102) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan \sqrt[3]{x} \log(1+3x)}{(\tan^{-1} \sqrt{x})^2 (e^{5\sqrt[3]{x}} - 1)} = \dots$

- (A) $\frac{\sqrt{3}}{5}$ (B) 1 (C) $\frac{3}{5}$ (D) 0

ઉકેલ : આપેલ લક્ષ્ય =
$$\frac{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan \sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x}} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+3x)}{3x} \cdot 3x}{\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan^{-1} \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \right)^2 \cdot (\sqrt{x})^2 \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5\sqrt[3]{x}} - 1}{5\sqrt[3]{x}} \times 5\sqrt[3]{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x} \cdot 3x}{x \cdot 5\sqrt[3]{x}} = \frac{3}{5}$$
 જવાબ :

(C)

(103) જો $xy = e - e^y$ તો $\left(\frac{d^2 y}{dx^2} \right)_{x=0} = \dots$

- (A) $\frac{1}{e}$ (B) $\frac{1}{e^3}$ (C) $\frac{1}{e^2}$ (D) e^2

ઉકેલ : $xy = e - e^y$ (1)

$$x \frac{dy}{dx} + y = -e^y \frac{dy}{dx} \quad (2)$$

$$x \frac{d^2 y}{dx^2} + 2 \frac{dy}{dx} = -e^y \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - e^y \frac{d^2 y}{dx^2} \quad (3)$$

(1) મિ $x = 0$ મૂકતાં, $0 = e - e^{y(0)}$

$$\therefore e^{y(0)} = e^1. \text{ આથી } y(0) = 1$$

$$(2)\text{મિ } x = 0 \text{ મૂકતાં, } y(0) = -e^{y(0)} \left(\frac{dy}{dx} \right)_{x=0}$$

$$1 = -e \left(\frac{dy}{dx} \right)_{x=0}. \quad \text{અર્થાત્ } \left(\frac{dy}{dx} \right)_{x=0} = -\frac{1}{e}$$

$$(3)\text{મિ } x = 0 \text{ મૂકતાં, } 2 \left(\frac{dy}{dx} \right)_{x=0} = -e^{y(0)} \left[\left(\frac{dy}{dx} \right)_{x=0} \right]^2 - e^{y(0)} \left(\frac{d^2y}{dx^2} \right)_{x=0}$$

$$-\frac{2}{e} = -e \frac{1}{e^2} - e \left(\frac{d^2y}{dx^2} \right)_{x=0}$$

$$\therefore \frac{1}{e^2} = \left(\frac{d^2y}{dx^2} \right)_{x=0}$$

જવાબ : (C)

$$(104) \quad \text{ધારો કે } f(x) = \begin{cases} x^n \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad \text{જો } f(x) \text{ એ } x = 0 \text{ આગળ સતત હોય, પરંતુ વિકલનીય ન હોય તો}$$

$$(A) n \in (0, 1]$$

$$(B) n \in [1, \infty)$$

$$(C) n \in (-\infty, 0)$$

$$(D) n = 0$$

ઉકેલ : $f(x)$ એ $x = 0$ આગળ સતત હોવાથી,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} x^n \sin \frac{1}{x} = 0$$

$$\therefore n > 0 \quad (n > 0 \text{ હોય તો } \delta = \frac{1}{\varepsilon^n} \text{ લઈ શકાય.)}$$

જો $f(x)$ એ $x = 0$ આગળ વિકલનીય હોય, તો

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \text{ નું અસ્તિત્વ હોય.}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^n \sin \frac{1}{x} - 0}{x} \text{ નું અસ્તિત્વ હોય.}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} x^{n-1} \sin \frac{1}{x} \text{ નું અસ્તિત્વ હોય.}$$

$$\therefore n - 1 > 0. \quad \text{અર્થાત્ } n > 1$$

જો $n \leq 1$ હોય, તો $\lim_{x \rightarrow 0} x^{n-1} \sin \frac{1}{x}$ નું અસ્તિત્વ ન હોય અને તેથી $f(x)$ એ $x = 0$ આગળ વિકલનીય ન હોય.

$\therefore$ જો $n \in (0, 1]$ હોય તો $f(x)$ એ $x = 0$ આગળ સતત હોય પરંતુ x વિકલનીય ન હોય. જવાબ : (A)

$$(105) \quad \text{જો } f(x) = \left(\sum_{k=0}^n a_k |x-1|^k \right) \text{ જ્યાં } a_k > 0, \text{ તો } f(x) \text{ એ}$$

$$(A) x = 1 \text{ આગળ સતત નથી.}$$

$$(B) R \text{ પર સતત છે, પરંતુ } x = 0 \text{ આગળ વિકલનીય નથી.}$$

$$(C) R \text{ પર વિકલનીય છે.}$$

$$(D) R \text{ પર સતત છે પરંતુ } x = 1 \text{ આગળ વિકલનીય નથી.}$$

ઉકેલ : $|x-1|, |x-1|^2, \dots$ એ R પર સતત છે. સતત વિધેયનો સરવાળો પણ સતત હોવાથી $f(x)$ એ R પર સતત થશે. વળી, $|x-1|, |x-1|^3, \dots$ એ $x = 1$ આગળ વિકલનીય નથી.

$\therefore f(x)$ એ R પર સતત છે પરંતુ $x = 1$ આગળ વિકલનીય નથી.

જવાબ : (D)

(106) ધારો કે વાસ્તવિક વિધેય f માટે $f(x+y) = f(x) - f(y) + 2xy - 1, \forall x, y \in \mathbb{R}$.

જો f એ વિકલનીય હોય અને $f'(0) = b$ હોય, તો b ની કઈ કિંમત માટે $f(x) > 0, \forall x$ થશે ?

(A) આવો b ન મળે. (B) $b > 0$ (C) $b < 0$ (D) $b = 0$

ઉકેલ : વિધેય f સમીકરણ $f(x+y) = f(x) - f(y) + 2xy - 1$ માં $x = 0 = y$ મૂકતાં, $f(0) = -1$ મળે.

$$\begin{aligned} \text{હવે, } f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(h) + 2xh - 1 - f(x)}{h} \\ &= 2x - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = 2x - f'(0) = 2x - b \quad (f(0) = -1) \end{aligned}$$

$$\therefore f'(x) = 2x - b$$

$$\therefore f(x) = x^2 - bx + c \text{ જ્યાં } c \text{ અચળ}$$

$$x = 0 \text{ મૂકતાં, } c = -1. \text{ આથી } f(x) = x^2 - bx - 1$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \text{ જો } D = b^2 - 4ac = b^2 + 4 < 0 \text{ હોય તો } f(x) > 0 \text{ થાય. } (a = 1)$$

આ b ની કોઈ પણ વાસ્તવિક કિંમત માટે શક્ય નથી.

જવાબ : (A)

(107) જો $y = \sin x \cdot \sin 2x \cdot \sin 3x \dots \cdot \sin nx$, તો $\frac{dy}{dx} = \dots$

$$(A) \sum_{k=1}^n k \tan kx \quad (B) y \sum_{k=1}^n k \cot kx \quad (C) y \sum_{k=1}^n k \tan kx \quad (D) \sum_{k=1}^n k \cot kx$$

ઉકેલ : $y = \sin x \cdot \sin 2x \cdot \sin 3x \dots \cdot \sin nx$

$$\therefore \log y = \log \sin x + \log \sin 2x + \dots + \log \sin nx$$

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \cot x + 2 \cot 2x + \dots + n \cot nx$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = y \sum_{k=1}^n k \cot kx$$

જવાબ : (B)

(108) જો $f(x+y+z) = f(x)f(y)f(z), \forall x, y \in \mathbb{R}, f(4) = 4, f'(0) = 2$ તો $f(4), f(4), f'(0)$ એ

(A) સમાંતર શ્રેણીમાં છે. (B) સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં છે.
(C) સ્વરિત શ્રેણીમાં છે. (D) (A), (B), (C) ત્રણેય સત્ય છે.

ઉકેલ : $f(x+y+z) = f(x)f(y)f(z)$ (1)

સમીકરણ (1)માં $x = 4, y = 0, z = 0$ મૂકતાં,

$$f(4) = f(4)f(0)f(0)$$

$$\therefore f(0) = \pm 1$$

$$(f(4) = 4 \neq 0)$$

ફરીથી સમીકરણ (1)માં $x = 4, y = -2, z = -2$ મૂકતાં,

$$f(0) = f(4) [f(-2)]^2 \geq 0 = 4 [f(-2)]^2 \geq 0.$$

$$\therefore f(0) \neq -1 \quad \text{આથી } f(0) = 1$$

સમીકરણ (1)માં $y = 4, z = 0$ મૂકતાં,

$$f(x+4) = f(x)f(4)f(0) = 4f(x)$$

$$\therefore f'(x+4) = 4 f'(x). \text{ અર્થાત્ } f'(4) = 4 f'(0) = 8$$

$$\therefore f'(4), f(4), f'(0) \text{ સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં છે.}$$

જવાબ : (B)

$$(109) \quad \text{જો } \sqrt{r} = ae^{\theta \cot \alpha} \text{ તો } \frac{d^2 r}{d\theta^2} - 4 r \cot^2 \alpha = \dots (a, \alpha \in \mathbb{R})$$

$$(A) r$$

$$(B) \frac{1}{r}$$

$$(C) 1$$

$$(D) 0$$

$$\text{ઉકેલ : } \sqrt{r} = ae^{\theta \cot \alpha}$$

$$\therefore r = a^2 e^{2\theta \cot \alpha}$$

(1)

$$\therefore \frac{dr}{d\theta} = a^2 \cot \alpha \cdot 2e^{2\theta \cot \alpha}$$

$$\therefore \frac{d^2 r}{d\theta^2} = 4a^2 \cot^2 \alpha \cdot e^{2\theta \cot \alpha}. \text{ અર્થાત્ } \frac{d^2 r}{d\theta^2} - 4 r \cot^2 \alpha = 0$$

જવાબ : (D)

$$(110) \quad \text{જો } f(x) = \frac{\sin^2 x}{1+\cot x} + \frac{\cos^2 x}{1+\tan x} \text{ તો } f'(x) = \dots$$

$$(A) \cos 2x$$

$$(B) -\cos 2x$$

$$(C) \sin 2x$$

$$(D) -\sin 2x$$

$$\text{ઉકેલ : } f(x) = \frac{\sin^2 x}{1+\cot x} + \frac{\cos^2 x}{1+\tan x}$$

$$= \frac{\sin^2 x \cdot \tan x}{1+\tan x} + \frac{\cos^2 x}{1+\tan x}$$

$$= \frac{\frac{\sin^3 x}{\cos x} + \cos^2 x}{1+\tan x}$$

$$= \frac{\sin^3 x + \cos^3 x}{\sin x + \cos x} = \sin^2 x - \sin x \cos x + \cos^2 x$$

$$f(x) = 1 - \frac{1}{2} \sin 2x. \text{ અર્થાત્ } f'(x) = -\cos 2x$$

જવાબ : (B)

$$(111) \quad \text{જો } f(x) = 1 - \cos x \text{ હોય, તો } \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ e^{\sqrt{f\left(\frac{1}{x}\right)} \sqrt{f\left(\frac{1}{x}\right)} \sqrt{f\left(\frac{1}{x}\right)} \dots} \right\}^{\frac{1}{\cos^{-1}\left\{1-f\left(\frac{1}{x^2}\right)\right\}}} = \dots$$

$$(A) e$$

$$(B) 1$$

$$(C) \sqrt{e}$$

$$(D) \sqrt{\sqrt{e}}$$

$$\text{ઉકેલ : } f\left(\frac{1}{x^2}\right) = 1 - \cos \frac{1}{x^2} \quad \text{અર્થાત્ } \cos \frac{1}{x^2} = 1 - f\left(\frac{1}{x^2}\right)$$

$$\therefore \frac{1}{x^2} = \cos^{-1} \left\{ 1 - f \left(\frac{1}{x^2} \right) \right\} \text{ અથવા } x^2 = \frac{1}{\cos^{-1} \left\{ 1 - f \left(\frac{1}{x^2} \right) \right\}}$$

$$\begin{aligned} \text{અપેલ લક્ષ} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ e^{\sqrt{(1-\cos \frac{1}{x})} \sqrt{(1-\cos \frac{1}{x})} \sqrt{(1-\cos \frac{1}{x})} \dots} \right\}^{x^2} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \left\{ e^{\sqrt{(1-\cos y)} \sqrt{(1-\cos y)} \sqrt{(1-\cos y)} \dots} \right\}^{\frac{1}{y^2}} \quad \left(\frac{1}{x} = y \right) \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{(1-\cos y)} \sqrt{(1-\cos y)} \sqrt{(1-\cos y)} \dots}{y^2} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1-\cos y}{y^2} \quad \left(\sqrt{x} \sqrt{x} \sqrt{x} \dots = x \right) \\ &= e^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e} \end{aligned}$$

જવાબ : (C)

(112) $f(x) = \frac{|x|}{|x|+2016}$ એ કેટલા બિંદુએ વિકલનીય નથી ?

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) અનંત

ઉકેલ : જો $x < 0$ તો $f(x) = \frac{-x}{-x+2016} = \frac{x}{x-2016}$

જે બધા $x < 0$ માટે વિકલનીય થશે.

જો $x > 0$ તો $f(x) = \frac{x}{x+2016}$ જે બધા $x > 0$ માટે વિકલનીય થશે.

હવે, $x = 0$ માટે વિકલનીયની ચકાસણી કરીએ.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{x}{x+2016} - 0}{x} = \frac{1}{2016}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{-x}{-x+2016} - 0}{x} = -\frac{1}{2016}$$

જવાબ : (B)

$\therefore f$ એ $x = 0$ માટે વિકલનીય નથી.

(113) જો $y = 2^{x^{2^x}}$ તો $\frac{dy}{dx} = \dots\dots$

- (A) $2^{x^{2^x}} x^{2^x} \log_e 2 \left(2^x \log_e x \log_e 2 + \frac{2^x}{x} \right)$ (B) $2^{x^{2^x}} (1 + x \log_e 2) 2^x \log_e 2$
(C) $2^{x^{2^x}} (1 + x \log_e 2) 2^x (\log_e 2)^2$ (D) $2^{x^{2^x}} (1 - x \log_e 2) 2^x \log_e 2$

ઉકેલ : $y = 2^{x^{2^x}}$

$\therefore \log_e y = x^{2^x} \log 2$

$\therefore \log_e (\log_e y) = 2^x \log_e x + \log_e (\log_e 2)$

$\therefore \frac{1}{\log_e y} \cdot \frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = 2^x (\log_e 2) (\log_e x) + 2^x \frac{1}{x} + 0$

$\therefore \frac{dy}{dx} = y \log_e y \left(2^x (\log_e 2) (\log_e x) + \frac{2^x}{x} \right)$

$= 2^{x^{2^x}} x^{2^x} \log_e 2 \left(2^x (\log_e x) (\log_e 2) + \frac{2^x}{x} \right)$

જવાબ : (A)

(114) વિધેય $f(x)$ માટે $f''(x) + f(x) = 0, \forall x$ અને $g(x) = [f(x)]^2 + [f'(x)]^2$ તથા $g(3) = 8$ તો $g(8) = \dots$

(A) 0

(B) 3

(C) 5

(D) 8

ઉકેલ : $g(x) = [f(x)]^2 + [f'(x)]^2$

$g'(x) = 2f(x)f'(x) + 2f'(x)f''(x)$

$= 2f'(x)(0) = 0, \forall x$

આથી $g'(x) = 0$

$\therefore g(x) = \text{અચળ}$

$g(3) = 8$ હોવાથી, $g(8) = 8$

જવાબ : (D)

(115) જો વિધેય $g(x)$ એ વિધેય $f(x)$ નું પ્રતિવિધેય હોય અને $f'(x) = \frac{1}{1+x^3}$, તો $g'(x) = \dots$

(A) $g(x)$

(B) $1 + g(x)$

(C) $1 + [g(x)]^3$

(D) $\frac{1}{1+[g(x)]^3}$

ઉકેલ : $[f(x)]^{-1} = g(x)$

$\therefore g(f(x)) = x$

$\therefore g'(f(x)) f'(x) = 1$

$\therefore g'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)} = 1 + x^3$

$\therefore g' [f(f^{-1}(x))] = 1 + [f^{-1}(x)]^3$

$\therefore g'(x) = 1 + [g(x)]^3$

બીજી રીત :

વિધેય g એ વિધેય f નું પ્રતિવિધેય છે.

$\therefore f(g(x)) = x$

$\therefore f'(g(x)) \cdot g'(x) = 1$

$\therefore \frac{1}{1+(g(x))^3} \cdot g'(x) = 1$

$\therefore g'(x) = 1 + (g(x))^3$

જવાબ : (C)

(116) જો $g : (-\infty, \infty) \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, $g(x) = 2 \tan^{-1}(e^x) - \frac{\pi}{2}$ અને f એ g નું પ્રતિવિધેય હોય તો $f'(0) = \dots$

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

ઉકેલ : અહીં $f = g^{-1}$. આથી $g^{-1}(x) = f(x)$

અહીં $g(x) = y = 2 \tan^{-1}(e^x) - \frac{\pi}{2}$

$\therefore \tan^{-1}(e^x) = \frac{\pi}{4} + \frac{y}{2}$

$\therefore x = \log \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{y}{2} \right)$

$$\therefore g^{-1}(y) = \log \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{y}{2} \right) \quad (g(x) = y)$$

$$\therefore g^{-1}(x) = \log \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right)$$

$$\therefore f(x) = \log \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right)$$

$$\therefore f'(x) = \frac{1}{\tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right)} \sec^2 \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right) \cdot \frac{1}{2}$$

$$\therefore f'(0) = \frac{1}{\tan \frac{\pi}{4}} \sec^2 \frac{\pi}{4} \cdot \frac{1}{2} = 1 \quad \text{જવાબ : (A)}$$

$$(117) \quad \text{જો } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} [(1+x)(1+x^2)(1+x^4) \dots n \text{ ટર્મ}], \text{ તો } f\left(\frac{1}{2}\right) = \dots \quad |x| < 1$$

$$(A) 1 \quad (B) 2 \quad (C) 3 \quad (D) 4$$

$$\text{ઉકેલ : } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{(1-x)(1+x)(1+x^2)(1+x^4) \dots n}{1-x} \right\}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-x^{2n}}{1-x} = \frac{1}{1-x} \quad \left(\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0, |x| < 1 \right)$$

$$\therefore f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2 \quad \text{જવાબ : (B)}$$

$$(118) \quad \text{જો } y = \sqrt{2x-x^2} \text{ તો, } y^3 \frac{d^2y}{dx^2} + k = 0, \text{ હોય તો } k = \dots$$

$$(A) 1 \quad (B) 2 \quad (C) 3 \quad (D) 4$$

$$\text{ઉકેલ : } y = \sqrt{2x-x^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2-2x}{2\sqrt{2x-x^2}} = \frac{1-x}{y}$$

$$\therefore y \frac{dy}{dx} = 1-x$$

$$\left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + y \frac{d^2y}{dx^2} = -1 \quad \text{પદ સુધી}$$

$$\therefore y^3 \frac{d^2y}{dx^2} = -y^2 \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - y^2 = -(1-x)^2 - (2x-x^2)$$

$$\therefore y^3 \frac{d^2y}{dx^2} + 1 = 0. \quad \text{આથી } k = 1 \quad \text{જવાબ : (A)}$$

- (119) જો $f(x) = |x|$, $g(x) = \sin x$ અને $h(x) = g(x)f(g(x))$ તો
- (A) $h(x)$ એ સતત વિધેય છે પરંતુ $x = 0$ આગળ વિકલનીય નથી.
- (B) $h(x)$ એ સતત તેમજ વિકલનીય વિધેય છે.
- (C) $h(x)$ એ સતત વિધેય છે અને ફક્ત $x = 0$ આગળ વિકલનીય છે.
- (D) $h(x)$ એ અસતત વિધેય છે.

ઉકેલ : $h(x) = \sin x |\sin x| = \begin{cases} \sin^2 x, & x \geq 0 \\ -\sin^2 x, & x < 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} (0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}) \\ (-\frac{\pi}{2} < x < 0) \end{matrix}$

સ્પષ્ટ છે કે $h(x)$ એ સતત તેમજ વિકલનીય વિધેય છે.

જવાબ : (B)

- (120) વિધેય $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ માટે $f(a) = 1, f'(a) = 2$, તો $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f^2(a+x)}{f(a)} \right)^{\frac{1}{x}} = e^k$ તો $k = \dots$

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

ઉકેલ : $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f^2(a+x)}{f(a)} \right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{e^x \rightarrow 0} \left(\frac{f^2(a+x)-1}{x f(a)} \right)$

$$= \lim_{e^x \rightarrow 0} \left(\frac{f^2(a+x) - (f(a))^2}{x} \right) \quad (f(a) = 1)$$

$$= e^{(f'(a))^2} = e^4$$

$\therefore k = 4$

જવાબ : (D)

- (121) વિધેય $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ માટે નીચે આપેલ પૈકી કયા વિધાન સત્ય (T) કે મિથ્યા (F) છે ?

- (i) જો $|f(x) - f(y)| \leq 30|x - y|, \forall x, y \in \mathbb{R}$, તો f એ $\mathbb{R}$ પર સતત વિધેય છે.
- (ii) જો $|f(x) - f(y)| \leq 30|x - y|, \forall x, y \in \mathbb{R}$, તો f એ $\mathbb{R}$ પર વિકલનીય વિધેય છે.
- (iii) જો $|f(x) - f(y)| \leq 21|x - y|^2, \forall x, y \in \mathbb{R}$ તો f એ $\mathbb{R}$ પર વિકલનીય વિધેય છે.
- (iv) જો $|f(x) - f(y)| \leq 21|x - y|^2, \forall x, y \in \mathbb{R}$ તો f એ અચળ વિધેય છે.

- (A) TTTT (B) TFFT (C) FTTF (D) TFTF

ઉકેલ : વિધાન (i) સત્ય છે તે લક્ષની વ્યાખ્યા પરથી ($\delta = \frac{\epsilon}{30}$ લો) સહેલાઈથી સાબિત કરી શકાય.

વિધાન (ii) મિથ્યા છે, તે $f(x) = |x|$ લઈને ચકાસી શકાય.

વિધાન (iii), (iv) માટે કોઈક $a \in \mathbb{R}$ માટે $\left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right| \leq 21|x - a|$

$\therefore f$ એ $\mathbb{R}$ પર વિકલનીય વિધેય છે.

જો $x \rightarrow a$ તો $|f'(a)| \leq 0$

$\therefore |f'(a)| = 0$

$\therefore f$ એ અચળ વિધેય છે. આથી વિધાન (iii), (iv) સત્ય છે.

જવાબ : (B)

(122) f એ વિકલનીય વિધેય છે તથા $f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{f(x)}{f(y)}$, $x \neq 0, y \neq 0, f(y) \neq 0$ છે. જો $f'(1) = 2$ હોય, તો $f'(x) = \dots$

(A) $2f(x)$

(B) $\frac{f(x)}{x}$

(C) $2xf(x)$

(D) $\frac{2f(x)}{x}$

ઉકેલ : અહીં $f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{f(x)}{f(y)}$

$\therefore f\left(\frac{1}{1}\right) = \frac{f(1)}{f(1)} = 1$. આથી $f(1) = 1$

$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

$= f(x) \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{\frac{f(x+h)}{f(x)} - 1}{\frac{h}{x}} \right\}$

$= f(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(\frac{x+h}{x}\right) - 1}{\frac{h}{x}}$

$= \frac{f(x)}{x} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(1 + \frac{h}{x}\right) - f(1)}{\frac{h}{x}} = \frac{f(x)}{x} f'(1) = \frac{2f(x)}{x} \quad (f'(1) = 2)$

જવાબ : (D)

(123) જો $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[n]{x} - 1 \right) n$, તો $\frac{1}{f'(2012)}, \frac{1}{f'(2013)}, \frac{1}{f'(2014)}$ એ =

(A) સમાંતર શ્રેણીમાં હોય.

(B) સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોય.

(C) સ્વરિત શ્રેણીમાં હોય.

(D) એક પણ નહિ.

ઉકેલ : $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n - 1}{\frac{1}{n}} = \log_e x$. આથી $f'(x) = \frac{1}{x}$

$\therefore \frac{1}{f'(2012)}, \frac{1}{f'(2013)}, \frac{1}{f'(2014)}$ એ અનુક્રમે 2012, 2013, 2014 થશે. એ સમાંતર શ્રેણીમાં હોય. જવાબ : (A)

(124) જો $a < b < c$, $f(x)$ એ (a, c) પર ચુસ્ત રીતે વધતું વિધેય હોય અને $f(x)$ એ $[a, c]$ પર સતત હોય તો

(A) $(b-a)f(c) + (c-b)f(a) > (c-a)f(b)$

(B) $(b-a)f(c) + (c-b)f(a) < (c-a)f(b)$

(C) $(b-a)f(a) + (c-b)f(b) > (c-a)f(c)$

(D) $(b-a)f(a) + (c-b)f(b) > (c-a)f(c)$

ઉકેલ : $[a, b]$ તેમજ $[b, c]$ પર મધ્યકમાન પ્રમેયનો ઉપયોગ કરતાં,

$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\alpha)$ તથા $\frac{f(c)-f(b)}{c-b} = f'(\beta)$, $\alpha \in (a, b)$, $\beta \in (b, c)$

વળી, f' એ ચુસ્ત રીતે વધતું વિધેય હોવાથી, $f'(\beta) > f'(\alpha)$

$$\therefore \frac{f(c)-f(b)}{c-b} > \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

$$\therefore (b-a)f(c) + (c-b)f(a) > (c-a)f(b)$$

જવાબ : (A)

(125) વિધેય $f: (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ માટે,

$$(1) f(ab) = f(a)f(b) \text{ અને}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = c, \text{ (જ્યાં } c \neq 0, \text{) પ્રકારનું છે. } f(4) = \dots$$

$$(A) 1$$

$$(B) 2$$

$$(C) 3$$

$$(D) 4$$

ઉકેલ : $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = c, c \neq 0$

ધારો કે $a \in (0, \infty)$

$$c = \lim_{x \rightarrow \infty} f(ax) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(a)f(x)$$

$$= f(a) \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$$

$$\therefore c = f(a) c$$

$$\therefore f(a) = 1$$

$$(a \in (0, \infty)), c \neq 0$$

$$\therefore f(4) = 1$$

જવાબ : (A)

(126) અરિક્ત ગણ A, B માટે $f: A \rightarrow B$ અને $g: B \rightarrow A$ એવાં વિધેય છે જ્યાં $f(g(x)) = x, \forall x \in B$. નીચેનામાંથી કયા વિધાન સત્ય (T) કે મિથ્યા (F) છે ?

(i) વિધેય f એક-એક વિધેય છે.

(ii) વિધેય f વ્યાપ્ત વિધેય છે.

(iii) વિધેય g એક-એક વિધેય છે.

(iv) વિધેય g વ્યાપ્ત વિધેય છે.

$$(A) FTTF$$

$$(B) FTFT$$

$$(C) TTFF$$

$$(D) TFFT$$

ઉકેલ : $x_1, x_2 \in B$ માટે $g(x_1) = g(x_2) \Rightarrow f(g(x_1)) = f(g(x_2)) \Rightarrow x_1 = x_2 \Rightarrow g$ એક-એક વિધેય છે.

વળી, સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે f એ વ્યાપ્ત વિધેય છે.

જવાબ : (A)

(f ડાબી બાજુનો પ્રતીપ હોવાથી એક-એક ના હોઈ શકે.)

(127) જો $3f(x) - 2f\left(\frac{1}{x}\right) = x$, તો $f'(2) = \dots$

$$(A) \frac{2}{7}$$

$$(B) \frac{1}{2}$$

$$(C) 2$$

$$(D) \frac{7}{2}$$

$$\text{ઉકેલ : } 3f(x) - 2f\left(\frac{1}{x}\right) = x$$

(1)

$$x \text{ ની જગ્યાએ } \frac{1}{x} \text{ મૂકતાં, } -2f(x) + 3f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x}$$

(2)

$$(1) \text{ અને } (2) \text{ પરથી } f\left(\frac{1}{x}\right) \text{ નો હોવા કરતાં, } f(x) = \frac{1}{5} \left(3x + \frac{2}{x}\right)$$

$$\therefore f'(x) = \frac{1}{5} \left(3 - \frac{2}{x^2}\right). \text{ આથી } f'(2) = \frac{1}{2}$$

જવાબ : (B)

(128) જો $v e^{\frac{u}{v^3}} = 1$ તો

(A) $v \frac{d^2u}{dv^2} + 2 \frac{du}{dv} + 3v^2 = 0$

(B) $v \frac{d^2u}{dv^2} - 2 \frac{du}{dv} + 3v^2 = 0$

(C) $v \frac{d^2u}{dv^2} + 2 \frac{du}{dv} = 3v^2$

(D) $\frac{d^2u}{dv^2} - 2 \frac{du}{dv} = 3v^3$

ઉકેલ : $v e^{\frac{u}{v^3}} = 1$

$\log v + \frac{u}{v^3} = 0$. આથી $u + v^3 \log v = 0$ (1)

$\therefore \frac{du}{dv} + v^3 \frac{1}{v} + 3v^2 \log v = 0$

$\therefore v \frac{du}{dv} + v^3 + 3v^3 \log v = 0$

$\therefore v \frac{du}{dv} + v^3 + 3(-u) = 0$ ((1) પરથી)

$\therefore v \frac{d^2u}{dv^2} + \frac{du}{dv} + 3v^2 - 3 \frac{du}{dv} = 0$

$\therefore v \frac{d^2u}{dv^2} - 2 \frac{du}{dv} + 3v^2 = 0$

જવાબ : (B)

(129) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ વિકલનીય વિધેય છે. જો $f(y) f(x - y) = f(x)$, $\forall x, y \in \mathbb{R}$ અને $f'(0) = p$, $f'(5) = q$, $p, q \neq 0$ તો $f'(-5) = \dots$

(A) $\frac{p^2}{q}$

(B) $\frac{p}{q}$

(C) $\frac{q}{p}$

(D) q

ઉકેલ : $f(y) f(x - y) = f(x)$ નું x પ્રત્યે વિકલન કરતાં, $f(y) f'(x - y) = f'(x)$

$x = y$ મૂકતાં, $f(x) f'(0) = f'(x)$

$\therefore f'(x) = p f(x)$ ($f'(0) = p$) (1)

$\therefore \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \int p dx + c$

$\therefore \log_e f(x) = px + c$ (2)

સમીકરણ (1) માં $x = 0$ મૂકતાં, $f'(0) = p f(0)$. આથી $p = p f(0)$. આથી $f(0) = 1$

$\therefore \log_e f(0) = c$

સમીકરણ (2) પરથી, આથી $\log_e 1 = c$. તેથી $c = 0$

$\therefore \log_e f(x) = px$

$\therefore f(x) = e^{px}$. આથી $f'(x) = p e^{px}$

$\therefore f'(5) = p e^{5p} = q$. આથી $e^{5p} = \frac{q}{p}$

$\therefore f'(-5) = p e^{-5p} = \frac{p}{q/p} = \frac{p^2}{q}$

જવાબ : (A)

$$(130) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[3]{n^2 - n^3} + n \right) = \dots\dots$$

$$(A) \quad \frac{1}{3}$$

$$(B) \quad -\frac{1}{3}$$

$$(C) \quad \frac{2}{3}$$

$$(D) \quad -\frac{2}{3}$$

$$\text{ઉકેલ : } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[3]{n^2 - n^3} + n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\left(\frac{1}{n} - 1 \right)^{\frac{1}{3}} + 1^{\frac{1}{3}} \right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{\left(\frac{1}{n} - 1 \right) + 1}{\left(\frac{1}{n} - 1 \right)^{\frac{2}{3}} - \left(\frac{1}{n} - 1 \right)^{\frac{1}{3}} + 1} \right] \quad \left(a+b = \frac{a^3 + b^3}{a^2 - ab + b^2} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{\left(\frac{1}{n} - 1 \right)^{\frac{2}{3}} - \left(\frac{1}{n} - 1 \right)^{\frac{1}{3}} + 1} \right] = \frac{1}{3}$$

જવાબ : (A)

$$(131) \quad \text{જો વક્ર } xy + ax + by = 0 \text{ ને } (1, 1) \text{ આગળનો સ્પર્શક X-અક્ષ સાથે } \tan^{-1} 2 \text{ માપનો ખૂણો બનાવે, તો}$$

$$\frac{a+b}{ab} = \dots\dots$$

$$(A) \quad 0$$

$$(B) \quad \frac{1}{2}$$

$$(C) \quad \frac{-1}{2}$$

$$(D) \quad 1$$

$$\text{ઉકેલ : } xy + ax + by = 0 \text{ નું વિકલન કરતાં } \left(x \frac{dy}{dx} + y + a + b \frac{dy}{dx} \right) = 0$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = - \left(\frac{a+y}{b+x} \right)$$

$$\therefore \left(\frac{dy}{dx} \right)_{(1,1)} = - \frac{a+1}{b+1} = 2 \quad (\text{આપેલ છે કે સ્પર્શક X-અક્ષ સાથે } \tan^{-1} 2 \text{ માપનો ખૂણો બનાવે છે.})$$

$$\therefore a + 2b = -3 \quad (1)$$

$$\text{વળી, } (1, 1) \text{ એ વક્ર પરનું બિંદુ છે. આથી } 1 + a + b = 0. \quad \text{આથી } a + b = -1 \quad (2)$$

$$(1) \text{ અને } (2) \text{ ને ઉકેલતાં, } a = 1, b = -2$$

$$\therefore \frac{a+b}{ab} = \frac{1}{2}$$

જવાબ : (B)

$$(132) \quad R \text{ ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળમાં અંતર્ગત ત્રિકોણની બાજુનો શૂન્યેતર વૃદ્ધિદર એ તેના સામેની બાજુના ખૂણાના વૃદ્ધિદર કરતા R ગણો છે. આ ખૂણાનું માપ } \dots\dots \text{ થાય.}$$

$$(A) \quad \frac{\pi}{6}$$

$$(B) \quad \frac{\pi}{4}$$

$$(C) \quad \frac{\pi}{3}$$

$$(D) \quad \frac{\pi}{2}$$

$$\text{ઉકેલ : } \text{ધારો કે ત્રિકોણની બાજુ } BC = a \text{ અને તેની સામેનો ખૂણો } A \text{ છે.}$$

$$\therefore a = 2R \sin A$$

$$\frac{da}{dt} = 2R \cos A \frac{dA}{dt}. \quad \text{અર્થાત્} \quad R \frac{dA}{dt} = 2R \cos A \frac{dA}{dt} \quad \left(\frac{da}{dt} = R \frac{dA}{dt} \right)$$

$$\therefore \cos A = \frac{1}{2}. \quad \text{અર્થાત્} \quad A = \frac{\pi}{3}$$

જવાબ : (C)

(133) $f(x) = \sin x + \cos x$, $0 \leq x \leq 2\pi$ એ અંતરાલમાં ચુસ્ત ઘટતું વિધેય છે.

(A) $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$

(B) $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)$

(C) $\left(\frac{5\pi}{4}, 2\pi\right)$

(D) $(0, 2\pi)$

ઉકેલ : $f(x) = \sin x + \cos x$

$$f'(x) = \cos x - \sin x$$

$$\text{હવે, } f'(x) = 0 \Rightarrow \sin x = \cos x. \quad \text{અર્થાત્} \quad x = \frac{\pi}{4} \text{ અથવા } \frac{5\pi}{4} \quad (0 \leq x \leq 2\pi)$$

અંતરાલ	$f'(x)$	f વિશે નિર્ણય
$\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$	ધન	f ચુસ્ત વધતું વિધેય
$\left(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)$	ઋણ	f ચુસ્ત ઘટતું વિધેય
$\left(\frac{5\pi}{4}, 2\pi\right)$	ધન	f ચુસ્ત વધતું વિધેય

આમ, $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)$ માં f ચુસ્ત ઘટતું વિધેય છે.

જવાબ : (B)

(134) વર્તુળ અને ચોરસની પરિમિતિનો સરવાળો અચળ છે. તેમના ક્ષેત્રફળનો સરવાળો ન્યૂનતમ હોય, ત્યારે ચોરસની બાજુ તથા વર્તુળની ત્રિજ્યાનો ગુણોત્તર છે.

(A) 1 : 2

(B) 2 : 1

(C) 1 : 3

(D) 4 : 1

ઉકેલ : ધારો કે વર્તુળની ત્રિજ્યા r અને ચોરસની બાજુ x છે. તેમની પરિમિતિનો સરવાળો

$$2\pi r + 4x = 2k, \quad k \text{ અચળ}$$

$$\text{તેમના ક્ષેત્રફળનો સરવાળો} = \pi r^2 + x^2$$

$$\therefore f(r) = \pi r^2 + \frac{(k - \pi r)^2}{4}$$

$$f'(r) = 2\pi r - 2\pi \frac{(k - \pi r)}{4} = 0 \Rightarrow k = \pi r + 4r$$

$$\therefore 2\pi r + 4x = 2\pi r + 8r \quad (2k = 2\pi r + 4x). \quad \text{અર્થાત્} \quad x = 2r$$

$$\therefore \frac{x}{r} = \frac{2}{1}$$

$$\text{વળી, } f''(r) = 2\pi - \frac{\pi}{2} (0 - \pi) = 2\pi + \frac{\pi^2}{2} > 0$$

$\therefore$ ચોરસની બાજુ તથા વર્તુળની ત્રિજ્યાનો ગુણોત્તર 2 : 1 હોય ત્યારે ક્ષેત્રફળનો સરવાળો ન્યૂનતમ છે. જવાબ : (B)

(135) જો વક્ર $y = x \cos x$ તથા $y = \frac{\sin x}{x}$ ના કોઈ પણ બિંદુ (x, y) આગળના સ્પર્શકો X-અક્ષને સમાંતર હોય, તો x એ અનુક્રમે નાં બીજ થશે.

(A) $\sin x = x, \tan x = x$

(B) $\cot x = x, \sec x = x$

(C) $\cot x = x, \tan x = x$

(D) $\tan x = x, \sec x = x$

ઉકેલ : ધારો કે $y = f(x) = x \cos x$ અને $y = g(x) = \frac{\sin x}{x}$

$$f'(x) = -x \sin x + \cos x \text{ અને } g'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$$

હવે, જો સ્પર્શકો X-અક્ષને સમાંતર હોય, તો $f'(x) = 0$ તથા $g'(x) = 0$ થાય. ($\sin x = 0, \cos x = 0$ શક્ય નથી કેમ?)

$\therefore \cot x = x$ અને $\tan x = x$ થાય.

જવાબ : (C)

(136) સમીકરણ $e^{x-8} + 2x - 17 = 0$ ને

(A) બે વાસ્તવિક બીજ મળે.

(B) એક વાસ્તવિક બીજ મળે.

(C) આઠ વાસ્તવિક બીજ મળે.

(D) અનંત ઉકેલો મળે.

ઉકેલ : સ્પષ્ટ છે કે $x = 8$ એ આપેલ સમીકરણનો એક ઉકેલ છે. ધારો કે $\alpha \neq 8$ એ આપેલ સમીકરણનો બીજો ઉકેલ છે.

$\alpha > 8$, તો અંતરાલ $[8, \alpha]$ માં રોલના પ્રમેયનો ઉપયોગ કરતાં, $c \in (8, \alpha)$ એવો મળે કે જેથી $f'(c) = 0$ થાય.

$\therefore e^{c-8} + 2 = 0$. આથી $e^{c-8} = -2$ જે શક્ય નથી. જો $\alpha < 8$ તો પણ આવું જ પરીણામ મળે.

$\therefore$ આપેલ સમીકરણને $x = 8$ સિવાય બીજો ઉકેલ નથી.

જવાબ : (B)

બીજી રીત :

$$f'(x) = e^{x-8} + 2 > 0, \forall x$$

$\therefore f$ વધતું વિધેય છે.

$\therefore f$ એક-એક વિધેય છે.

$\therefore f$ ને બે શૂન્ય ન મળે.

ઉપર રીત 1માં $\alpha < 8$ લઈએ, તો પણ f વધતું વિધેય હોવાથી, f ને બે બીજ ન મળે.

(137) વકો $x^2y = 1$ અને $x^3 = a^5y$ પરસ્પર કાટખૂણે છેદે તો $a^6 = \dots\dots$

(A) 2

(B) 4

(C) 6

(D) 8

ઉકેલ : પ્રથમ વકોનું છેદબિંદુ શોધીએ.

$$x^2y = 1 \text{ અને } x^3 = a^5y$$

$$\therefore x^2 \left(\frac{x^3}{a^5} \right) = 1. \text{ આથી } x^5 = a^5. \text{ આથી } x = a$$

$$y = \frac{x^3}{a^5} \text{ પરથી, } y = \frac{1}{a^2}. \text{ આથી છેદબિંદુ P ના યામ } \left(a, \frac{1}{a^2} \right) \text{ છે.}$$

$$\text{વક } x^2y = 1 \text{ માટે, } 2xy + x^2 \frac{dy}{dx} = 0. \quad \text{આથી } \frac{dy}{dx} = -\frac{2y}{x} \quad (x \neq 0)$$

$$\therefore \left(\frac{dy}{dx} \right)_{x=a} = -\frac{2}{a^3} = m_1$$

$$\text{વક } x^3 = a^5y \text{ માટે, } 3x^2 = a^5 \frac{dy}{dx}. \text{ આથી } \frac{dy}{dx} = \frac{3x^2}{a^5}. \quad \text{આથી } \left(\frac{dy}{dx} \right)_{x=a} = \frac{3}{a^3} = m_2$$

અહીં વકો કાટખૂણે છેદે છે.

$$\therefore m_1 m_2 = -1. \quad \text{આથી } \frac{-6}{a^6} = -1. \text{ આથી } a^6 = 6$$

જવાબ : (C)

- (138) વિધેય f એ દ્વિતીય વિકલન ધરાવે છે તથા $f''(t) < 0, \forall t \in \mathbb{R}$. જો $x, y \in \mathbb{R}$ માટે, $f'(y) + x < f(y+1)$ હોય, તો
 (A) $f(y) = x$ (B) $f(y) > x$ (C) $f(y) < x$ (D) $f(y) = x$

ઉકેલ : અંતરાલ $[y, y+1]$ માં વિધેય f માટે મધ્યકમાન પ્રમેયનો ઉપયોગ $f'(c) = \frac{f(y+1)-f(y)}{y+1-y}, c \in (y, y+1)$

$f''(t) < 0. \therefore$ આથી f' એ ઘટતું વિધેય છે.

વળી, $y < c < y+1$

$\therefore f'(c) < f'(y)$

$\therefore f(y+1) - f(y) < f'(y)$

$\therefore x + f'(y) < f(y+1) < f'(y) + f(y)$

$\therefore x < f(y)$

જવાબ : (B)

(139)
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \int_0^x \sqrt{t^3+1} dt}{\int_0^x t^2 \cos t dt} = \dots\dots$$

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

ઉકેલ :
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \int_0^x \sqrt{t^3+1} dt}{\int_0^x t^2 \cos t dt} \quad \left(\frac{0}{0} \text{ સ્વરૂપ}\right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sqrt{x^3+1} + 2x \int_0^x \sqrt{t^3+1} dt}{x^2 \cos x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^3+1}}{\cos x} + 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sqrt{t^3+1} dt}{x \cos x} \quad \left(\frac{0}{0} \text{ સ્વરૂપ}\right)$$

$$= 1 + 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^3+1}}{\cos x - x \sin x} = 1 + 2 = 3$$

જવાબ : (D)

- (140) ધારો કે $f(x)$ એ વિકલનીય વિધેય છે અને G એ $f(x)$ નો આલેખ છે. જો $P(a, f(a))$ એ G પર $(0, 0)$ થી સૌથી નજીકનું બિંદુ હોય, તો $f(a) f'(a) = \dots\dots\dots$

- (A) a (B) $-a$ (C) 1 (D) -1

ઉકેલ : અંતર વિધેય $D(x) = x^2 + (f(x))^2$ (ન્યૂનતમ/મહત્તમ માટે વર્ગમૂળ લેવાની જરૂર નથી.)

$\therefore D'(x) = 2x + 2f(x) f'(x)$

OP એ ન્યૂનતમ હોવાથી, $D'(a) = 0$

$\therefore a + f(a) f'(a) = 0$

$\therefore f(a) f'(a) = -a$

જવાબ : (B)

- (141) વક્ર $y^2 - x^2 = 1$ પર બિંદુ P એવું છે કે જેનો x યામ n હોય, જ્યાં $n \in \mathbb{N}$. જો d_n એ બિંદુ P થી રેખા $y = x$ પરનું અંતર દર્શાવે, તો $\lim_{n \rightarrow \infty} (nd_n) = \dots\dots\dots$

- (A) 1 (B) $2\sqrt{2}$ (C) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ (D) $\frac{1}{2}$

ઉકેલ : વક્ર $y^2 - x^2 = 1$ પરનું બિંદુ $P(n, \sqrt{n^2+1})$ છે, જ્યાં $n \in \mathbb{N}$

$$d_n = \left| \frac{\sqrt{n^2+1} - n}{\sqrt{2}} \right| = \frac{\sqrt{n^2+1} - n}{\sqrt{2}}$$

$$\begin{aligned}
\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} n d_n &= \frac{1}{\sqrt{2}} \lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt{n^2+1}-n) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n^2+1-n^2)}{\sqrt{n^2+1}+n} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}+1} = \frac{1}{2\sqrt{2}}
\end{aligned}$$

જવાબ : (C)

(ભિંદુ $P(n, -\sqrt{n^2+1})$ હોય તો ?)

$$(142) \quad \text{ધારો કે } F(x) = \begin{cases} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}, & x \neq 0 \\ e^3, & x = 0 \end{cases}$$

$$\text{અને } G(x) = \begin{cases} \left(1 + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}, & x \neq 0 \\ k, & x = 0 \end{cases}$$

જ્યાં $f(x)$ એ વાસ્તવિક વિધેય છે. જો $F(x)$ એ $x = 0$ આગળ સતત હોય, તો $G(x)$ ને $x = 0$ આગળ સતત થવા માટે $\log k$ ની કિંમત છે.

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

ઉકેલ : $F(x)$ એ $x = 0$ આગળ સતત છે.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} F(x) = F(0) = e^3$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = e^3$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x} \left(x + \frac{f(x)}{x}\right)} = e^3. \quad \text{અર્થાત્ } \lim_{x \rightarrow 0} e^{1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}} = e^3$$

$$\text{અર્થાત્ } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 2 \quad (1)$$

હવે, જો $G(x)$ એ $x = 0$ આગળ સતત હોય તો,

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} G(x) = k.$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = k. \quad \text{અર્થાત્ } e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{f(x)}{x}\right)} = k$$

$$\therefore e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}} = k. \quad \text{અર્થાત્ } e^2 = k \quad \text{અર્થાત્ } \log k = 2$$

જવાબ : (C)

(143) ધારો કે, $f(x) = x^2 - bx + c$, જ્યાં b, c એ અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા તથા $f(x) = 0$ નાં બંને બીજ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે. જો $b + c = 35$ હોય, તો $f(x)$ નું ન્યૂનતમ મૂલ્ય છે.

(A) $-\frac{183}{4}$

(B) $\frac{173}{16}$

(C) $-\frac{81}{4}$

(D) $\frac{81}{4}$

ઉકેલ : ધારો કે, α, β એ $f(x) = 0$ નાં બીજ છે.

$$\therefore \alpha + \beta = b$$

α, β અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે તથા b એ અયુગ્મ ધન સંખ્યા હોવાથી $\alpha = 2$ લો. $f(2) = 0$.

$$\therefore 2b - c = 4 \quad (1)$$

$$\therefore b + c = 35 \quad (2) \text{ (આપેલ છે.)}$$

$$\therefore b = 13, c = 22$$

$$f'(x) = 2x - b, \text{ આથી } f'(x) = 0 \Rightarrow x = \frac{b}{2} = \frac{13}{2}$$

$$\therefore f''(x) = 2 > 0$$

$$\therefore f \text{ નું ન્યૂનતમ મૂલ્ય } f\left(\frac{13}{2}\right) = -\frac{81}{4}$$

$$\text{નોંધ : ન્યૂનતમ} = \frac{4ac - b^2}{4a} = \frac{88 - 169}{4} = -\frac{81}{4}$$

જવાબ : (C)

$$(144) \text{ વિધેય } f(x) = \begin{cases} (x+1)^3, & -2 < x \leq -1 \\ x^{\frac{2}{3}} - 1, & -1 < x \leq 1 \\ -(x-1)^2, & 1 < x < 2 \end{cases}$$

ને કેટલાં બિંદુઓએ સ્થાનીય મહત્તમ તથા ન્યૂનતમ મૂલ્યોનું અસ્તિત્વ હોય ?

(A) 4


(B) 3

(C) 2

(D) 1

$$\text{ઉકેલ : } f'(x) = \begin{cases} 3(x+1)^2, & -2 < x < -1 \\ \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}, & (-1 < x < 1) - \{0\} \\ -2(x-1), & 1 < x < 2 \end{cases} \quad \left| \begin{array}{l} f' \text{ એ } -2 \text{ થી } -1 \text{ માં ધન છે.} \\ f' \text{ એ } -1 \text{ થી } 0 \text{ માં ઋણ છે.} \\ f' \text{ એ } 0 \text{ થી } 1 \text{ માં ધન છે.} \\ f' \text{ એ } 1 \text{ થી } 2 \text{ માં ઋણ છે.} \end{array} \right.$$

$x = -1, 0, 1$ બિંદુએ $f'(x)$ નું અસ્તિત્વ નથી.



$\therefore f$ ને કુલ ત્રણ બિંદુએ સ્થાનીય મહત્તમ તથા ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળે.

જવાબ : (B)

(145) વક્ર $y = [|\sin x| + |\cos x|]$ અને $x^2 + y^2 = 5$ વચ્ચેના ખૂણાનું માપ છે. જ્યાં $[.]$ એ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય છે.

(A) $\frac{\pi}{2}$

(B) $\frac{\pi}{6}$

(C) $\tan^{-1} 3$

(D) $\cos^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$

ઉકેલ : $y = [|\sin x| + |\cos x|] = 1, \forall x \in \mathbb{R}$

$$(1 \leq \sin x + \cos x \leq \sqrt{2})$$

$\therefore$ આપેલ વક્રો એકબીજાને બિંદુ $P(2, 1)$ તથા $Q(-2, 1)$ આગળ છેદશે. પ્રથમ વક્ર $y = 1$ માટે $\frac{dy}{dx} = 0 = m_1$

$$x^2 + y^2 = 5$$

$$\text{આથી } \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

$$\text{બિંદુ } P(2, 1) \text{ માટે } \left(\frac{dy}{dx}\right)_{(2,1)} = -2 = m_2$$

ધારો કે θ એ બે વક્રો વચ્ચેના P આગળના ખૂણાનું માપ છે.

$$\therefore \tan \theta = \left| \frac{0 + 2}{1 + 0} \right|$$

$$\therefore \theta = \tan^{-1} 2 = \cos^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{5}} \right)$$

બિંદુ Q આગળ પણ $\theta = \cos^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{5}} \right)$ થશે.

જવાબ : (D)

(146) જો $a, b > 0$ તો $y = \frac{b^2}{a-x} + \frac{a^2}{x}$, $0 < x < a$ નું ન્યૂનતમ મૂલ્ય થાય.

(A) $\frac{a+b}{a}$

(B) $\frac{ab}{a+b}$

(C) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$

(D) $\frac{(a+b)^2}{a}$

ઉકેલ : $y = \frac{b^2}{a-x} + \frac{a^2}{x}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-b^2}{(a-x)^2} (-1) - \frac{a^2}{x^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow bx = \pm a(x-a) = \pm (ax-a^2)$$

$$\therefore x = \frac{a^2}{a \pm b}$$

$$0 < x < a \text{ હોવાથી, } x = \frac{a^2}{a+b} \text{ અને } a-x = \frac{ab}{a+b}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2a^2}{x^3} + \frac{2b^2}{(a-x)^3}. \text{ આથી } \left(\frac{d^2y}{dx^2} \right)_{x=\frac{a^2}{a+b}} > 0$$

$$\therefore x = \frac{a^2}{a+b} \text{ આગળ } y \text{ નું મૂલ્ય ન્યૂનતમ થાય.}$$

$$y \text{ નું ન્યૂનતમ મૂલ્ય} = \frac{b^2(a+b)}{ab} + \frac{a^2(a+b)}{a^2} = (a+b) \left[\frac{b}{a} + 1 \right] = \frac{(a+b)^2}{a}$$

જવાબ : (D)

(147) જો α, β અને γ એ સમીકરણ $x^3 + x^2 - 5x - 1 = 0$ ની બીજ હોય, તો $[\alpha] + [\beta] + [\gamma] = \dots$

(A) 2

(B) -3

(C) 4

(D) 5

ઉકેલ : ધારો કે $f(x) = x^3 + x^2 - 5x - 1$


$$f'(x) = 3x^2 + 2x - 5 = (x-1)(3x+5)$$

$$\text{જો } x \in (-\infty, -\frac{5}{3}) \cup (1, \infty) \text{ તો } f'(x) > 0$$

$$\text{અને જો } x \in (-\frac{5}{3}, 1), \text{ તો } f'(x) < 0$$

$$\therefore f \text{ એ } (-\infty, -\frac{5}{3}) \text{ માં વધતું વિધેય છે, } (-\frac{5}{3}, 1) \text{ માં ઘટતું તથા } (1, \infty) \text{ માં વધતું વિધેય છે.}$$

$$\text{વળી, } f\left(-\frac{5}{3}\right) = \frac{128}{27}, f(1) = -4 \text{ અને } f(0) = -1 \text{ કાચો આલેખ નીચે મુજબ થશે.}$$



આકૃતિ 15.5

$$f(0) = -1 < 0, f(1) = -4 < 0, f(2) = 1 > 0$$

∴ એક બીજ (1, 2)માં આવેલ છે. આથી $[\alpha] = 1$

$$f(-1) = 4 > 0$$

∴ એક બીજ (-1, 0)માં આવેલ છે. આથી $[\beta] = -1$

$$f(-2) = 5 > 0$$

$$f(-3) = -4 < 0$$

∴ એક બીજ (-3, -2)માં આવેલ છે. આથી $[\gamma] = -3$

$$\therefore [\alpha] + [\beta] + [\gamma] = -3$$

જવાબ : (B)

(148) વક્ર $x = a\sqrt{\cos 2\theta} \cos \theta$, $y = a\sqrt{\cos 2\theta} \sin \theta$ નો $\theta = \frac{\pi}{6}$ આગળનો સ્પર્શક

(A) X - અક્ષને સમાંતર છે.

(B) Y - અક્ષને સમાંતર છે.

(C) રેખા $y = x$ ને સમાંતર છે.

(D) રેખા $x + y = 1$ ને સમાંતર છે.

$$\text{ઉકેલ : } \frac{dx}{d\theta} = -a\sqrt{\cos 2\theta} \sin \theta + \left(\frac{-a \cos \theta \sin 2\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}} \right)$$

$$= -a \frac{(\cos 2\theta \sin \theta + \cos \theta \sin 2\theta)}{\sqrt{\cos 2\theta}} = \frac{-a \sin 3\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}}$$

$$\frac{dy}{d\theta} = a\sqrt{\cos 2\theta} \cos \theta \left(\frac{-a \sin \theta \sin 2\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}} \right) = \frac{a \cos 3\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}}$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = -\cot 3\theta \quad \text{આથી} \left(\frac{dy}{dx} \right)_{\theta=\frac{\pi}{6}} = 0$$

સ્પર્શક X-અક્ષને સમાંતર છે અથવા, X-અક્ષ છે.

જવાબ : (A)

(149) જો $f(x) = \frac{x}{\sin x}$ અને $g(x) = \frac{x}{\tan x}$, $0 < x < 1$, તો આ અંતરાલમાં

(A) $f(x)$ અને $g(x)$ બંને વધતી વિધેય છે.

(B) $f(x)$ અને $g(x)$ બંને ઘટતી વિધેય છે.

(C) $f(x)$ વધતું વિધેય છે અને $g(x)$ ઘટતું વિધેય છે.

(D) $g(x)$ વધતું વિધેય છે અને $f(x)$ ઘટતું વિધેય છે.

$$\text{ઉકેલ : } f'(x) = \frac{\sin x - x \cos x}{\sin^2 x}, \quad g'(x) = \frac{\tan x - x \sec^2 x}{\tan^2 x}$$

$$\text{ધારો કે } u(x) = \sin x - x \cos x$$

$$\therefore u'(x) = x \sin x > 0$$

$$(0 < x < 1)$$

∴ u એ $(0, 1)$ પર વધતું વિધેય છે. વળી, $u(0) = 0$

∴ $u(x) > u(0)$. આથી $u(x) > 0$. આથી $\sin x > x \cos x$

∴ $f'(x) > 0$ ($0 < x < 1$)

∴ f એ $(0, 1)$ પર વધતું વિધેય છે.

ધારો કે, $v(x) = \tan x - x \sec^2 x$

∴ $v'(x) = -2x \sec^2 x \tan x < 0$

∴ $v(x) < v(0) = 0$

∴ $g'(x) < 0$ ($0 < x < 1$)

∴ g એ $(0, 1)$ પર ઘટતું વિધેય છે.

જવાબ : (C)

(150) વિધેય $g(x) = \tan x \cdot e^x e^{x^2} \frac{\log(\pi + x)}{\log(e + x)}$ ($x \geq 0$) એ, $x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$

(A) $[0, \infty)$ પર વધતું વિધેય છે.

(B) $[0, \infty)$ પર ઘટતું વિધેય છે.

(C) $\left[0, \frac{\pi}{e}\right]$ પર વધતું તથા $\left[\frac{\pi}{e}, \infty\right)$ પર ઘટતું વિધેય છે.

(D) $\left[0, \frac{\pi}{e}\right]$ પર ઘટતું તથા $\left[\frac{\pi}{e}, \infty\right)$ પર વધતું વિધેય છે.

ઉકેલ : $\tan x, e^x, e^{x^2}$ એ $[0, \infty)$ પર વધતી વિધેય છે. (વિધેય $\tan$ તેના પ્રદેશમાં)

ધારો કે $f(x) = \frac{\log(\pi + x)}{\log(e + x)}$

$$f'(x) = \frac{\log(e + x)(e + x) - (\pi + x) \log(\pi + x)}{(\pi + x)(e + x)(\log(e + x))^2}$$

$\log$ વિધેય એ વધતું વિધેય છે.

∴ $e < \pi \Rightarrow \log(e + x) < \log(\pi + x)$

∴ $(e + x) \log(e + x) < (e + x) \log(\pi + x) < (\pi + x) \log(\pi + x)$, $\forall x \geq 0$

∴ $f'(x) < 0$, $\forall x \geq 0$

∴ f એ $[0, \infty)$ પર ઘટતું વિધેય છે.

∴ g એ $[0, \infty)$ પર ઘટતું વિધેય છે.

જવાબ : (B)

(151) નીચેનામાંથી કયા અંતરાલમાં a ની કિંમત આવે તો

$f(x) = \sin x - a \sin 2x - \frac{1}{3} \sin 3x + 2ax$ એ $\mathbb{R}$ પર વધતું વિધેય થાય?

(A) $[0, \infty)$

(B) $(0, \infty)$

(C) $\left[\frac{1}{2}, \infty\right)$

(D) $[1, \infty)$

$$\begin{aligned} \text{ઉકેલ : } f'(x) &= \cos x - 2a \cos 2x - \cos 3x + 2a \\ &= \cos x - 2a(2\cos^2 x - 1) - (4\cos^3 x - 3\cos x) + 2a \\ &= 4a + 4\cos x - 4a\cos^2 x - 4\cos^3 x \\ &= 4a\sin^2 x + 4\cos x \sin^2 x \\ &= 4\sin^2 x (a + \cos x) \end{aligned}$$

$-1 \leq \cos x \leq 1 \Rightarrow a - 1 \leq a + \cos x \leq a + 1$. જો $a \geq 1$ હોય તો, $f'(x) \geq 0$ થાય.

∴ જો f એ $\mathbb{R}$ પર વધતું વિધેય હોય, તે માટે $a \in [1, \infty)$ પર્યાપ્ત છે.

જવાબ : (D)

- (152) વક્ર $4x^2 + a^2y^2 = 4a^2$, $4 < a^2 < 8$ પરનું બિંદુ એ $(0, -2)$ થી સૌથી દૂરનું બિંદુ છે.
 (A) $(0, 1)$ (B) $(0, -1)$ (C) $(0, 2)$ (D) $(0, -2)$

ઉકેલ : આપેલ વક્ર $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{4} = 1$ પરના બિંદુનું પ્રચલ સ્વરૂપ $P(a\cos\theta, 2\sin\theta)$ છે. બિંદુ $(0, -2)$ થી P ના અંતરનો વર્ગ

$$r^2 = (a\cos\theta - 0)^2 + (2\sin\theta + 2)^2 = a^2\cos^2\theta + 4(1 + \sin\theta)^2$$

$$\begin{aligned}\frac{d(r)^2}{d\theta} &= -2a^2\sin\theta\cos\theta + 8(1 + \sin\theta)\cos\theta \\ &= \cos\theta\{(8 - 2a^2)\sin\theta + 8\}\end{aligned}$$

$$\frac{d(r)^2}{d\theta} = 0 \Rightarrow \cos\theta = 0 \text{ અથવા } \sin\theta = \frac{4}{a^2 - 4}$$

$4 < a^2 < 8$ હોવાથી, $\frac{4}{a^2 - 4} > 1$. આથી $\sin\theta > 1$ જે શક્ય નથી.

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{વળી, } \left[\frac{d}{d\theta^2} r^2 \right]_{\theta=\frac{\pi}{2}} = (4 - a^2)2\cos 2\theta - 8\sin\theta = 2a^2 - 8 - 8 < 0$$

$\therefore \theta = \frac{\pi}{2}$ માટે r^2 નું મહત્તમ મૂલ્ય મળે.

$\therefore$ માંગેલ બિંદુ $(0, 2)$ છે.

જવાબ : (C)

- (153) O કેન્દ્રવાળો ઉપવલય છે. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ પર P કોઈ એક બિંદુ છે. કેન્દ્ર O માંથી દોરેલ P પરના સ્પર્શક પર

દોરેલ લંબનો લંબપાદ N છે. ધારો કે $A_{\max}$ એ ΔOPN નું મહત્તમ ક્ષેત્રફળ છે. $\frac{a^2 - b^2}{A_{\max}}$ ની કિંમત

- (A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 8

ઉકેલ : બિંદુ P ના યામ $(a\cos\theta, b\sin\theta)$ લો.

$$\therefore \left(\frac{dy}{dx} \right)_P = \frac{b\cos\theta}{-a\sin\theta} = \frac{-b}{a} \cot\theta$$

P બિંદુએ સ્પર્શકનું સમીકરણ

$$bx\cos\theta + ay\sin\theta = ab$$


$$ON = \frac{ab}{\sqrt{a^2\sin^2\theta + b^2\cos^2\theta}}$$

કાટકોણ ΔONP માં

$$PN^2 = OP^2 - ON^2$$

$$= a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta - \frac{a^2b^2}{a^2\sin^2\theta + b^2\cos^2\theta}$$

$$= \frac{a^4\sin^2\theta\cos^2\theta + b^4\sin^2\theta\cos^2\theta + a^2b^2(\sin^4\theta + \cos^4\theta) - a^2b^2(\sin^2\theta + \cos^2\theta)^2}{a^2\sin^2\theta + b^2\cos^2\theta}$$



આકૃતિ 15.6

$$= \frac{(a^2 - b^2)^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta}{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta}$$

$$\therefore \text{PN} = \frac{(a^2 - b^2) \sin \theta \cos \theta}{\sqrt{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta}}$$

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \text{PN} \times \text{ON} = \frac{ab(a^2 - b^2) \sin \theta \cos \theta}{2(a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta)} \\ &= \frac{ab(a^2 - b^2)}{2(a^2 \tan \theta + b^2 \cot \theta)} \end{aligned} \quad (1)$$

A ને મહત્તમ થવા માટે, $f(\theta) = a^2 \tan \theta + b^2 \cot \theta$ ન્યૂનતમ થાય.

$$\frac{d(f(\theta))}{d\theta} = a^2 \sec^2 \theta - b^2 \operatorname{cosec}^2 \theta, \quad f''(\theta) = 2a^2 \sec^2 \theta \tan \theta + 2b^2 \operatorname{cosec}^2 \theta \cot \theta$$

$$\frac{d(f(\theta))}{d\theta} = 0 \Rightarrow \tan \theta = \pm \frac{b}{a}$$

$$\left. \frac{d^2(f(\theta))}{d\theta^2} \right|_{\tan \theta = \frac{b}{a}} > 0$$

$\therefore f(\theta)$ એ $\tan \theta = \frac{b}{a}$ હોય ત્યારે ન્યૂનતમ થાય. આથી ન્યૂનતમ $f(\theta) = a^2 \frac{b}{a} + b^2 \frac{a}{b} = 2ab$

$$\therefore A_{\max} = \frac{ab(a^2 - b^2)}{2 \cdot 2ab} = \frac{a^2 - b^2}{4}$$

$$\therefore \frac{a^2 - b^2}{A_{\max}} = 4$$

જવાબ : (C)

$$(154) \quad f'(x) = \begin{cases} xe^{ax}, & x \leq 0 \\ x + ax^2 - x^3, & x > 0 \end{cases}$$

જ્યાં $a > 0$. જે અંતરાલમાં $f'(x)$ ચુસ્ત વધતું વિધેય હોય તેની લંબાઈ $L(a)$ છે. $\frac{1}{L(3)} = \dots$

(A) 3

(B) 6

(C) 9

(D) 12

$$\text{ઉકેલ : } f'(x) = \begin{cases} (1 + ax)e^{ax}, & x < 0 \\ 1 + 2ax - 3x^2, & x > 0 \end{cases}$$

$$f''(x) = \begin{cases} (2 + ax)a e^{ax}, & x < 0 \\ 2a - 6x, & x > 0 \end{cases}$$

જો $f'(x)$ એ ચુસ્ત વધતું વિધેય હોય, તો $f''(x) > 0$

$$\therefore 2 + ax > 0 \quad (x < 0) \quad \text{અને} \quad 2a - 6x > 0 \quad (x > 0)$$

$$\therefore x > \frac{-2}{a} \quad (x < 0) \text{ અને } x < \frac{a}{3} \quad (x > 0)$$

$$\therefore \frac{-2}{a} < x < \frac{a}{3}$$

$$\therefore L(a) = \frac{a}{3} + \frac{2}{a}. \text{ આથી } L'(a) = \frac{1}{3} - \frac{2}{a^2}$$

$$\therefore L'(3) = \frac{1}{9}. \text{ આથી } \frac{1}{L'(3)} = 9$$

જવાબ : (C)

(155) વિધેય $2\tan^3x - 3\tan^2x + 12\tan x + 3$ એ

(A) વધતું વિધેય છે.

(B) ઘટતું વિધેય છે.

(C) $(0, \frac{\pi}{4})$ માં વધતું તથા $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ માં ઘટતું વિધેય છે.

(D) $(0, \frac{\pi}{4})$ માં ઘટતું તથા $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ માં વધતું વિધેય છે.

ઉકેલ : ધારો કે $f(x) = 2\tan^3x - 3\tan^2x + 12\tan x + 3$
 $f'(x) = (6\tan^2x - 6\tan x + 12) \sec^2x$

$$= 6\sec^2x (\tan^2x - \tan x + 2) = 6\sec^2x \left[\left(\tan x - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{7}{4} \right] > 0$$

$\therefore f(x)$ એ વધતું વિધેય છે.

જવાબ : (A)

(156) વિધેય $f(x) = \sum_{k=1}^{2015} (x-k)^2$ ને x ની કઈ કિંમત માટે ન્યૂનતમ મળે?

(A) 0

(B) 1008

(C) 1000

(D) 2015

ઉકેલ : $f'(x) = \sum_{k=1}^{2015} 2(x-k) = 2[(x-1) + (x-2) + \dots + (x-2015)]$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 2015x - \frac{(2015)(2016)}{2} = 0$$

$$x = 1008. \text{ વળી } f''(x) = 4030 > 0$$

$\therefore x = 1008$ માટે f ને ન્યૂનતમ કિંમત મળે.

જવાબ : (B)

(157) a કયા ગણનો સભ્ય હોય તો વિધેય

$$f(x) = \left(\frac{\sqrt{a+4}}{1-a} - 1 \right) x^5 - 3x + \log 5 \text{ એ } \mathbb{R} \text{ પર ઘટતું વિધેય થશે?}$$

$$(A) \left(-3, \frac{5-\sqrt{27}}{2} \right) \cup (2, \infty)$$

$$(B) \left[-4, \frac{3-\sqrt{21}}{2} \right] \cup (1, \infty)$$

$$(C) (-\infty, \infty)$$

$$(D) (1, \infty)$$

ઉકેલ : $f'(x) = \left(\frac{\sqrt{a+4}}{1-a} - 1 \right) 5x^4 - 3$

$f(x)$ એ $\mathbb{R}$ પર ઘટતું થવા માટે, તો $f'(x) < 0, \forall x$

$$\therefore \left(\frac{\sqrt{a+4}}{1-a} - 1 \right) x^4 < \frac{3}{5}, \forall x$$

(1)

જો $\frac{\sqrt{a+4}}{1-a} - 1 \leq 0$ હોય, તો જ અસમતા (1) શક્ય બને.

$\therefore a > 1$ માટે તો આ અસમતા સત્ય છે જ.

$$\therefore a \in (1, \infty)$$

વળી, $\sqrt{a+4}$ વાસ્તવિક સંખ્યા થવા માટે $a \geq -4$ (આપણે ફક્ત $a < 1$ વિશે વિચાર કરીશું.)

$$\therefore \frac{\sqrt{a+4}}{1-a} \leq 1. \quad \text{આથી } \sqrt{a+4} \leq 1-a$$

$$\therefore a+4 \leq 1+a^2-2a$$

$$\therefore 0 \leq a^2-3a-3. \quad \text{આથી } a \leq \frac{3-\sqrt{21}}{2}$$

$$\therefore a \in \left[-4, \frac{3-\sqrt{21}}{2}\right] \cup (1, \infty)$$

જવાબ : (B)

(158) વક્ર $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 4$, $0 \leq x \leq 5$ ની સ્પર્શકના મહત્તમ ઢાળનું મૂલ્ય છે.

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 24

ઉકેલ : $m = \frac{dy}{dx} = 3x^2 - 12x + 9$

m ની આત્યંતિક મૂલ્ય માટે $\frac{dm}{dx} = 0$

$$\therefore 6x - 12 = 0 \quad \text{આથી } x = 2. \quad \left[\frac{d^2m}{dx^2}\right]_{x=2} = 6 \quad \text{આથી } x = 2 \text{ માટે ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળે.}$$

હવે, $m(0) = 9$, $m(2) = -3$ અને $m(5) = 24$

$\therefore m$ નું વૈશ્વિક મહત્તમ મૂલ્ય 24 છે.

જવાબ : (D)

(159) ધારો કે f એ $\mathbb{R}$ પર વિકલનીય વિધેય છે અને $h(x) = f(x) - (f(x))^2 + (f(x))^3$, $x \in \mathbb{R}$ તો,

(A) જો f ઘટતું વિધેય હોય, તો h વધતું વિધેય છે.

(B) જો f વધતું વિધેય હોય, તો h ઘટતું વિધેય છે.

(C) જો f વધતું કે ઘટતું વિધેય હોય, તો અનુક્રમે h પણ વધતું કે ઘટતું વિધેય થાય.

(D) h વિશે કઈ કહી શકાય નહિ.

ઉકેલ : $h'(x) = f'(x) - 2f(x)f'(x) + 3(f(x))^2f'(x)$
 $= f'(x) [1 - 2f(x) + 3(f(x))^2]$

$$= 3f'(x) \left[\left(f(x) - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{2}{9} \right]$$

જો $f'(x) \geq 0$ હોય તો $h'(x) \geq 0$ થાય તથા જો $f'(x) \leq 0$ હોય તો $h'(x) \leq 0$ થાય.

$\therefore$ જો f વધતું વિધેય હોય તો h વધતું વિધેય થશે તથા જો f ઘટતું વિધેય હોય તો h ઘટતું વિધેય થશે.

જવાબ : (C)

(160) જો વક્ર $2y^3 = ax^2 + x^3$ નો બિંદુ (a, a) આગળનો સ્પર્શક અક્ષો પર α તથા β અંતઃખંડો કાપતા હોય તથા જો $\alpha^2 + \beta^2 = 61$ હોય તો $|a| = \dots\dots$

(A) 16

(B) 28

(C) 30

(D) 31

ઉકેલ : સ્પર્શકનો ઢાળ $\frac{dy}{dx} = \frac{2ax+3x^2}{6y^2}$. આથી $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{(a,a)} = \frac{5}{6}$

$\therefore (a, a)$ આગળ સ્પર્શકનું સમીકરણ

$$y - a = \frac{5}{6} (x - a).$$

$$\therefore 6y - 6a = 5x - 5a. \quad \text{અથવા } 5x - 6y = -a$$

$$X - \text{અંતઃખંડ } \alpha = -\frac{a}{5}, \quad Y - \text{અંતઃખંડ } \beta = \frac{a}{6}$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = 61. \quad \text{અથવા } \frac{a^2}{25} + \frac{a^2}{36} = 61$$

$$\therefore a^2 = 25 \times 36. \quad \text{અથવા } a = \pm 30. \quad \text{અથવા } |a| = 30$$

જવાબ : (C)

(161) વિધેય $f(x) = \cos x + \frac{1}{2} \cos 2x - \frac{1}{3} \cos 3x$ ની મહત્તમ તથા ન્યૂનતમ મૂલ્યો વચ્ચેનો તફાવત છે.

$$(A) \frac{3}{8}$$

$$(B) \frac{2}{3}$$

$$(C) \frac{8}{7}$$

$$(D) \frac{9}{4}$$

ઉકેલ : આપેલ વિધેય $f(x)$ નું મુખ્ય આવર્તમાન 2π હોવાથી આપણે માંગેલ તફાવત $[0, 2\pi]$ માં શોધીશું.

$$f'(x) = -(\sin x + \sin 2x - \sin 3x)$$

$$= -\sin x + \sin 3x - \sin 2x$$

$$= -2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} + 2 \cos \frac{5x}{2} \sin \frac{x}{2}$$

$$= 2 \sin \frac{x}{2} \left(\cos \frac{5x}{2} - \cos \frac{x}{2} \right)$$

$$= -4 \sin x \sin \frac{3x}{2} \sin \frac{x}{2}$$

$$\therefore x = 0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \pi \text{ અને } 2\pi \text{ એ વિવેચક બિંદુ છે.}$$

$$\text{વળી, } f(0) = \frac{7}{6}, f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{-13}{12}, f(\pi) = \frac{-1}{6}, f(2\pi) = \frac{7}{6}, f\left(\frac{4\pi}{3}\right) = \frac{-7}{\sqrt{2}}.$$

$$\therefore \text{માંગેલ તફાવત} = \frac{7}{6} - \left(\frac{-13}{12}\right) = \frac{9}{4}$$

જવાબ : (D)

$$(162) \quad g(x) = \frac{1}{\log(1+x)} - \frac{1}{x}, \quad x > 0 \text{ તો,}$$

$$(A) 1 < g(x) < 2$$

$$(B) -1 < g(x) < 0$$

$$(C) 0 < g(x) < 1$$

$$(D) -\infty < g(x) < 0$$

ઉકેલ : $x > 0$ માટે $f(x) = \log(1+x)$ લો.

$[0, x]$ અંતરાલ પર મધ્યકમાન પ્રમેયનો ઉપયોગ કરતાં, $c \in (0, x)$ એવો મળે કે જેથી

$$\frac{\log(1+x) - \log(1+0)}{x-0} = f'(c) = \frac{1}{1+c}$$

$$\therefore \frac{\log(1+x)}{x} = \frac{1}{1+c} < 1$$

$$\log(1+x) < x. \quad \text{અથવા } \frac{1}{\log(1+x)} - \frac{1}{x} > 0. \quad \text{અથવા } g(x) > 0$$

$$\text{વળી, } c \in (0, x). \quad \text{અથવા } c < x$$

$$\therefore \frac{1}{1+c} > \frac{1}{1+x}. \quad \text{અથવા } \frac{\log(1+x)}{x} > \frac{1}{1+x}$$

$$\therefore \log(1+x) > \frac{x}{1+x}$$

$$\therefore \frac{1}{\log(1+x)} < \frac{1+x}{x}. \quad \text{આથી } g(x) < 1$$

જવાબ : (C)

(163) વક્ર $y^2 = x(2-x)^2$ ની બિંદુ (1, 1) આગળનો સ્પર્શક જો વક્રને ફરીથી બિંદુ P માં મળે તો P એ

- (A) (4, 4) (B) (-1, 2) (C) $\left(\frac{9}{4}, \frac{3}{8}\right)$ (D) (-1, -1)

ઉકેલ : $y^2 = x(2-x)^2$

$$\therefore 2y \frac{dy}{dx} = (2-x)^2 + x \cdot 2(2-x)(-1) = 3x^2 - 8x + 4$$

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)_{(1,1)} = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore (1, 1) \text{ આગળ સ્પર્શકનું સમીકરણ } y - 1 = -\frac{1}{2}(x - 1)$$

$$\therefore y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$

આ સ્પર્શક રેખાનું આપેલ વક્ર સાથે છેદબિંદુ શોધીએ.

$$\left(-\frac{x}{2} + \frac{3}{2}\right)^2 = x(2-x)^2$$

$$\therefore x^2 - 6x + 9 = 16x + 4x^3 - 16x^2$$

$$\therefore 4x^3 - 17x^2 + 22x - 9 = 0. \quad \text{આથી } (x-1)(4x-9)(x-1) = 0$$

$$\therefore x = 1, \frac{9}{4}, 1. \quad \text{આથી } x = \frac{9}{4} \text{ તથા } y = \frac{3}{8}. \quad \text{આથી મળેલ બિંદુ } \left(\frac{9}{4}, \frac{3}{8}\right) \text{ છે.}$$

જવાબ : (C)

(164) h ઊંચાઈ તથા અર્ધશીર્ષકોણ α વાળા શંકુમાં અંતર્ગત મહત્તમ ઘનફળવાળા નળાકારનું ઘનફળ છે.

- (A) $4\pi h^3 \tan^2 \alpha$ (B) $\frac{4}{27} \pi h^3 \tan^2 \alpha$ (C) $\frac{1}{27} \pi h^3 \tan^2 \alpha$ (D) $\frac{4}{27} \pi h^2 \tan^2 \alpha$

ઉકેલ : નળાકારની ત્રિજ્યા x તથા શંકુનો અર્ધશીર્ષકોણ α હોય, તો $\tan \alpha = \frac{x}{VN}$

$$\therefore VN = x \cot \alpha$$

$$\therefore \text{નળાકારની ઊંચાઈ } MN = VM - VN = h - x \cot \alpha$$

$$\therefore \text{નળાકારનું ઘનફળ } f(x) = \pi x^2 (h - x \cot \alpha) \\ = \pi x^2 h - \pi x^3 \cot \alpha$$


$$\therefore f'(x) = 0 \Rightarrow 2\pi h x - 3\pi x^2 \cot \alpha = 0$$

$$\therefore x = \frac{2}{3} h \tan \alpha$$

$$f''(x) = 2\pi h - 6\pi x \cot \alpha$$

$$\therefore f''\left(\frac{2}{3} h \tan \alpha\right) = -2\pi h < 0$$

$$\therefore x = \frac{2}{3} h \tan \alpha \text{ માટે નળાકારનું ઘનફળ મહત્તમ છે.}$$



આકૃતિ 15.7

$$\text{મહત્તમ ઘનફળ } f(x) = \pi x^2 MN = \pi \frac{4}{9} h^2 \tan^2 \alpha \left(h - \frac{2}{3} h \right)$$

$$= \frac{4\pi}{27} h^3 \tan^2 \alpha$$

જવાબ : (B)

(165) (1, 2) માંથી પસાર થતી કઈ રેખા પ્રથમ ચરણમાં અક્ષો સાથે ન્યૂનતમ ક્ષેત્રફળવાળો ત્રિકોણ બનાવશે ?

- (A) $2x + y = 0$ (B) $2x + y = 2$ (C) $2x + y = 4$ (D) $x + 2y = 4$

ઉકેલ : ધારો કે $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ માંગેલી રેખા છે.

$$\therefore \text{ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ } A = \frac{1}{2} ab$$

રેખા (1, 2)માંથી પસાર થાય છે. આથી $\frac{1}{a} + \frac{2}{b} = 1$. આથી $b = \frac{2a}{a-1}$

$$\therefore A = \frac{a^2}{a-1} = \frac{a^2 - 1 + 1}{a-1} = a + 1 + \frac{1}{a-1}$$

$$\therefore \frac{dA}{da} = 1 - \frac{1}{(a-1)^2} = 0 \Rightarrow a = 2 \quad (a \neq 0)$$

$a = 0$ શક્ય નથી. આથી $a = 2$

$$\text{વળી, } \frac{d^2A}{da^2} = \frac{2}{(a-1)^3}. \quad \text{આથી } \left(\frac{d^2A}{da^2} \right)_{a=2} = 2 > 0$$

$\therefore a = 2$ આગળ ક્ષેત્રફળ A ન્યૂનતમ છે.

હવે, $a = 2$ તો $b = \frac{2a}{a-1} = 4$. આથી માંગેલ રેખા $\frac{x}{2} + \frac{y}{4} = 1$ છે.

$$\therefore 2x + y = 4$$

જવાબ : (C)

નોંધ : વિકલ્પો પરથી જવાબ $2x + y = 4$ જ હોય કારણ કે (1, 2)માંથી પસાર થતી તે એક માત્ર રેખા છે.

(166) ધારો કે $P(x) = a_0 + a_1x^2 + a_2x^4 + \dots + a_nx^{2n}$ એ વાસ્તવિક સંખ્યા x માં બહુપદી છે, જ્યાં $0 < a_0 < a_1 \dots < a_n$. વિધેય $P(x)$ ને

- (A) મહત્તમ કે ન્યૂનતમ મૂલ્ય ન મળે. (B) ફક્ત એક મહત્તમ મૂલ્ય મળે.
(C) ફક્ત એક ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળે. (D) n મહત્તમ તથા n ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળે.

$$\text{ઉકેલ : } p'(x) = 2a_1x + 4a_2x^3 + \dots + 2na_nx^{2n-1}$$

મહત્તમ કે ન્યૂનતમ મૂલ્ય માટેની આવશ્યક શરત અનુસાર $P'(x) = 0$

$$\therefore 2x(a_1 + 2a_2x^2 + \dots + na_nx^{2n-2}) = 0$$

$$\therefore x = 0$$

$$(a_i > 0)$$

$$\text{વળી, } P''(x) = 2a_1 + 12a_2x^2 + \dots + 2n(2n-1)a_nx^{2n-2}$$

$$\therefore P''(0) = 2a_1 > 0$$

$\therefore P(x)$ ને $x = 0$ આગળ ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળે.

નોંધ : બધા જ વર્ગ ધન હોવાથી સ્પષ્ટ છે કે ન્યૂનતમ મૂલ્ય a_0 છે.

જવાબ : (C)

(167) વિધેય $f(x) = |3 - x| + |2 + x| + |5 - x|$ નું ન્યૂનતમ મૂલ્ય છે.

(A) 0

(B) 7

(C) 8

(D) 10

$$\text{ઉકેલ : } f(x) = \begin{cases} 6-3x, & x < -2 \\ 10-x, & -2 \leq x < 3 \\ x+4, & 3 \leq x < 5 \\ 3x-6, & x \geq 5 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} -3, & x < -2 \\ -1, & -2 < x < 3 \\ 1, & 3 < x < 5 \\ 3, & x > 5 \end{cases}$$

$\therefore f$ એ $(-\infty, 3)$ માં ઘટતું વિધેય છે જ્યારે $(3, \infty)$ માં વધતું વિધેય છે. આથી $x = 3$ આગળ વિધેય f નું ન્યૂનતમ મૂલ્ય $f(3) = 7$ છે.

જવાબ : (B)

(168) જો $y(x) = \cos(3 \cos^{-1} x)$, $x \in [-1, 1]$, $x \neq \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$ તો $\frac{1}{y(x)} \left\{ (x^2 - 1) \frac{d^2 y(x)}{dx^2} + x \frac{dy(x)}{dx} \right\} = \dots$

(A) 1

(B) 2

(C) 8

(D) 9

ઉકેલ : $y = \cos(3 \cos^{-1} x)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3 \sin(3 \cos^{-1} x)}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\therefore \sqrt{1-x^2} \frac{dy}{dx} = 3 \sin(3 \cos^{-1} x)$$

$$\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} \frac{dy}{dx} + \sqrt{1-x^2} \frac{d^2 y}{dx^2} = 3 \cos(3 \cos^{-1} x) \left(\frac{-3}{\sqrt{1-x^2}} \right)$$

$$\therefore -x \frac{dy}{dx} + (1-x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} = -9y$$

$$\therefore \frac{1}{y} \left[(x^2 - 1) \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} \right] = 9$$

જવાબ : (D)

એક કરતાં વધુ સાચા વિકલ્પવાળા પ્રશ્નો

(169) $f(x)$ એ ત્રણ ઘાતવાળું બહુપદી વિધેય છે, જ્યાં $f(0) + 2 = 0$ અને $f'''(0) = 6$. જો $f(x) = 0$ નાં ત્રણેય બીજ ધન પૂર્ણાંક હોય, તો

(A) $f'(1) = 0$

(B) $2f'(0) + f''(0) = 0$

(C) $2f'(0) + f''(0) = 2$

(D) $f'(2) = 0$

ઉકેલ : ધારો કે $f(x) = x^3 + ax^2 + bx - 2$ કારણ કે $f'''(0) = 6$, $f(0) = -2$

ધારો કે $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}$ એ $f(x) = 0$ નાં બીજ છે. આથી $\alpha\beta\gamma = -\frac{-2}{1} = 2$

$\therefore \alpha, \beta, \gamma$ માંથી ગમે તે બેની કિંમત 1 હશે, જ્યારે ત્રીજાની કિંમત 2 હશે. ધારો કે $\alpha = 1, \beta = 1, \gamma = 2$,

$$a = -(\alpha + \beta + \gamma) = -4 = \frac{f''(0)}{2}. \quad \text{આથી } f''(0) = -8$$

$$b = \alpha\beta + \beta\gamma + \alpha\gamma = 5 = f'(0). \quad \text{આથી } f'(0) = 5$$

$$\therefore f(x) = x^3 - 4x^2 + 5x - 2$$

$$\therefore 2f'(0) + f''(0) = 2$$

વળી, 1 એ $f(x) = 0$ ની બે બીજ હોવાથી, $f'(1) = 0$

જવાબ : (A), (C)

(170) જો $f(\sin x) < 0$ અને $f''(\sin x) > 0$. $\forall x \in \mathbb{R}$, તો $g(x) = f(\sin x) + f(\cos x)$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ એ

(A) $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ માં ઘટતું વિધેય છે.

(B) $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ માં વધતું વિધેય છે.

(C) વિધેય g ને $x = \frac{\pi}{4}$ આગળ સ્થાનિક ન્યૂનતમ મળે.

(D) વિધેય g ને $x = \frac{\pi}{4}$ આગળ સ્થાનિક મહત્તમ મળે.

ઉકેલ : $g'(x) = f'(\sin x) \cos x - f'(\cos x) \sin x$

$$g'(x) = 0 \Rightarrow f'(\sin x) \cos x = f'(\cos x) \sin x$$

$$\Rightarrow f'(\sin x) \cos x = f' \left(\sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \right) \cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right)$$

$$\therefore x = \frac{\pi}{2} - x \quad \left(x \in \left[0, \frac{\pi}{2} \right] \right)$$

$$\therefore x = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{હવે, } g''(x) = f''(\sin x) \cos^2 x + f''(\cos x) \sin^2 x - \{f'(\sin x) \sin x + f'(\cos x) \cos x\} \quad (1)$$

આપેલ છે કે $f'(\sin x) < 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$

$$\therefore f'(\cos x) < 0$$

(1) પરથી, $g''(x) > 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$

$\therefore$ વિધેય g ને $x = \frac{\pi}{4}$ આગળ સ્થાનિક ન્યૂનતમ મળે.

$\therefore g$ એ $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ અંતરાલમાં ઘટતું વિધેય છે તથા $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ માં વધતું વિધેય છે.

જવાબ : (A), (B), (C)

(171) a ની કઈ કિંમત માટે $f(x) = x^3 + 3(a-7)x^2 + 3(a^2-9)x - 1$ નું સ્થાનિક મહત્તમ મૂલ્ય ધન સંખ્યા માટે મળે ?

$$(A) a < -3$$

$$(B) -1 < a < 1$$

$$(C) 3 < a < 4$$

$$(D) 5 < a < 6$$

ઉકેલ : $f'(x) = 3x^2 + 6(a-7)x + 3(a^2-9)$

$f(x)$ જે બિંદુએ મહત્તમ હોય, ત્યાં $f'(x) = 0$.

$$\therefore 3x^2 + 6(a-7)x + 3(a^2-9) = 0$$

$$\therefore x^2 + 2(a-7)x + (a^2-9) = 0$$

$$\therefore x = -(a-7) \pm \sqrt{58-14a} \quad (1)$$

x ની કિંમત વાસ્તવિક છે. આથી $58-14a > 0$

$$\text{આથી } a < \frac{29}{7} \quad (2)$$

$$\text{વળી, } f''(x) = 6x + 6(a-7) = 6(x+a-7)$$

જો $x_1 = -(a-7) + \sqrt{58-14a}$ હોય, તો $f''(x) = 6\sqrt{58-14a} > 0$

જો $x_2 = -(a-7) - \sqrt{58-14a}$ હોય, તો $f''(x) = -6\sqrt{58-14a} < 0$

$\therefore x_2 = -(a-7) - \sqrt{58-14a}$ આગળ f ને સ્થાનિક મહત્તમ મૂલ્ય મળશે.

આ ધન સંખ્યા હોય, તો $-(a-7) - \sqrt{58-14a} > 0$

$\therefore 7-a > \sqrt{58-14a}$ અર્થાત્ $a^2 - 9 > 0$

$\therefore a < -3$ અથવા $a > 3$

(3)

(2) અને (3) પરથી, $a < -3$ અથવા $3 < a < \frac{29}{7}$

જવાબ : (A), (C)

(172) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-3n + (-1)^n}{4n - (-1)^n} = \dots\dots$

(A) $\frac{-3}{4}$

(B) જો n અયુગ્મ સંખ્યા હોય તો $\frac{-3}{4}$

(C) જો n યુગ્મ સંખ્યા હોય તો $\frac{-3}{4}$

(D) લક્ષ્ય અસ્તિત્વ નથી

ઉકેલ : જો $n \in \mathbb{N}$ તો

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-3n + (-1)^n}{4n - (-1)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-3 \pm \frac{1}{n}}{4 \pm \frac{1}{n}} = \frac{-3}{4}$$

જવાબ : (A), (B), (C)

(173) જો $f(x) = \begin{cases} 3x^2 + 12x - 1, & -1 \leq x < 2 \\ 37 - x, & 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$ તો

(A) f એ $(-1, 2)$ માં વધતું વિધેય છે.

(B) f એ $[-1, 3]$ પર સતત વિધેય છે.

(C) $f'(2)$ નું અસ્તિત્વ નથી

(D) f ને $x = 2$ આગળ મહત્તમ કિંમત મળે.

ઉકેલ : f એ બહુપદી વિધેય છે. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2) = 35$

$\therefore f$ એ $[-1, 3]$ થી સતત વિધેય છે.

$$f'(x) = \begin{cases} 6x + 12, & -1 < x < 2 \\ -1, & 2 < x < 3 \end{cases}$$

$f'(2^-) = 24, f'(2^+) = -1$. અર્થાત્ $f'(2)$ નું અસ્તિત્વ નથી.

$$f'(x) = 6x + 12 = 6(x + 2) > 0 \quad (-1 < x < 2)$$

$\therefore f$ એ $(-1, 2)$ માં વધતું વિધેય છે.

વળી, f એ $(2, 3)$ માં ઘટતું વિધેય છે.

$\therefore f$ ને $x = 2$ આગળ મહત્તમ કિંમત મળે.

જવાબ : (A), (B), (C), (D)

(174) $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{\cos \pi x - x^{2n} \sin(x-1)}{1 + x^{2n+1} - x^{2n}} \right\}$

(A) f એ $x = 1$ આગળ સતત છે.

(B) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$

$$(C) \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -1 \quad (D) f(x) = \begin{cases} \cos \pi x & 0 < x < 1 \\ -1, & x = 1 \\ \frac{\sin(x-1)}{1-x}, & x > 1 \end{cases}$$

ઉકેલ : $0 < x < 1$ માટે,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{\cos \pi x - x^{2n} \sin(x-1)}{1 + x^{2n+1} - x^{2n}} \right\} = \cos \pi x \quad \left(\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0 \right)$$

$$x = 1 \text{ માટે, } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{\cos \pi - \sin(1-1)}{1 + 1 - 1} \right\} = \cos \pi = -1$$

$$x > 1 \text{ માટે, } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{\cos \pi x - x^{2n} \sin(x-1)}{1 + x^{2n+1} - x^{2n}} \right\}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{\frac{\cos \pi x}{x^{2n+1}} - \frac{1}{x} \sin(x-1)}{\frac{1}{x^{2n+1}} + 1 - \frac{1}{x}} \right\} = \frac{\sin(x-1)}{(1-x)}$$

$$f(x) = \begin{cases} \cos \pi x & 0 < x < 1 \\ -1, & x = 1 \\ \frac{\sin(x-1)}{1-x}, & x > 1 \end{cases}$$

હવે, $\lim_{x \rightarrow 1^-} \cos \pi x = -1$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sin(x-1)}{(x-1)} = -1$$

અને $f(1) = -1$. અર્થાત્ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$

$\therefore f$ એ $x = 1$ આગળ સતત છે.

જવાબ : (A), (C), (D)

(175) જો $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ એ એવું બહુપદી વિધેય હોય, જ્યાં $f(2x) = f'(x)f''(x)$ તો (ધાત $n > 2$)

(A) $f(3) = 12$

(B) f એક-એક છે પરંતુ વ્યાપ્ત નથી.

(C) $f(x) = x$ ને ત્રણ ભિન્ન વાસ્તવિક ઉકેલ મળે.

(D) f એક-એક અને વ્યાપ્ત છે.

ઉકેલ : ધારો કે, $f(x)$ એ n ધાતવાળું બહુપદી વિધેય છે. $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + 1$

$\therefore f'$ એ $n-1$ અને f'' એ $n-2$ ધાતવાળું બહુપદી વિધેય થશે.

$$f(2x) = f'(x)f''(x) \text{ હોવાથી, } n = n-1 + n-2. \quad \text{અર્થાત્ } n = 3$$

$\therefore f$ એ ત્રિઘાત બહુપદી વિધેય થશે.

$$\text{ધારો કે } f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

$$f(2x) = f'(x)f''(x) \text{ પરથી, } 8ax^3 + 4bx^2 + 2cx + d = (3ax^2 + 2bx + c)(6ax + 2b)$$

$$\therefore 8ax^3 + 4bx^2 + 2cx + d = 18a^2x^3 + 18abx^2 + (4b^2 + 6ac)x + 2bc$$

$$\therefore 8a = 18a^2, \quad 4b = 18ab, \quad 2c = 4b^2 + 6ac, \quad d = 2bc$$

$$\therefore a = \frac{4}{9}, b = 0, c = 0, d = 0$$

$$\therefore f(x) = \frac{4}{9}x^3$$

$$\therefore f(3) = 12, f \text{ એક-એક અને વાળ છે.}$$

$$\text{તથા } f(x) = x \quad \text{હોય તો } \frac{4}{9}x^3 = x$$

$$\therefore x = 0, \pm \frac{3}{2}$$

$f(x) = x$ ને ત્રણ ભિન્ન વાસ્તવિક ઉકેલ મળે.

જવાબ : (A), (C), (D)

$$(176) \quad \text{જો } P = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{y} \int_0^{\pi} \tan(y \sin x) dx \text{ અને } Q = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n e^{\frac{x}{3}} dx, \text{ તો}$$

$$(A) 3Q = 4P$$

$$(B) 3P = 4Q$$

$$(C) P + 2Q = 5$$

$$(D) 2(P + Q) = 7$$

$$\text{ઉકેલ : } P = \lim_{y \rightarrow 0} \int_0^{\pi} \sin x \frac{\tan(y \sin x)}{y \sin x} dx = \int_0^{\pi} \sin x dx = 2$$

$$Q = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n e^{\frac{x}{3}} dx$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n e^{n \left[1 - \frac{x}{n} - 1\right]} e^{\frac{x}{3}} dx$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n e^{-x} e^{\frac{x}{3}} dx$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n e^{-\frac{2}{3}x} dx$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{e^{-\frac{2}{3}x}}{-\frac{2}{3}} \right]_0^n = \frac{-3}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[e^{-\frac{2}{3}n} - 1 \right] = \frac{3}{2}$$

$$\therefore P = 2, Q = \frac{3}{2}$$

$$\therefore 3P = 4Q, P + 2Q = 5, 2(P + Q) = 7$$

જવાબ : (B), (C), (D)

$$(177) \quad \text{જો વક્ર } ax^2 + by^2 = 1 \text{ અને } a'x^2 + b'y^2 = 1 \text{ લંબચ્છેદી હોય તો}$$

$$(A) \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{a'} + \frac{1}{b'}, \quad (B) \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{a'} - \frac{1}{b'}, \quad (C) \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{a'} + \frac{1}{b'}, \quad (D) \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{a'} - \frac{1}{b'}$$

$$\text{ઉકેલ : } ax^2 + by^2 = 1$$

$$x \text{ પ્રત્યે વિકલન કરતાં, } 2ax + 2by \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\therefore m_1 = \frac{dy}{dx} = \frac{-ax}{by}$$

$$\text{તે જ રીતે વક્ર } a'x^2 + b'y^2 = 1 \text{ માટે, } m_2 = \frac{-a'x}{b'y}$$

જો આપેલ વક્રો લંબસ્થિતિ હોય તો $m_1 m_2 = -1$.

$$\therefore \left(\frac{-ax}{by} \right) \left(\frac{-a'x}{b'y} \right) = -1$$

$$\therefore aa'x^2 + bb'y^2 = 0$$

$$\text{હવે, } ax^2 + by^2 = 1$$

$$a'x^2 + b'y^2 = 1$$

$$\therefore \frac{x^2}{b'-b} = -\frac{y^2}{a'-a} = \frac{1}{ab'-a'b}$$

$$aa' \frac{(b'-b)}{ab'-a'b} + bb' \frac{(a-a')}{ab'-a'b} = 0$$

$$\therefore \frac{b'-b}{bb'} + \frac{a-a'}{aa'} = 0 \quad (ab' \neq a'b)$$

$$\therefore \frac{1}{b} - \frac{1}{b'} + \frac{1}{a'} - \frac{1}{a} = 0$$

$$\therefore \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{a'} - \frac{1}{b'}$$

$$\text{બીજી રીત : } (a-a')x^2 + (b-b')y^2 = 0 \text{ તથા } aa'x^2 + bb'y^2 = 0$$

$$\therefore -\frac{y^2}{x^2} = \frac{a-a'}{b-b'} = \frac{aa'}{bb'}$$

$$\therefore \frac{a-a'}{aa'} = \frac{b-b'}{bb'}$$

$$\therefore \frac{1}{a'} - \frac{1}{a} = \frac{1}{b'} - \frac{1}{b}$$

$$\therefore \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{a'} - \frac{1}{b'}$$

જવાબ : (D)

$$(178) \quad \text{ધારો કે } f(x) = \begin{cases} e^x, & 0 < x \leq 1 \\ 2 - e^{x-1}, & 1 < x \leq 2 \\ x - e, & 2 < x \leq 3 \end{cases} \text{ અને } g(x) = \int_0^x f(t) dt \text{ તો,}$$

(A) $x = e$ આગળ g ને સ્થાનીય ન્યૂનતમ તથા $x = 1 + \log 2$ આગળ g ને સ્થાનીય મહત્તમ મૂલ્ય મળે છે.

(B) $x = 1$ આગળ g ને સ્થાનીય મહત્તમ તથા $x = 2$ આગળ g ને સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળે છે.

(C) g ને મહત્તમ મૂલ્ય ન મળે.

(D) g ને ન્યૂનતમ મૂલ્ય ન મળે.

$$\text{ઉકેલ : } g'(x) = \begin{cases} e^x, & 0 < x \leq 1 \\ 2 - e^{x-1}, & 1 < x \leq 2 \\ x - e, & 2 < x \leq 3 \end{cases}$$

મહત્તમ કે ન્યૂનતમ મૂલ્ય માટે $g'(x) = 0$.

$0 < x < 1$ માટે $e^x > 0$ છે, તથા $2 - e^{x-1} = 0 \quad 1 < x < 2$

$$\therefore x = 1 + \log 2$$

$$\text{તથા } 2 < x < 3 \quad \text{માટે} \quad x = e$$

$$\text{હવે } g''(x) = \begin{cases} -e^{x-1}, & 1 < x < 2 \\ 1, & 2 < x < 3 \end{cases}$$

$$\therefore g''(1 + \log 2) = -e^{\log 2} = -2 < 0$$

$$\therefore g''(e) = 1 > 0$$

$\therefore x = e$ આગળ g ને સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળે તથા $x = 1 + \log 2$ આગળ g ને સ્થાનીય મહત્તમ મૂલ્ય મળે.

જવાબ : (A)

$$(179) \quad \text{જો વક્ર } \left(\frac{x}{a}\right)^n + \left(\frac{y}{b}\right)^n = 2 \text{ એ રેખા } \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 2 \text{ ને સ્પર્શે તો } n = \dots\dots$$

(A) માત્ર 2

(B) માત્ર 3

(C) માત્ર 4

(D) કોઈપણ શૂન્યેતર વાસ્તવિક સંખ્યા

$$\text{ઉકેલ : } \left(\frac{x}{a}\right)^n + \left(\frac{y}{b}\right)^n = 2$$

(a, b) વક્ર પર છે તે સ્પષ્ટ છે.

x પ્રત્યે વિકલન કરતાં,

$$\frac{n}{a} \left(\frac{x}{a}\right)^{n-1} + \frac{n}{b} \left(\frac{y}{b}\right)^{n-1} \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{-\frac{n}{a} \left(\frac{x}{a}\right)^{n-1}}{\frac{n}{b} \left(\frac{y}{b}\right)^{n-1}}. \quad \text{અર્થાત્ } \left(\frac{dy}{dx}\right)_{(a,b)} = -\frac{b}{a}$$

$$\therefore \text{સ્પર્શકનું સમીકરણ, } y - b = -\frac{b}{a} (x - a)$$

$$\therefore ay - ab = -bx + ab$$

$$\therefore bx + ay = 2ab \quad \text{એટલે કે } \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 2$$

$$n \in \mathbb{R} - \{0\} \text{ માટે આપેલ વક્ર એ રેખા } \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 2 \text{ ને સ્પર્શે.}$$

જવાબ : (D)

$$(180) \quad \text{વાસ્તવિક વિધેય } f \text{ એ } f\left(\frac{x+y}{3}\right) = \frac{2f(x) + 2f(y) - 4}{6} \quad (x, y \in \mathbb{R}) \text{ સંબંધ ધરાવે છે. જો } f(0) = 2 \text{ હોય તો } f \text{ એ}$$

(A) $\mathbb{R}$ પર વધતું વિધેય છે.

(B) $\mathbb{R}$ પર ઘટતું વિધેય છે.

(C) $(0, \infty)$ પર વધતું તથા $(-\infty, 0)$ પર ઘટતું વિધેય છે. (D) f વિશે કઈ કહી શકાય નહિ.

ઉકેલ : આપેલ સમીકરણમાં $x = y = 0$ મૂકતાં,

$$f(0) = \frac{4f(0) - 4}{6}. \quad \text{અર્થાત્ } f(0) = -2 \quad (1)$$

આપેલ સમીકરણમાં $y = 0$ મૂકતાં,

$$\therefore f\left(\frac{x}{3}\right) = \frac{2f(x) + 2f(0) - 4}{6} = \frac{2f(x) - 4 - 4}{6} = \frac{f(x) - 4}{3}$$

$$\therefore f\left(\frac{x}{3}\right) = \frac{f(x)-4}{3}. \quad \text{આથી} \quad f(3x) = 3f(x) + 4 \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \text{હવે, } f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(\frac{3x+3h}{3}\right) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{2f(3x) + 2f(3h) - 4}{6} - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2f(3x) + 2f(3h) - 4 - 6f(x)}{6h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6f(x) + 8 + 2f(3h) - 4 - 6f(x)}{6h} \quad ((2) \text{ પરથી}) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3h) + 2}{3h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3h) - f(0)}{3h} \quad ((1) \text{ પરથી}) \\ &= f'(0) = 2 \quad (f'(0) = 2) \end{aligned}$$

$$\text{આથી} \quad f(x) = 2x + c$$

$\therefore f$ એ R પર વધતું વિધેય છે.

જવાબ : (A)

(181) જો વક્ર $ay^2 = x^3$ ના બિંદુ $P(at^2, at^3)$ આગળનો સ્પર્શક વક્રને ફરીથી વક્રના બિંદુ $Q(t')$ આગળ મળે તો $t' = \dots$

(A) $2t$

(B) $-t$

(C) $\frac{t}{2}$

(D) $-\frac{t}{2}$

ઉકેલ : બિંદુ $P(at^2, at^3)$ આગળ સ્પર્શકનું સમીકરણ

$$y - at^3 = \frac{3t}{2} (x - at^2) \quad \left(\frac{dy}{dx} = \frac{3t^2}{2t} \right) \quad (1)$$

આ સ્પર્શક વક્રને ફરીથી બિંદુ $Q(t') = Q(at'^2, at'^3)$ માં મળે છે.

$$\therefore (1) \text{ પરથી, } a(t'^3 - t^3) = \frac{3t}{2} a(t'^2 - t^2)$$

$$\therefore (t'^2 + t't + t^2) 2 = 3t (t' + t) \quad (t' \neq t)$$

$$\therefore 2t'^2 - t't - t^2 = 0$$

$$\therefore (t' - t) (2t' + t) = 0$$

$$\therefore t' = -\frac{t}{2} \quad (t' \neq t)$$

જવાબ : (D)

(182) જો $y = a \log x + bx^2 + x$ ને $x = -1$ અને $x = 2$, આગળ આત્યંતિક કિંમતો મળે તો

- (A) $a=2, b=-1$ (B) $a=2, b=\frac{-1}{2}$ (C) $a=-2, b=\frac{1}{2}$ (D) આમાંથી એક પણ નહીં

ઉકેલ : $y = a \log x + bx^2 + x$ ને $x = -1$ અને $x = 2$ આગળ આત્યંતિક મૂલ્યો મળે છે.

$$x = -1 \text{ અને } x = 2 \text{ આગળ } \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\therefore \frac{a}{x} + 2bx + 1 = 0, x = -1 \text{ લેતાં } -a - 2b + 1 = 0 \text{ અને}$$

$$x = 2 \text{ લેતાં } \frac{a}{2} + 4b + 1 = 0$$

$$\therefore a = 2 \text{ અને } b = \frac{-1}{2}$$

જવાબ : (B)

(183) વક્ર $y = x^3$ ને ઊગમબિંદુ સિવાયના બિંદુ P_1 આગળનો સ્પર્શક વક્રને ફરીથી બિંદુ P_2 માં મળે છે. P_2 આગળનો સ્પર્શક વક્રને ફરીથી બિંદુ P_3 માં મળે છે, તો આ જ રીતે આગળ વધતાં બિંદુ $P_1, P_2, P_3, \dots P_n$ ના X-યામ

- (A) સમાંતર શ્રેણીમાં હોય. (B) સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોય.
(C) સ્વરિત શ્રેણીમાં હોય. (D) સમાંતર તેમજ સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોય.

ઉકેલ : $y = x^3$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = 3x^2. \quad \text{ધારો કે વક્ર પરનું બિંદુ } P_1 (h, h^3) \text{ છે.}$$

$$\therefore \left(\frac{dy}{dx} \right)_{P_1} = 3h^2$$

$$P_1 \text{ આગળ સ્પર્શકનું સમીકરણ, } y - h^3 = 3h^2 (x - h)$$

$$\therefore (x - h) (x^2 + xh + h^2) = 3h^2 (x - h) \quad (\text{વક્ર સાથેના છેદબિંદુ આગળ})$$

$$\therefore x^2 + xh - 2h^2 = 0 \quad \text{અથવા } x = h$$

$$\therefore (x - h) (x + 2h) = 0 \quad (x \neq h)$$

$$\therefore x = -2h. \quad \text{આથી } y = -8h^3$$

$$\therefore P_2 (-2h, -8h^3)$$

$$\therefore P_3 \text{ નો } x \text{ યામ } -2(-2h) = 4h \quad \text{તથા } y \text{ યામ } 64h^3$$

$$\therefore P_3 = (4h, 64h^3)$$

આ જ રીતે આગળ વધતાં જોઈ શકાય છે કે, $P_1, P_2, P_3, \dots P_n$ ના X-યામ $h, -2h, 4h, \dots$ એ સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં છે.

જવાબ : (B)

(184) વક્ર $x = \sec^2 \theta, y = \cot \theta$ ના બિંદુ $P\left(\frac{\pi}{4}\right)$ આગળનો સ્પર્શક જો વક્રને ફરીથી બિંદુ Q આગળ મળે, તો

$$PQ = \dots$$

- (A) $\sqrt{15}$ (B) $\frac{3}{2} \sqrt{5}$ (C) $\frac{1}{2} \sqrt{15}$ (D) $2\sqrt{15}$

$$\text{ઉકેલ : } \frac{dy}{dx} = \frac{-\operatorname{cosec}^2 \theta}{2\sec^2 \theta \tan \theta} = -\frac{1}{2} \cot^3 \theta \quad \text{આથી } \left(\frac{dy}{dx} \right)_{\theta=\frac{\pi}{4}} = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{4} \quad \text{મોટે } x = \sec^2 \frac{\pi}{4} = 2, y = \cot \frac{\pi}{4} = 1$$

$\therefore$ વક્રપરનું બિંદુ $P\left(\frac{\pi}{4}\right)$, બિંદુ $P(2, 1)$ થશે.

$$P \text{ આગળ સ્પર્શકનું સમીકરણ, } y - 1 = -\frac{1}{2}(x - 2)$$

$$\therefore x + 2y - 4 = 0 \quad (1)$$

હવે, $x = \sec^2 \theta, y = \cot \theta$

$$\sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1 \text{ નો ઉપયોગ કરતાં } \theta \text{ નો હોપ કરી શકાય. } x - \frac{1}{y^2} = 1$$

$$y^2 = \frac{1}{x-1} \quad (2)$$

$$(1) \text{ પરથી, } y = \frac{4-x}{2}$$

$$\text{છેદ બિંદુ માટે, (2) માં મૂકતાં, } \left(\frac{4-x}{2}\right)^2 = \frac{1}{x-1}$$

$$\therefore (x^2 - 8x + 16)(x - 1) = 4$$

$$\therefore x^3 - 9x^2 + 24x - 20 = 0$$

$$\therefore (x - 2)(x^2 - 7x + 10) = 0$$

$$\therefore (x - 2)^2 (x - 5) = 0$$

$$\therefore x = 2, 5$$

$$\text{જો } x = 2 \text{ તો } y = 1. \quad \text{જો } x = 5 \text{ તો } y = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore P(2, 1) \text{ (જે આપેલ છે) તેથી } Q = \left(5, -\frac{1}{2}\right)$$

$$\therefore PQ = \sqrt{(5-2)^2 + \left(1+\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{3\sqrt{5}}{2}$$

જવાબ : (B)

(185) જો વક્ર $y = ax^2 + bx + \frac{7}{2}$ ને બિંદુ $(1, 2)$ આગળનો સ્પર્શક વક્ર $y = x^2 + 6x + 10$ ને બિંદુ $(-2, 2)$ આગળના અભિલંબને સમાંતર હોય તો $a = \dots, b = \dots$

$$(A) -1, \frac{5}{2}$$

$$(B) \frac{5}{2}, -1$$

$$(C) 1, -\frac{5}{2}$$

$$(D) -\frac{5}{2}, 1$$

$$\text{ઉકેલ : } y = ax^2 + bx + \frac{7}{2} \quad \text{આથી } \frac{dy}{dx} = 2ax + b$$

$$\therefore \left(\frac{dy}{dx}\right)_{(1,2)} = 2a + b$$

$$\text{વળી, બિંદુ } (1, 2) \text{ વક્ર પર હોવાથી, } 2 = a + b + \frac{7}{2}. \quad \text{આથી } a + b = -\frac{3}{2} \quad (1)$$

$$\text{હવે, } y = x^2 + 6x + 10$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = 2x + 6$$

$$\therefore \left(\frac{dy}{dx}\right)_{(-2,2)} = 2 \quad \text{આથી અભિલંબનો ઢાળ} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{આપેલ શરત અનુસાર, } 2a + b = -\frac{1}{2} \quad (2)$$

$$\text{સમીકરણ (1) અને (2) ને ઉકેલતાં, } a = 1, b = -\frac{5}{2}$$

જવાબ : (C)

(186) જો p_1 અને p_2 એ અનુક્રમે ઊગમબિંદુથી વક્ર $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ પરના સ્પર્શક તથા અભિલંબની લંબાઈ હોય, તો

$$4p_1^2 + p_2^2 = \dots$$

(A) $4a^2$

(B) $2a^2$

(C) a^2

(D) $3a^2$

ઉકેલ : આપેલ વક્રના પ્રચલ સમીકરણ $x = a \sin^3 \theta$, $y = a \cos^3 \theta$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-3a \cos^2 \theta \sin \theta}{3a \sin^2 \theta \cos \theta} = \frac{-\cos \theta}{\sin \theta}$$

$$\text{સ્પર્શકનું સમીકરણ } y - a \cos^3 \theta = \frac{-\cos \theta}{\sin \theta} (x - a \sin^3 \theta)$$

$$\therefore x \cos \theta + y \sin \theta = a \sin \theta \cos \theta$$

$$\text{અભિલંબનું સમીકરણ } y - a \cos^3 \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} (x - a \sin^3 \theta)$$

$$\therefore x \sin \theta - y \sin \theta = -a(\cos^4 \theta - \sin^4 \theta)$$

$$\therefore x \sin \theta - y \cos \theta = -a \cos 2\theta$$

$$\therefore \text{સ્પર્શકનું સમીકરણ } x \cos \theta + y \sin \theta = \frac{a}{2} \sin 2\theta$$

$$\therefore p_1 = \frac{\left| -\frac{a}{2} \sin 2\theta \right|}{\sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}} = \left| \frac{a}{2} \sin 2\theta \right|$$

$$\therefore p_2 = |a \cos 2\theta|$$

$$\therefore 4p_1^2 + p_2^2 = a^2$$

જવાબ : (C)

(187) $F(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + ax + b$. જો $F(-2) = 0$ હોય, તો એવી કેટલી ક્રમયુક્ત જોડ (a, b) શક્ય બને જ્યાં વિધેય F એ $P(-2, 0)$ આગળ ન્યૂનતમ હોય.

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

$$\text{ઉકેલ : } F(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + ax + b$$

$$F(-2) = 0 \Rightarrow 2a - b = \frac{10}{3}$$

$$F'(x) = x^2 + 3x + a$$

$$F'(-2) = 0 \Rightarrow a = 2$$

$$\therefore F'(x) = x^2 + 3x + 2 = (x + 1)(x + 2)$$

$$\therefore F'(x) = 0 \Rightarrow x = -1 \text{ અથવા } -2$$

$$\therefore F''(x) = 2x + 3$$

$$x = -2 \text{ આગળ } F''(x) = -1$$

$$\therefore x = -2 \text{ આગળ } F \text{ ને મહત્તમ મૂલ્ય મળે.}$$

$$\therefore \text{એક પણ ક્રમયુક્ત જોડ } (a, b) \text{ શક્ય ન બને જેથી } (-2, 0) \text{ આગળ } F \text{ ને ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળે. જવાબ : (A)}$$

(188)	વિભાગ 1	વિભાગ 2
(P)	4 સેમી બાજુવાળા સમબાજુ ત્રિકોણમાં અંતર્ગત મહત્તમ ક્ષેત્રફળવાળો લંબચોરસ હોય તેનું ક્ષેત્રફળ.	(i) $2\sqrt{3}$
(Q)	જો વક્ર $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$ અને $x^2 + y^2 - 10x + 4y + 20 = 0$ વચ્ચે મહત્તમ અંતર 3λ હોય તો $\lambda = \dots\dots$	(ii) 0
(R)	$x^3 - 3x^2 - x + 3, x \in [0, 4]$ ને મહત્તમ મૂલ્ય $5k$ હોય તો $k = \dots\dots$	(iii) 9
(S)	$\cos^4 x - 6 \cos^2 x + 5$ નું ન્યૂનતમ મૂલ્ય $\dots\dots$	(iv) 3

	(P)	(Q)	(R)	(S)
(A)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(B)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(C)	(i)	(iii)	(iv)	(ii)
(D)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)

ઉકેલ : (P) ધારો કે $PQ = x$

$$\therefore BP = \frac{4-x}{2}$$

$$\Delta BPS \text{ માં, } PS = \frac{4-x}{2} \tan 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} (4-x)$$

$\therefore$ લંબચોરસ PQRSનું ક્ષેત્રફળ

$$\begin{aligned} \Delta &= \frac{\sqrt{3}}{2} (4-x) x \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} (4x - x^2) \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{d\Delta}{dx} = \frac{\sqrt{3}}{2} (4 - 2x)$$

$$\therefore \frac{d\Delta}{dx} = 0 \Rightarrow x = 2, \frac{d^2\Delta}{dx^2} = -\sqrt{3} < 0$$


$\therefore x = 2$ આગળ Δ મહત્તમ બને અને તે $2\sqrt{3}$ થાય. (P) $\rightarrow$ (i)

$(4-x)x$ મહત્તમ થવા માટે $4-x = x$


એટલે કે $x = 2$

(Q) $S_1 : x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$ વર્તુળ છે. કેન્દ્ર $C_1 (1, 1)$, ત્રિજ્યા $r_1 = 1$ છે.

$S_2 : x^2 + y^2 - 10x + 4y + 20 = 0$ વર્તુળ છે. કેન્દ્ર $C_2 (5, -2)$, ત્રિજ્યા $r_2 = 3$



આકૃતિ 15.8



આકૃતિ 15.9

મહત્તમ અંતર $AD = C_1 C_2 + r_1 + r_2 = 5 + 3 + 1$ (Q) $\rightarrow$ (iii)

(R) $y = x^3 - 3x^2 - x + 3, x \in [0, 4]$

$$\frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow 3x^2 - 6x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{6+4\sqrt{3}}{6}, \frac{6-4\sqrt{3}}{6}$$

$$y'' = 6x - 6 = -4\sqrt{3} < 0, \quad (x = \frac{6-4\sqrt{3}}{6} \text{ લેતાં})$$

હવે, y નું વૈશ્વિક મહત્તમ મૂલ્ય $x = 0$ અથવા $x = 4$ આગળ મળશે.

$$f(0) = 3, f(4) = 15$$

$$\therefore \text{મહત્તમ મૂલ્ય } 15 = 5k \Rightarrow k = 3$$

(R) $\rightarrow$ (iv)

(S) $y = \cos^4 x - 6 \cos^2 x + 5$

$$\text{ધારો કે } \cos^2 x = t \quad \text{તો} \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$\therefore y = t^2 - 6t + 5, \quad 0 \leq t \leq 1 \quad \text{અથવા} \quad \frac{dy}{dx} = 2t - 6 < 0. \quad y \text{ ઘટતું વિધેય છે.}$$

$t \in [0, 1]$ માટે y નું ન્યૂનતમ મૂલ્ય $t = 1$ આગળ મળશે.

$$y_{\min} = 0$$

(S) $\rightarrow$ (ii)

ટૂંકી રીત : (S) અને (R) માં બે જ વિકલ્પ સમાન છે.

S ગણતી (S) $\rightarrow$ (ii) મળે છે.

(S) $\rightarrow$ (ii) માત્ર જવાબ (C) માં છે.

જવાબ : (C)

(189) વક્ર $y = \int_0^x 2|t| dt$ માટે પ્રથમ ચરણની દ્વિભાજક રેખાને સમાંતર સ્પર્શકનું સમીકરણ

(A) $y = x \pm 1$

(B) $y = x \pm \frac{3}{4}$

(C) $y = x + \frac{3}{4}, y = x - \frac{1}{4}$

(D) $y = x \pm \frac{1}{2}$

ઉકેલ : $y = \int_0^x 2|t| dt$

$$x \text{ પ્રત્યે વિકલન કરતાં, } \frac{dy}{dx} = 2|x|$$

માંગેલ સ્પર્શક પ્રથમ ચરણની દ્વિભાજક રેખા એટલે કે $y = x$ ને સમાંતર હોવાથી, $\frac{dy}{dx} = 1$

$$\therefore 2|x| = 1. \quad \text{આથી} \quad x = \pm \frac{1}{2}$$

$$\therefore y = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} t dt = \frac{1}{4}$$

$$\therefore \text{વક્ર પરનાં બિંદુ } \left(\pm \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right) \text{ છે.}$$

$$\therefore \text{સ્પર્શકનું સમીકરણ } y - \frac{1}{4} = 1 \left(x - \left(\pm \frac{1}{2} \right) \right)$$

$$\therefore y = x + \frac{3}{4} \text{ અને } y = x - \frac{1}{4}$$

જવાબ : (C)

- (190) ઉપવલય $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{18} = 1$ ના બિંદુ P (x, y) આગળનો સ્પર્શક અક્ષોને બિંદુ A તથા B માં છેદે છે. જો ΔOAB નું ક્ષેત્રફળ ન્યૂનતમ હોય તો બિંદુ P એ

(A) $(\sqrt{8}, 0)$

(B) $(0, \sqrt{18})$

(C) $(2, 3)$

(D) $(1, \frac{\sqrt{63}}{2})$

- ઉકેલ : ઉપવલય $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ પરના કોઈપણ બિંદુ P $(a \cos \theta, b \sin \theta)$ આગળ સ્પર્શકનું સમીકરણ

$$\frac{x \cos \theta}{a} + \frac{y \sin \theta}{b} = 1.$$

આ સ્પર્શકનું અક્ષો સાથેનાં છેદબિંદુ A $\left(\frac{a}{\cos \theta}, 0\right)$, B $\left(0, \frac{b}{\sin \theta}\right)$ છે.

$$\therefore \Delta OAB \text{ નું ક્ષેત્રફળ } \frac{1}{2} \frac{|ab|}{\sin \theta \cos \theta} = \frac{|ab|}{\sin 2\theta}$$

આ ક્ષેત્રફળ ન્યૂનતમ હોય, તો $\sin 2\theta$ ની ક્રિમત મહત્તમ હોય.

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore P(a \cos \theta, b \sin \theta) = \left(\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}}\right) = (2, 3) \quad (a = \sqrt{8}, b = \sqrt{18}) \quad \text{જવાબ : (C)}$$

- (191) જો રેખા $(3 - a)x + ay + a^2 = 1 = 0$ એ વક્ર $xy = 1$ નો કોઈક બિંદુએ અભિલંબ હોય તો $a \in \dots$

(A) $(0, 3)$

(B) $(0, \infty)$

(C) $(0, 1)$

(D) $(-\infty, 0) \cup (3, \infty)$

ઉકેલ : $y = \frac{1}{x}$. આથી $\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x^2}$

$$\therefore \text{અભિલંબનો ઢાળ } x^2 > 0$$

રેખા $(3 - a)x + ay + a^2 - 1 = 0$ એ આપેલ વક્રનો અભિલંબ છે.

$$\therefore -\frac{3-a}{a} > 0. \quad \text{આથી } \frac{a-3}{a} > 0$$

$$\therefore a \in (-\infty, 0) \cup (3, \infty)$$

જવાબ : (D)

- (192) વક્ર $y = ax^3 + bx^2 + cx + 5$ એ X-અક્ષને બિંદુ P $(-2, 0)$ એ સ્પર્શે છે. આ વક્ર Y-અક્ષને Q-બિંદુએ છેદે છે. ત્યાં સ્પર્શકનો ઢાળ 3 છે. $a, b, c = \dots$

(A) $-\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}, 3$

(B) $3, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}$

(C) $-\frac{3}{4}, -\frac{1}{2}, 3$

(D) $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, -3$

- ઉકેલ : વક્ર $y = ax^3 + bx^2 + cx + 5$ એ Y- અક્ષને બિંદુ Q $(0, 5)$ માં છેદે છે.

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)_{(0,5)} = 3$$

$$\therefore [3ax^2 + 2bx + c]_{x=0} = 3. \quad \text{આથી } c = 3 \quad (1)$$

$$\text{વળી, } \left(\frac{dy}{dx}\right)_{(-2,0)} = 0 \quad (\text{વક્ર એ X-અક્ષને બિંદુ } P(-2, 0) \text{ આગળ સ્પર્શે છે.})$$

$$\therefore 12a - 4b + c = 0. \quad \text{આથી } 12a - 4b + 3 = 0 \quad (2)$$

વળી, P (-2, 0) એ વક્ર પર હોય.

$$\therefore -8a + 4b - 2c + 5 = 0. \quad \text{આથી } -8a + 4b - 1 = 0 \quad (3)$$

$$(2) \text{ અને } (3) \text{ ને ઉકેલતાં, } a = -\frac{1}{2}, b = -\frac{3}{4} \quad \text{જવાબ : (A)}$$

(193) વક્ર $ay^2 = x^3$, $a > 0$. પર પ્રથમ ચરણમાં કયા બિંદુએ અભિલંબ બંને અક્ષ પર સમાન લંબાઈના અંતઃખંડ કાપે છે ?

$$(A) \left(\frac{a}{9}, \frac{8a}{27}\right) \quad (B) \left(4a, \frac{8a}{27}\right) \quad (C) \left(\frac{4a}{9}, \frac{8a}{27}\right) \quad (D) \left(\frac{4a}{9}, \frac{-8a}{27}\right)$$

ઉકેલ : ધારો કે માંગેલ બિંદુ (x_1, y_1) છે.

$$\therefore ay_1^2 = x_1^3. \quad \text{આથી } y_1 = \pm \sqrt{\frac{x_1^3}{a}}$$

$$\therefore ay^2 = x^3 \text{ નું } x \text{ પ્રત્યે વિકલન કરતાં,}$$

$$2ay \frac{dy}{dx} = 3x^2$$

$$\therefore \left(\frac{dy}{dx}\right)_{(x_1, y_1)} = \frac{3x_1^2}{2ay_1} = \frac{3x_1^2}{2a\sqrt{\frac{x_1^3}{a}}} = \pm \frac{3}{2} \sqrt{\frac{x_1}{a}}$$

$$\therefore \text{અભિલંબનો ઢાળ} = \mp \frac{2}{3} \sqrt{\frac{a}{x_1}}$$

આપણે જાણીએ છીએ કે જો રેખા બંને અક્ષ પર સમાન લંબાઈનો અંતઃખંડ કાપે તો તેનો ઢાળ $= \pm 1$

$$\therefore \pm \frac{2}{3} \sqrt{\frac{a}{x_1}} = \pm 1. \quad \text{આથી } \frac{4}{9} \frac{a}{x_1} = 1. \quad \text{આથી } x_1 = \frac{4a}{9}$$

$$\therefore y_1 = \pm \sqrt{\frac{64 a^3}{9^3 a}} = \pm \frac{8a}{27}$$

$$\therefore \text{પ્રથમ ચરણમાં માંગેલ બિંદુ } \left(\frac{4a}{9}, \frac{8a}{27}\right) \text{ છે.}$$

$$\text{નોંધ : } y_1 = -\sqrt{\frac{x_1^3}{a}} \text{ હોય તો.}$$

જવાબ : (C)

(194) વક્ર $f(x) = x^2 + bx - b$ ના (1, 1) આગળનો સ્પર્શક તથા અક્ષો વચ્ચે રચાતો ત્રિકોણ પ્રથમ ચરણમાં છે. જો આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ 2 થો એકમ હોય તો, $b = \dots\dots$

$$(A) -1 \quad (B) 3 \quad (C) -3 \quad (D) 1$$

$$\text{ઉકેલ : } f(x) = x^2 + bx - b \quad \text{આથી } f'(x) = 2x + b$$

$$(1, 1) \text{ આગળ } f'(x) = 2 + b$$

$$f(x) \text{ ને } (1, 1) \text{ આગળ સ્પર્શકનું સમીકરણ, } y - 1 = (2 + b)(x - 1)$$

આ સ્પર્શક X-અક્ષને $A \left(\frac{b+1}{b+2}, 0 \right)$ તથા Y-અક્ષ ને $B (0, -b-1)$ બિંદુએ છેદે છે.

ΔOAB નું ક્ષેત્રફળ = 2

$$\therefore -\frac{1}{2} (b+1) \frac{(b+1)}{b+2} = 2 \quad \text{અથવા} \quad b^2 + 2b + 1 = -4b - 8$$

$$\therefore b^2 + 6b + 9 = 0 \quad \text{અથવા} \quad (b+3)^2 = 0$$

$$\therefore b = -3$$

જવાબ : (C)

(195) વક્ર $y = x^{\frac{1}{3}} (1 - \cos x)$ ને $x = 0$ આગળના સ્પર્શકનું સમીકરણ થશે.

(A) $y = 0$

(B) $x = 0$

(C) $y = 1$

(D) $x = 1$

ઉકેલ : $f'(x) = \frac{dy}{dx} = x^{\frac{1}{3}} \sin x + (1 - \cos x) \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}}$

આપેલ વિધેય $x = 0$ આગળ સતત અને વિકલનીય હોવાથી,

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{\frac{1}{3}} (1 - \cos h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{\frac{1}{3}} \sin \frac{h}{2} \sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} = 0$$

વળી, $x = 0$ તો $y = 0$

સ્પર્શકનું સમીકરણ $y = 0$ થાય.

જવાબ : (A)

(196) જો બિંદુ $(0, 3)$ અને $(5, -2)$ ને જોડતી રેખા એ વક્ર $y = \frac{c}{x+1}$ નો સ્પર્શક હોય, તો $c = \dots\dots$

(A) 1

(B) -2

(C) 4

(D) 8

ઉકેલ : બિંદુ $(0, 3)$ અને $(5, -2)$ માંથી પસાર થતી રેખા $y - 3 = \frac{3+2}{0-5} (x - 0) = -x$

$\therefore$ કોઈ બિંદુ આગળ સ્પર્શકનું સમીકરણ $x + y - 3 = 0$ છે.

$$\text{બિંદુ } (\alpha, \beta) \text{ માટે, } \alpha + \beta - 3 = 0 \quad (1)$$

$$\text{હવે, } y = \frac{c}{x+1}. \quad \text{અથવા} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{-c}{(x+1)^2}$$

$$\therefore \left(\frac{dy}{dx} \right)_{(\alpha, \beta)} = \frac{-c}{(\alpha+1)^2} = -1 \quad (x + y - 3 \text{ નો ઢાળ} = -1) \quad (2)$$

$$\therefore c = (\alpha + 1)^2 \quad \text{તથા} \quad \beta = \frac{c}{\alpha+1} \quad ((\alpha, \beta) \text{ એ વક્ર પર આવેલ છે.})$$

$$\therefore -\frac{c}{\left(\frac{c}{\beta} \right)^2} = -1$$

$$\therefore \beta^2 = c \text{ અથવા } (3 - \alpha)^2 = c = (\alpha + 1)^2$$

$$\therefore 3 - \alpha = \pm (\alpha + 1)$$

$$\therefore 3 - \alpha = \alpha + 1 \quad \text{અથવા} \quad \alpha = 1$$

$$\therefore c = (1 + 1)^2 = 4$$

જવાબ : (C)

(197) વિધેય $f(x) = \frac{\tan^2 x - \cot^2 x + 1}{\tan^2 x + \cot^2 x - 1}$ માટે નીચેનામાંથી કયા વિધાન સત્ય છે ?

(A) $f(x)$ નું વૈશ્વિક મહત્તમ મૂલ્ય $\frac{5}{3}$ છે.

(B) $f(x)$ નું વૈશ્વિક ન્યૂનતમ મૂલ્ય -1 છે.

(C) $f(x)$ ને વૈશ્વિક મહત્તમ મૂલ્ય ન મળે.

(D) $f(x)$ ને વૈશ્વિક ન્યૂનતમ મૂલ્ય ન મળે.

ઉકેલ : $f(x) = \frac{\tan^2 x - \cot^2 x + 1}{\tan^2 x + \cot^2 x - 1} = \frac{\tan^4 x + \tan^2 x - 1}{\tan^4 x - \tan^2 x + 1}$

$\tan x = t$ લેતાં, $g(t) = \frac{t^4 + t^2 - 1}{t^4 - t^2 + 1}$

$g'(t) = \frac{-4t^5 + 8t^3}{(t^4 - t^2 + 1)^2} = \frac{4t^3(2 - t^2)}{(t^4 - t^2 + 1)^2}$

મહત્તમ કે ન્યૂનતમ મૂલ્ય માટે $g'(t) = 0$

$\therefore t^2 = 2$

($t = 0$ શક્ય નથી.)

$t^2 = 2$ ના સામિપ્યમાં $g'(t)$ ધન થી ઋણ તરફ જાય છે.

$\therefore t^2 = 2$ આગળ $g(t)$ ને મહત્તમ મૂલ્ય મળે.

$g(\sqrt{2}) = \frac{5}{3}$

$\therefore$ વિધેય f ને વૈશ્વિક મહત્તમ મૂલ્ય $\frac{5}{3}$ મળે.

વિધેય f માટે ન્યૂનતમ મૂલ્ય ન મળે.

જવાબ : (A), (D)

(198) ધારો કે $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ જ્યાં $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ અને $3b^2 < c^2$ એ વધતું વિધેય છે અને

$g(x) = af'(x) + bf''(x) + c^2$. જો $G(x) = \int_{\alpha}^x g(t) dt$, $\alpha \in \mathbb{R}$ તો $\alpha < x < \alpha + 1$ માટે

(A) $G(x)$ એ ઘટતું વિધેય છે.

(B) $G(x)$ એ વધતું વિધેય છે.

(C) $G(x)$ એ વધતું કે ઘટતું વિધેય નથી.

(D) $G(x)$ એ એક-એક વિધેય છે.

ઉકેલ : $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$

$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c > 0$

($f(x)$ એ વધતું વિધેય છે.)

$\therefore a > 0$ અને $4b^2 - 12ac < 0$

$\therefore a > 0$ અને $b^2 < 3ac$

વળી, $g(x) = af'(x) + bf''(x) + c^2$

$\therefore g(x) = a(3ax^2 + 2bx + c) + b(6ax + 2b) + c^2$

$= 3a^2x^2 + 8abx + 2b^2 + c^2 + ac$

$\Delta = 64a^2b^2 - 4(3a^2)(2b^2 + c^2 + ac)$

$= 4a^2(10b^2 - 3c^2 - 3ac) < 4a^2(10b^2 - 3c^2 - b^2)$

($b^2 < 3ac$)

$\therefore \Delta < 4a^2(9b^2 - 3c^2) = 12a^2(3b^2 - c^2) < 0$

($3b^2 < c^2$)

$\therefore g(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$

$\therefore G(x) = \int_{\alpha}^x g(t) dt$ એ વધતું વિધેય છે.

$\therefore G(x)$ એ એક-એક વિધેય થશે.

જવાબ : (B), (D)

- (199) વક્ર $y = x \tan \alpha - \frac{1}{2} \frac{x^2}{u^2 \cos^2 \alpha}$, $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ની બિંદુ P આગળનો સ્પર્શક રેખા $y = x + 5$ ને સમાંતર છે. જો બિંદુ P નો y-અક્ષ $\frac{u^2}{4}$ હોય તો $\alpha = \dots\dots$

- (A) $\frac{\pi}{12}$ (B) $\frac{\pi}{6}$ (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) $\frac{\pi}{3}$

ઉકેલ : $y = x \tan \alpha - \frac{1}{2} \frac{x^2}{u^2 \cos^2 \alpha}$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \tan \alpha - \frac{x}{u^2 \cos^2 \alpha}$$

સ્પર્શક રેખા $y = x + 5$ ને સમાંતર છે.

અર્થાત્ $\frac{dy}{dx} = 1$

$$\tan \alpha - \frac{x}{u^2 \cos^2 \alpha} = 1$$

$$\therefore x = (\tan \alpha - 1) u^2 \cos^2 \alpha, \quad \text{તથા } y = \frac{u^2}{4} \quad (\text{આપેલ છે.})$$

આપેલ સમીકરણ $y = x \tan \alpha - \frac{1}{2} \frac{x^2}{u^2 \cos^2 \alpha}$ માં મૂકતાં,

$$\therefore \frac{u^2}{4} = (\tan \alpha - 1) u^2 \cos^2 \alpha \left[\tan \alpha - \frac{1}{2}(\tan \alpha - 1) \right]$$

$$\therefore \frac{1}{4} = (\tan \alpha - 1) \cos^2 \alpha \left[\frac{\tan \alpha + 1}{2} \right]$$

$$\therefore \frac{1}{2} = \cos^2 \alpha (\tan^2 \alpha - 1) = \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha = -\cos 2\alpha$$

$$\therefore \cos 2\alpha = -\frac{1}{2} \quad \text{અર્થાત્ } 2\alpha = \frac{2\pi}{3} \quad \left(\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)\right)$$

$$\therefore \alpha = \frac{\pi}{3}$$

જવાબ : (D)

- (200) R ત્રિજ્યાવાળા ગોળકની અંતર્ગત મહત્તમ ઘનફળ ધરાવતા નળાકારની ઊંચાઈ થશે.

- (A) $\frac{2R}{\sqrt{3}}$ (B) $\frac{R}{\sqrt{2}}$ (C) $\frac{5R}{4}$

ઉકેલ : જો નળાકારની ત્રિજ્યા r અને ઊંચાઈ h હોય તો


$$\left(\frac{h}{2}\right)^2 + r^2 = R^2$$

(R = ગોળકની ત્રિજ્યા)

$$\therefore \frac{h^2}{4} + r^2 = R^2$$

$$r^2 = R^2 - \frac{h^2}{4}$$

$$\text{નળાકારનું ઘનફળ } V = \pi r^2 h$$



આકૃતિ 15.10

$$= \pi \left(R^2 - \frac{h^2}{4} \right) h = \pi \left(R^2 h - \frac{h^3}{4} \right)$$

$$\frac{dV}{dh} = \pi \left(R^2 - \frac{3h^2}{4} \right) = 0 \Rightarrow \pi \left(R^2 - \frac{3h^2}{4} \right) = 0. \quad \text{આથી } R^2 = \frac{3}{4} h^2. \quad \text{આથી } h = \frac{2}{\sqrt{3}} R$$

$$\frac{d^2V}{dh^2} = \pi \left(0 - \frac{6h}{4} \right) = -\frac{3}{2} \pi h. \quad h = \frac{2}{\sqrt{3}} R \text{ હોવાથી } \frac{d^2V}{dh^2} < 0$$

$\therefore h = \frac{2}{\sqrt{3}} R$ હોય ત્યારે નળાકારનું ઘનફળ મહત્તમ થશે.

જવાબ : (A)

(201) સમીકરણ $x^3 + 2x^2 + 5x + 2 \cos x = 0$ ને $[0, 2\pi]$ માં કેટલા ઉકેલ મળે ?

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

ઉકેલ : $f(x) = x^3 + 2x^2 + 5x + 2 \cos x$

$$\therefore f'(x) = 3x^2 + 4x + 5 - 2 \sin x$$

$$= 3 \left(x + \frac{2}{3} \right)^2 + \frac{11}{3} - 2 \sin x$$

$$\text{હવે, } \frac{11}{3} - 2 \sin x > 0, \forall x$$

$$(-1 \leq \sin x \leq 1)$$

$\therefore f'(x) > 0, \forall x$ આથી f એ વધતું વિધેય છે.

વળી, $f(0) = 2$. આથી $f(x) > f(0)$

$$\therefore f(x) > 2$$

$\therefore f(x) = 0$ ને $[0, 2\pi]$ માં એક પણ ઉકેલ મળે નહિ.

જવાબ : (A)

(202) વિધેય $f(x) = \frac{3}{x^2} + \frac{-3}{x^2} - 4 \left(x + \frac{1}{x} \right)$ નું ન્યૂનતમ મૂલ્ય છે.

(A) 0

(B) 10

(C) -10

(D) ન મળે.

$$\text{ઉકેલ : } f(x) = \frac{3}{x^2} + \frac{1}{x^2} - 4 \left(x + \frac{1}{x} \right)$$

$$t = \sqrt{x} \text{ મૂકતાં, } f(t) = t^3 + \frac{1}{t^3} - 4 \left(t^2 + \frac{1}{t^2} \right)$$

$$= \left(t + \frac{1}{t} \right)^3 - 3 \left(t + \frac{1}{t} \right) - 4 \left[\left(t + \frac{1}{t} \right)^2 - 2 \right]$$

$$\therefore f(t) = \left(t + \frac{1}{t} \right)^3 - 4 \left(t + \frac{1}{t} \right)^2 - 3 \left(t + \frac{1}{t} \right) + 8$$

$$t + \frac{1}{t} = a \text{ મૂકતાં,}$$

$$f(a) = a^3 - 4a^2 - 3a + 8, \quad \text{જ્યાં } a > 2$$

$$(t > 0)$$

$$f'(a) = 3a^2 - 8a - 3 = (3a + 1)(a - 3)$$

$$f'(a) = 0 \Rightarrow a = \frac{1}{3}, 3$$

પરંતુ $a > 2$. આથી $a = 3$

અંતરાલ $(2, 3)$ માં $f'(a) < 0$ અને $(3, \infty)$ માં $f'(a) > 0$

$$\text{ન્યૂનતમ મૂલ્ય } f(3) = 3^3 - 4 \cdot 3^2 - 3 \cdot 3 + 8 = -10$$

જવાબ : (C)

(203) જો વિધેય $f(x) = 2x^3 - 9ax^2 + 12a^2x + 1$ ને $x = x_1$ આગળ સ્થાનીય મહત્તમ અને $x = x_2$ આગળ સ્થાનીય ન્યૂનતમ મળે જ્યાં $x_2 = x_1^2$ તો $a = \dots$

- (A) 0 (B) $\frac{1}{4}$ (C) 2 (D) (A) અથવા (C)

ઉકેલ : $f'(x) = 6x^2 - 18ax + 12a^2$

મહત્તમ કે ન્યૂનતમ મૂલ્ય માટે $f'(x) = 0$

$$\therefore x^2 - 3ax + 2a^2 = 0$$

$$\therefore (x - a)(x - 2a) = 0$$

$$\therefore x = a, \text{ અથવા } 2a$$

હવે, $x_2 = x_1^2$ હોવાથી $a < 0$ હોઈ શકે નહિ. આથી $a \geq 0$

જો $a = 0$ હોય તો $f'(x) = 6x^2 \geq 0$

$\therefore f$ એ વધતું વિધેય થાય જે શક્ય નથી.

$$\begin{aligned} f''(x) &= 12x - 18a \\ &= 6(2x - 3a) \end{aligned}$$

$\therefore$ વિધેય f એ $x = 2a$ આગળ સ્થાનીય ન્યૂનતમ તથા $x = a$ આગળ સ્થાનીય મહત્તમ થશે.

$$\therefore x_1 = a \text{ અને } x_2 = 2a$$

$$\therefore 2a = a^2 \Rightarrow a = 2$$

$$(a \neq 0)$$

જવાબ : (C)

(204) જો વક્ર $y = f(x)$ નો સ્પર્શક જે બિંદુનો x -યામ 1 હોય તે બિંદુએ અક્ષની ધન દિશા સામે $\frac{\pi}{6}$ માપનો ખૂણો

બનાવે છે તથા જે બિંદુના x -યામ અનુક્રમે 2 તથા 3 હોય તે બિંદુએ $\frac{\pi}{3}$ તથા $\frac{\pi}{4}$ માપના ખૂણા બનાવે છે, તો

$$\int_1^3 f'(x) f''(x) dx + \int_2^3 f''(x) dx = \dots$$

$$(A) \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

$$(B) \frac{4+\sqrt{3}}{3}$$

$$(C) \frac{4+3\sqrt{3}}{3}$$

$$(D) \frac{4-3\sqrt{3}}{3}$$

ઉકેલ : આપેલ છે કે $x = 1$ આગળ $\frac{dy}{dx} = \tan \frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ એટલે કે $f'(1) = \frac{1}{\sqrt{3}}$. તે જ રીતે $f'(2) = \sqrt{3}, f'(3) = 1$

$$\therefore \int_1^3 f'(x) f''(x) dx + \int_2^3 f''(x) dx = \int_{f'(1)}^{f'(3)} t dt + [f'(x)]_2^3 \quad (f'(x) = t \text{ લેતાં } f''(x) dx = dt)$$

$$= \frac{1}{2} [t^2]_{f'(1)}^{f'(3)} + f'(3) - f'(2)$$

$$= \frac{1}{2} [(f'(3))^2 - (f'(1))^2] + 1 - \sqrt{3}$$

$$= \frac{1}{2} \left[1 - \frac{1}{3} \right] + 1 - \sqrt{3} = \frac{4-3\sqrt{3}}{3}$$

જવાબ : (D)

(205) વક્ર $x^3 - y^2 = 0$ ના બિંદુ P ($4m^2, 8m^3$) આગળનો સ્પર્શક બીજા કોઈ બિંદુ Q આગળનો અભિલંબ પણ હોય તો $9m^2 = \dots$

$$(A) 1$$

$$(B) 2$$

$$(C) 3$$

$$(D) 4$$

ઉકેલ : $y^2 = x^3$

(1)

$$\therefore 2y \frac{dy}{dx} = 3x^2. \quad \text{અથવા} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{3x^2}{2y}$$

$$\therefore \left(\frac{dy}{dx} \right)_{x=4m^2} = \frac{3 \cdot 16m^4}{2 \cdot 8m^3} = 3m$$

$$\text{બિંદુ P આગળના સ્પર્શકનું સમીકરણ} \quad y - 8m^3 = 3m(x - 4m^2)$$

$$\therefore y = 3mx - 4m^3 \quad (2)$$

આ સ્પર્શક વક્રને બીજા કોઈ બિંદુ Q માં મળે છે.

$$\therefore (1) \text{ અને } (2) \text{ પરથી, } (x - m^2)(x - 4m^2) = 0 \quad \text{અથવા} \quad x = 4m^2 \text{ અથવા } m^2$$

$x = 4m^2$ હોય તો $y = 8m^3$ જે બિંદુ P ના યામ જ છે.

$$\therefore x = m^2 \text{ તથા } y = -m^3 \text{ (સમીકરણ (2) પરથી).} \quad \text{અથવા} \quad \text{બિંદુ Q } (m^2, -m^3)$$

$\therefore$ બિંદુ Q આગળ સ્પર્શકનો ઢાળ

$$\therefore \left(\frac{dy}{dx} \right)_{x=m^2} = -\frac{3}{2}m. \quad \text{અથવા} \quad \text{અભિલંબનો ઢાળ} = \frac{2}{3m}$$

હવે બિંદુ P આગળનો સ્પર્શક એ Q આગળ અભિલંબ હોય, તો

$$\frac{2}{3m} = 3m \quad \text{અથવા} \quad 9m^2 = 2$$

જવાબ : (B)

(206) વક્ર $y = |x^2 - 1|$ તથા $y = |x^2 - 3|$ વચ્ચેના ખૂણાનું માપ

$$(A) \tan^{-1}\left(\frac{4\sqrt{2}}{7}\right) \quad (B) \tan^{-1}\left(\frac{5\sqrt{2}}{7}\right) \quad (C) \tan^{-1}\left(\frac{3\sqrt{2}}{7}\right) \quad (D) \tan^{-1}\left(\frac{2\sqrt{2}}{7}\right)$$

$$\text{ઉકેલ : આપેલ વક્ર } y = \begin{cases} x^2 - 1, & |x| \geq 1 \\ 1 - x^2 & |x| < 1 \end{cases} \quad \text{તથા} \quad (1)$$

$$y = \begin{cases} x^2 - 3, & |x| \geq \sqrt{3} \\ 3 - x^2 & |x| < \sqrt{3} \end{cases} \quad (2)$$

પ્રથમ બંને વક્રોનાં છેદબિંદુ શોધીએ.

$$|x^2 - 1| = |x^2 - 3|$$

$$\therefore x^2 - 1 = \pm (x^2 - 3)$$

$$\therefore x = \pm\sqrt{2} \quad \text{અને} \quad y = 1$$

$\therefore$ છેદબિંદુ A ($\sqrt{2}$, 1) અને B ($-\sqrt{2}$, 1) થશે.

A ($\sqrt{2}$, 1) આગળ ખૂણાનું માપ શોધીએ.

$$(1) \text{ પરથી, } \frac{dy}{dx} = 2x \quad \text{અથવા} \quad \left(\frac{dy}{dx} \right)_A = 2\sqrt{2} = m_1. \quad \text{તે જ રીતે} \quad m_2 = -2\sqrt{2}$$

$$\tan \theta = \left| \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} \right| = \frac{4\sqrt{2}}{7}$$

$$\therefore \theta = \tan^{-1}\left(\frac{4\sqrt{2}}{7}\right)$$

બિંદુ B આગળ પણ આ જ માપનો ખૂણો મળશે.

જવાબ : (A)

(207) ધારો કે વિધેય f માટે દરેક $x \in \mathbb{R}$ માટે $f(x)$ નું અસ્તિત્વ છે તથા $h(x) = f(x) - (f(x))^2 + (f(x))^3$, $x \in \mathbb{R}$ તો

(A) જો f વધતું વિધેય હોય તો h પણ વધતું વિધેય થશે.

(B) જો f વધતું વિધેય હોય તો h ઘટતું વિધેય થશે.

(C) જો f ઘટતું વિધેય હોય તો h વધતું વિધેય થશે.

(D) h વિશે કઈ કહી શકાય નહિ.

ઉકેલ : $h'(x) = f'(x) - 2f(x)f'(x) + 3f(x)^2f'(x)$

$$= 3f'(x) \left[(f(x))^2 - \frac{2}{3}f(x) + \frac{1}{3} \right]$$

$$= 3f'(x) \left[\left(f(x) - \frac{1}{3} \right)^2 + \frac{2}{9} \right]$$

જો $f'(x) > 0$ હોય તો $h'(x) > 0$

જો f વધતું વિધેય હોય તો h પણ વધતું વિધેય થશે.

જવાબ : (A)

(208) જો $f(x) = x^2 + 2bx + 2c^2$ અને $g(x) = -x^2 - 2cx + b^2$ એ એવાં વિધેય છે જ્યાં $\min f(x) > \max g(x)$, તો b અને c વચ્ચે કેવો સંબંધ હશે ?

(A) કોઈ સંબંધ ન હોય.

(B) $0 < c < \frac{b}{2}$

(C) $|c| < |b| \sqrt{2}$

(D) $|c| > |b| \sqrt{2}$

ઉકેલ : અહીં, $f(x) = x^2 + 2bx + 2c^2 = (x + b)^2 + 2c^2 - b^2$

$$\therefore \min f(x) = 2c^2 - b^2$$

$$\text{તથા } g(x) = -x^2 - 2cx + b^2 = b^2 + c^2 - (x + c)^2$$

$$\therefore \max g(x) = b^2 + c^2$$

હવે, $\min f(x) > \max g(x)$

$$\therefore 2c^2 - b^2 > b^2 + c^2 \quad \therefore c^2 > 2b^2 \quad \text{આથી} \quad |c| > \sqrt{2} |b|$$

જવાબ : (D)

(209) વક્ર $y = [|\sin x| + |\cos x|]$ અને $x^2 + y^2 = 10$, જ્યાં એ $[x]$ એ x થી નાનો ન હોય તેવો મોટામાં મોટો પૂર્ણાંક, વચ્ચેના ખૂણાનું માપ

(A) $\tan^{-1} 3$

(B) $\tan^{-1} (-3)$

(C) $\tan^{-1} \sqrt{3}$

(D) $\tan^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)$

$$\text{ઉકેલ : } |\sin x| + |\cos x| = \sqrt{(|\sin x| + |\cos x|)^2}$$

$$= \sqrt{1 + |\sin 2x|}$$

હવે, $0 \leq |\sin 2x| \leq 1$

$$\therefore 1 \leq \sqrt{1 + |\sin 2x|} \leq \sqrt{2}$$

$$\therefore [|\sin x| + |\cos x|] = 1$$

$$\therefore y = 1 \quad (1) \quad \text{તથા} \quad x^2 + y^2 = 10 \quad (2)$$

(1) અને (2)ને ઉકેલતાં બંને વક્રનાં છેદબિંદુ (3, 1), (-3, 1) થશે.

હવે, $x^2 + y^2 = 10$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

$$\therefore \left(\frac{dy}{dx} \right)_{(3,1)} = -3 \quad \text{તથા} \quad \left(\frac{dy}{dx} \right)_{(-3,1)} = 3$$

વળી, $y = 1$. આથી $\frac{dy}{dx} = 0 = m_2$

∴ (3, 1) આગળ બંને વક્ર વચ્ચેના ખૂણાનું માપ

$$\tan^{-1} \left| \frac{-3-0}{1+(-3)0} \right| = \tan^{-1} 3$$

તથા (-3, 1) આગળ પણ બંને વક્ર વચ્ચેનો ખૂણાનું માપ $\tan^{-1} 3$ થાય છે.

જવાબ : (A)

(210) ઉપવલય $\frac{x^2}{27} + y^2 = 1$ ને બિંદુ $(3\sqrt{3} \cos \theta, \sin \theta)$ આગળ સ્પર્શક દોરેલ છે. આ સ્પર્શક દ્વારા કપાત

અંતઃખંડોનો સરવાળો θ ની કઈ કિંમત માટે ન્યૂનતમ થાય ? $\left(\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2} \right) \right)$

(A) $\frac{\pi}{3}$

(B) $\frac{\pi}{6}$

(C) $\frac{\pi}{8}$

(D) $\frac{\pi}{4}$

ઉકેલ : ઉપવલય $\frac{x^2}{27} + y^2 = 1$ ને બિંદુ $(3\sqrt{3} \cos \theta, \sin \theta)$ આગળ સ્પર્શકનું સમીકરણ

$$\frac{x \cos \theta}{3\sqrt{3}} + y \sin \theta = 1 \quad \left(\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2} \right) \right)$$

અક્ષો પર કપાત અંતઃખંડોનો સરવાળો $s = 3\sqrt{3} \sec \theta + \operatorname{cosec} \theta$

$$\therefore \frac{ds}{d\theta} = 3\sqrt{3} \sec \theta \tan \theta - \operatorname{cosec} \theta \cot \theta$$

$$s \text{ ની ન્યૂનતમ મૂલ્ય માટે } \frac{ds}{d\theta} = 0. \quad \text{આથી} \quad \frac{3\sqrt{3} \sin \theta}{\cos^2 \theta} - \frac{\cos \theta}{\sin^2 \theta} = 0$$

$$\therefore \frac{1}{3\sqrt{3}} = \tan^3 \theta$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \text{આથી } \theta = \frac{\pi}{6} \quad \left(\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2} \right) \right)$$

$$\text{વળી, } \frac{d^2s}{d\theta^2} = 3\sqrt{3} \sec \theta \tan^2 \theta + 3\sqrt{3} \sec^3 \theta + \operatorname{cosec} \theta \cot^2 \theta + \operatorname{cosec}^3 \theta$$

$$\therefore \left(\frac{dy}{dx} \right)_{\theta=\frac{\pi}{6}} > 0$$

∴ $\theta = \frac{\pi}{6}$ આગળ s ન્યૂનતમ થશે.

જવાબ : (A)

(211) ધારો કે $f(x) = (1+x)^n - (1+nx)$, $x \in [-1, \infty)$. f ને

(A) $x = 0$ આગળ વૈશ્વિક મહત્તમ મૂલ્ય મળે.

(B) $x = 0$ આગળ વૈશ્વિક મહત્તમ મૂલ્ય કે વૈશ્વિક મૂલ્ય ન મળે.

(C) $x = 0$ આગળ વૈશ્વિક ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળે.

(D) $x = 0$ આગળ મહત્તમ કે ન્યૂનતમ વિશે કઈ કહી શકાય નહિ.

ઉકેલ : $f(x) = (1+x)^n - (1+nx)$

$$\text{આથી } f'(x) = n(1+x)^{n-1} - n. \quad \text{આથી } f'(0) = 0$$

$$x > 0 \quad \text{માટે } f'(x) > 0$$

∴ $[0, \infty)$ માં f એ વધતું વિધેય છે.

$$\therefore f(x) \geq f(0) = 0 \quad \forall x \in [0, \infty)$$

હવે, $-1 \leq x < 0$ માટે $0 \leq 1+x < 1$

$\therefore (1+x)^n - 1 < 0$

$\therefore f$ એ $[-1, 0]$ માં ઘટતું વિધેય છે.

$\therefore f(x) \geq f(0) = 0 \quad \forall x \in [-1, 0)$

$\therefore f(x) \geq f(0) = 0 \quad \forall x \in [-1, \infty)$

$\therefore x = 0$ આગળ f ને વૈશ્વિક ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળે.

જવાબ : (C)

(212) વક્ર $y^2 = 4ax$ ના બિંદુ $P(at^2, 2at)$ આગળ દોરેલ સ્પર્શક તથા અભિલંબ X-અક્ષને અનુક્રમે બિંદુ T તથા N માં છેદે છે. આ પરવલયના બિંદુ P આગળ દોરેલ સ્પર્શક તથા બિંદુ T, P, Nમાંથી પસાર થતા વર્તુળના બિંદુ P આગળ દોરેલ સ્પર્શક વચ્ચેના ખૂણાનું માપ થશે.

(A) $\tan^{-1} t^2$

(B) $\cot^{-1} t^2$

(C) $\tan^{-1} |t|$

(D) $\cot^{-1} |t|$

ઉકેલ : $y^2 = 4ax$ ના બિંદુ (x_1, y_1) આગળ દોરેલ સ્પર્શકનું સમીકરણ $yy_1 = 2a(x + x_1)$ છે.

$\therefore$ બિંદુ $P(at^2, 2at)$ આગળ સ્પર્શકનું સમીકરણ

$ty = x + at^2$

(1)

સ્પર્શકનો ઢાળ = $\frac{1}{t}$

તે X-અક્ષને બિંદુ Tમાં છેદે છે.

અર્થાત્ $T(-at^2, 0)$

(2)

આ બિંદુએ અભિલંબનું સમીકરણ $y = -tx + 2at + at^3$

તે X-અક્ષને બિંદુ N $(2at + at^2, 0)$ માં છેદશે. બિંદુ T, P, Nમાંથી જે વર્તુળ પસાર થાય છે તેના વ્યાસાંત બિંદુઓ T તથા N થશે કારણ કે $\overline{TP}$ અને $\overline{NP}$ એ એકબીજાને લંબ છે.

$\therefore$ વર્તુળનું સમીકરણ $(x + at^2)(x - 2a - at^2) + y^2 = 0$

$\therefore x^2 + y^2 - 2ax - at^2(2a + at^2) = 0$

x પ્રત્યે વિકલન કરતાં

$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 2a$ અર્થાત્ $\frac{dy}{dx} = \frac{a-x}{y}$

$\left(\frac{dy}{dx}\right)_{(at^2, 2at)} = \frac{a-at^2}{2at} = \frac{1-t^2}{2t}$ જે P આગળના


વર્તુળના સ્પર્શકનો ઢાળ થશે.

(2) અને (3) પરથી,

$\tan \theta = \left| \frac{\frac{1-t^2}{2t}}{1 + \frac{1-t^2}{2t^2}} \right| = \left| \frac{2t-t+t^3}{2t^2+1-t^2} \right| = \left| \frac{t+t^3}{t^2+1} \right| = |t|$

$\therefore \theta = \tan^{-1} |t|$

જવાબ : (C)



આકૃતિ 15.11

(213) ધારો કે $f(x) = \begin{cases} x^3 + x^2 - 10x, & -1 \leq x < 0 \\ \sin x, & 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \\ 1 + \cos x, & \frac{\pi}{2} \leq x < \pi \end{cases}$ તો f ને

(A) $x = \frac{\pi}{2}$ આગળ સ્થાનીય મહત્તમ મૂલ્ય મળે છે. (B) $x = \frac{\pi}{2}$ આગળ સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળે છે.

(C) $x = 0$ આગળ વૈશ્વિક ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળે છે. (D) $x = \frac{\pi}{2}$ આગળ વૈશ્વિક મહત્તમ મૂલ્ય મળે છે.

ઉકેલ :
$$f'(x) = \begin{cases} 3x^2 + 2x - 10, & -1 < x < 0 \\ \cos x, & 0 < x < \frac{\pi}{2} \\ -\sin x, & \frac{\pi}{2} < x < \pi \end{cases}$$

વિધેય f એ $x = 0$ તથા $x = \frac{\pi}{2}$ આગળ વિકલનીય નથી.

કારણ કે $f'(0-) = -10, f'(0+) = 1, f'\left(\frac{\pi}{2}-\right) = 0, f'\left(\frac{\pi}{2}+\right) = -1$

f ની નિર્ણાયક બિંદુ $x = 0, \frac{\pi}{2}$ છે.

$0 < x < \frac{\pi}{2}$ માટે $f'(x) > 0$ તથા $\frac{\pi}{2} < x < \pi$ માટે $f'(x) < 0$ છે.

$\therefore f$ ને $x = \frac{\pi}{2}$ આગળ સ્થાનીય મહત્તમ મૂલ્ય મળે.

વળી, $-1 < x < 0$ માટે $f'(x) < 0$ તથા $0 < x < \frac{\pi}{2}$ માટે $f'(x) > 0$ છે.

$\therefore f$ ને $x = -1$ આગળ વૈશ્વિક ન્યૂનતમ તથા $x = 0$ આગળ વૈશ્વિક ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળે.

જવાબ : (A), (C)

(214) જો વક્ર $x^n y = a^n$ ના કોઈ પણ બિંદુ એ દોરેલ સ્પર્શક તથા તેનાથી અક્ષો દ્વારા રચાતા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ અચળ હોય તો $n = \dots\dots$

(A) $\frac{1}{2}$

(B) 2

(C) $\frac{3}{2}$

(D) 1

ઉકેલ : $x^n y = a^n$

$nx^{n-1}y + x^n \frac{dy}{dx} = 0$ અર્થાત્ $\frac{dy}{dx} = \frac{-nx^{n-1}y}{x^n} = \frac{-ny}{x}$

ધારો કે (x_0, y_0) એ વક્ર પરનું કોઈ પણ બિંદુ છે. અર્થાત્ $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{(x_0, y_0)} = -\frac{ny_0}{x_0}$

આ બિંદુએ સ્પર્શકનું સમીકરણ $y - y_0 = -\frac{ny_0}{x_0}(x - x_0)$

જો આ સ્પર્શક X-અક્ષ અને Y-અક્ષને અનુક્રમે A તથા B માં છેટે તો,

A $\left(x_0 \left(\frac{1+n}{n}\right), 0\right)$ તથા B $(0, (1+n)y_0)$ થશે. O ઊગમબિંદુ છે.

ΔOAB નું ક્ષેત્રફળ $= \frac{1}{2} \frac{(1+n)}{n} x_0 (1+n) y_0$

$= \frac{1}{2} \frac{(1+n)^2}{n} x_0 \frac{a^n}{x_0^n} \quad ((x_0, y_0) \text{ એ વક્ર પરનું બિંદુ છે.})$

$= \frac{1}{2} a^n \frac{(1+n)^2}{n} \frac{1}{x_0^{n-1}}$

આ ક્ષેત્રફળ અચળ હોય તો $x_0^{n-1} = 1$

$\therefore n - 1 = 0.$ અર્થાત્ $n = 1$

જવાબ : (D)

(215) જો વિધેય $y = 1 + a^2x - x^3$ જે બિંદુએ ન્યૂનતમ હોય તે અસમતા $\frac{x^2+x+2}{x^2+5x+6} \leq 0$ નું સમાધાન કરે તો પ્રથમ

a ની કિંમત ગણમાં હોય.

- (A) $\emptyset$ (B) $(-3\sqrt{3}, -2\sqrt{3})$ (C) $(2\sqrt{3}, 3\sqrt{3})$ (D) $(-3\sqrt{3}, -2\sqrt{3}) \cup (2\sqrt{3}, 3\sqrt{3})$

ઉકેલ : $y = 1 + a^2x - x^3$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = a^2 - 3x^2. \quad \text{આથી } a^2 - 3x^2 = 0 \quad \Leftrightarrow x = \pm \frac{a}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -6x. \quad \text{આથી } x = -\frac{a}{\sqrt{3}} \text{ માટે } y \text{ ને ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળે.}$$

$$\text{હવે, કોઈ પણ } x \in \mathbb{R} \text{ માટે, } x^2 + x + 2 > 0$$

$$\therefore \frac{x^2+x+2}{x^2+5x+6} \leq 0 \quad \Leftrightarrow x^2 + 5x + 6 < 0$$

$$\therefore x = -\frac{a}{\sqrt{3}} \text{ માટે, } \left(-\frac{a}{\sqrt{3}}\right)^2 - 5\frac{a}{\sqrt{3}} + 6 < 0$$

$$\therefore a^2 - 5\sqrt{3}a + 18 < 0$$

$$\therefore (a - 2\sqrt{3})(a - 3\sqrt{3}) < 0$$

$$\therefore a \in (2\sqrt{3}, 3\sqrt{3})$$

જવાબ : (C)

(216) a ની કઈ કિંમત માટે $f(x) = -\left(\frac{b^2-ab-2}{b^2-3b+4}+1\right)x^5 - 3x + \log 5$, $b \in \mathbb{R}$ એ $\mathbb{R}$ પર ઘટતું વિધેય થાય ?

- (A) $(-1, 2)$ (B) $(0, 7)$ (C) $[-7, 1]$ (D) $(2, 7)$

$$\text{ઉકેલ : } f(x) = -\left(\frac{b^2-ab-2}{b^2-3b+4}+1\right)x^5 - 3x + \log 5$$

$$f'(x) = -\left(\frac{b^2-ab-2}{b^2-3b+4}+1\right)5x^4 - 3$$

જો f એ $\mathbb{R}$ પર ઘટતું વિધેય હોય, તો $f'(x) \leq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$

$$\therefore -\left(\frac{b^2-ab-2}{b^2-3b+4}+1\right) \leq 0$$

$$\therefore \left(\frac{b^2-ab-2}{b^2-3b+4}+1\right) \geq 0$$

$$\therefore \frac{2b^2-b(3+a)+2}{b^2-3b+4} \geq 0$$

$$\therefore b^2 - 3b + 4 > 0 \text{ અને } 2b^2 - b(3 + a) + 2 \geq 0$$

$$\Rightarrow (3 + a)^2 - 4(2)(2) \leq 0 \quad (\Delta \leq 0)$$

$$\Rightarrow 9 + a^2 + 6a - 16 \leq 0$$

$$\Rightarrow a^2 + 6a - 7 \leq 0$$

$$\Rightarrow (a + 7)(a - 1) \leq 0$$

$$\Rightarrow a \in [-7, 1]$$

જવાબ : (C)

(217) સંયોજિત વિધેય $f_1(f_2(f_3(\dots(f_n(x))))$ એ ઘટતું વિધેય છે અને n વિધેયોમાંથી r વિધેય ઘટતાં વિધેય છે તથા બાકીના વધતાં વિધેય છે. $r(n-r)$ નું મહત્તમ મૂલ્ય કેટલું થાય ?

$$(A) \frac{n^2-4}{4}, n = 4k, k \in \mathbb{N}$$

$$(B) \frac{n^2}{4}, n \text{ યુગ્મ સંખ્યા હોય.}$$

$$(C) \frac{n^2-1}{4}, n \text{ અયુગ્મ સંખ્યા હોય.}$$

$$(D) \frac{n^2}{4}, n = 4k + 2, k \in \mathbb{N}$$

ઉકેલ : ધારો કે $g(x) = f_1(f_2(f_3(\dots(f_n(x))))$

$g(x)$ એ ઘટતું વિધેય છે. આથી $g'(x) < 0$

હવે, $g'(x) = f'_1(f_2(f_3(\dots(f_n(x)))) \times f'_2(f_3(\dots(f_n(x)))) \times \dots \times f'_{n-1}(f_n(x)) \times f'_n(x)$

$g'(x) < 0$ હોવાથી ઉપરના n પદમાંથી અયુગ્મ સંખ્યાના પદની કિંમત ઋણ થશે.

આપેલ છે કે r વિધેયો ઘટતાં વિધેયો છે.

$\therefore r$ અયુગ્મ થશે. આપણે $r(n-r)$ નું મહત્તમ મૂલ્ય શોધવું છે.

ધારો કે $P(r) = rn - r^2, 0 < r \leq n$

$\therefore P'(r) = n - 2r$, અને $P''(r) = -2$

$\therefore r = \frac{n}{2}$ માટે $P(r)$ નું મૂલ્ય મહત્તમ થશે.

આપણે નોંધીએ કે r એ અયુગ્મ છે. આપણે જુદા જુદા વિકલ્પનો વિચાર કરીએ.

વિકલ્પ 1 : (a) $n = 4m + 2, m \in \mathbb{N}$

આ વિકલ્પમાં $r = \frac{n}{2}$ એ અયુગ્મ થશે.

$$\therefore P(r) = \frac{n^2}{4}$$

વિકલ્પ 1 : (b) $n = 4m, m \in \mathbb{N}$

આ વિકલ્પમાં $\frac{n}{2}$ એ અયુગ્મ થશે નહિ.

$\therefore$ આપણે $\frac{n}{2}$ પહેલા અથવા $\frac{n}{2}$ પછીનો વિચાર કરીએ.

$$r = \frac{n}{2} - 1 \text{ અથવા } r = \frac{n}{2} + 1$$

$$\text{બંને રીતે } P(r) = \frac{n^2-4}{4}$$

વિકલ્પ 2 : n એ અયુગ્મ હોય.

આપણે $r = \frac{n+1}{2}$ નો વિચાર કરીએ

$$P(r) = \frac{n^2-1}{4}$$

જવાબ : (A), (C), (D)

- (218) જો વક્ર $4x^2 + a^2y^2 = 4a^2$, $4 < a^2 < 8$ પરનું બિંદુ (u, v) એ બિંદુ $(0, -2)$ થી સૌથી દૂરનું બિંદુ હોય તો $u + v = \dots$
- (A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 8

ઉકેલ : અહીં, $4x^2 + a^2y^2 = 4a^2$

$$\therefore \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{4} = 1$$

ધારો કે $(u, v) = (a \cos \theta, 2 \sin \theta)$ એ આપેલ વક્ર પરનું બિંદુ છે. બિંદુ $(0, -2)$ થી અંતર

$$f(\theta) = a^2 \cos^2 \theta + (2 \sin \theta + 2)^2$$

$$f'(\theta) = 0 \Rightarrow 2a^2 \cos \theta (-\sin \theta) + 8(\sin \theta + 1) \cos \theta = 0$$

$$\therefore \cos \theta \{(8 - 2a^2) \sin \theta + 8\} = 0$$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{2} \text{ અથવા } \sin \theta = \frac{4}{a^2 - 4}$$

હવે, $4 < a^2 < 8$

$$\therefore 0 < a^2 - 4 < 4. \quad \text{અર્થાત્ } 0 < \frac{a^2 - 4}{4} < 1$$

$$\therefore \frac{4}{a^2 - 4} > 1. \quad \text{પરંતુ } \sin \theta \leq 1 \quad \text{અર્થાત્ } \theta = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \text{વક્ર પરનું બિંદુ } (0, 2) \quad \text{અર્થાત્ } u + v = 0 + 2 = 2$$

જવાબ : (A)

- (219) ધારો કે $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ પરનું વિધેય છે તથા તે દ્વિતીય વિકલિત ધરાવે છે. વળી, $f(0) = f(1) = 0$

તથા $f''(x) - 2f'(x) + f(x) \geq e^x$ જો વિધેય $e^{-x}f(x)$ એ અંતરાલ $[0, 1]$ માં $x = \frac{1}{4}$ આગળ ન્યૂનતમ હોય, તો નીચેનામાંથી કયું વિધાન સત્ય છે ?

$$(A) f'(x) < f(x), \frac{1}{4} < x < \frac{3}{4}$$

$$(B) f'(x) > f(x), 0 < x < \frac{1}{4}$$

$$(C) f'(x) < f(x), 0 < x < \frac{1}{4}$$

$$(D) f'(x) < f(x), \frac{3}{4} < x < 1$$

ઉકેલ : ધારો કે, $g(x) = e^{-x}f(x)$

$$\therefore g'(x) = e^{-x}(f'(x) - f(x))$$

$$\therefore g''(x) = e^{-x}(f''(x) - 2f'(x) + f(x))$$

આપેલ છે કે $(f''(x) - 2f'(x) + f(x)) \geq e^x$, $x \in [0, 1]$

$$\therefore e^{-x}(f''(x) - 2f'(x) + f(x)) \geq 1$$

$$\therefore g''(x) \geq 1 > 0$$

$\therefore g'(x)$ એ વધતું વિધેય છે.

$$0 < x < \frac{1}{4} \Rightarrow g'(x) < g'\left(\frac{1}{4}\right)$$

$$\Rightarrow e^{-x}(f'(x) - f(x)) < 0$$

$$\Rightarrow f'(x) < f(x)$$

$$\therefore f'(x) < f(x), \quad 0 < x < \frac{1}{4}$$

જવાબ : (C)

(220) વિધેય $f(x) = 2|x| + |x + 2| - ||x + 2| - 2|x||$ ને x ની કઈ કિંમત માટે સ્થાનિય મહત્તમ કે સ્થાનિય ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળે ?

(A) -2

(B) $-\frac{2}{3}$

(C) 2

(D) $\frac{2}{3}$

ઉકેલ : $y = 2|x| + |x + 2| - ||x + 2| - 2|x||$

વિકલ્પ 1 : $x < -2$. આથી $x < 2$. આથી $x - 2 < 0$

$$\therefore y = -2x - x - 2 - |-x - 2 + 2x| = -2x - x - 2 - |x - 2| = -3x - 2 - 2 + x$$

$$\text{આથી } y = -2x - 4 \quad (1)$$

વિકલ્પ 2 : $y = -2x + x + 2 - |x + 2 + 2x|$ $-2 < x < 0$

$$y = -x + 2 - |3x + 2|$$

$$\text{જો } -2 \leq x < -\frac{2}{3} \text{ તો } y = 2x + 4 \quad (2)$$


$$\text{તથા જો } -\frac{2}{3} < x < 0 \text{ તો } y = -4x \quad (3)$$

વિકલ્પ 3 : $y = 2x + x + 2 - |x + 2 - 2x|$ $x \geq 0$

$$y = 3x + 2 - |x - 2|$$

$$\text{જો } 0 \leq x < 2 \text{ તો } y = 4x \quad (4)$$

$$\text{જો } x \geq 2 \text{ તો } y = 2x + 4 \quad (5)$$



આકૃતિ 15.12

આલેખ પરથી જોઈ શકાય છે કે, $x = -2, 0$ આગળ સ્થાનિય ન્યૂનતમ તથા $x = -\frac{2}{3}$ આગળ સ્થાનિય મહત્તમ મૂલ્ય મળે છે.

જવાબ : (A), (B)

(221) વક્ર $y^2 = 8x$ અને $xy = -1$ ના સામાન્ય સ્પર્શકનું સમીકરણ છે.

(A) $3y = 9x + 2$

(B) $y = 2x + 1$

(C) $2y = x + 8$

(D) $y = x + 2$

ઉકેલ : વક્ર $xy = -1$ પરના બિંદુનું સ્વરૂપ $(t, -\frac{1}{t})$ પ્રકારનું હોય.

$$\text{હવે, } y = -\frac{1}{x}. \quad \text{આથી } \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2}$$

$$\therefore \left(\frac{dy}{dx} \right)_{(t, -\frac{1}{t})} = \frac{1}{t^2}$$

∴ વક્ર $xy = -1$ પરના બિંદુ $\left(t, -\frac{1}{t}\right)$ આગળ સ્પર્શકનું સમીકરણ,

$$y + \frac{1}{t} = \frac{1}{t^2} (x - t) \quad \text{એટલે કે} \quad y = \frac{1}{t^2} x - \frac{2}{t} \quad (1)$$

જો આ રેખા વક્ર $y^2 = 8x$ નો પણ સ્પર્શક હોય, તો તે $y = mx + \frac{2}{m}$ સ્વરૂપમાં હોય. ($a = 2$)

$$\therefore m = \frac{1}{t^2}, \frac{2}{m} = -\frac{2}{t}. \quad \text{આથી} \quad m = -t. \quad \text{આથી} \quad -t = \frac{1}{t^2} \Rightarrow t = -1$$

∴ બંને વક્રના સામાન્ય સ્પર્શકનું સમીકરણ (1) પરથી, $y = x + 2$

જવાબ : (D)

$$(222) \quad y = \frac{b^2}{a-x} + \frac{a^2}{x}, \quad 0 < x < a, \quad a, b > 0 \quad \text{નું ન્યૂનતમ મૂલ્ય છે.}$$

$$(A) \frac{a+b}{a} \quad (B) \frac{ab}{a+b} \quad (C) \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \quad (D) \frac{(a+b)^2}{a}$$

$$\text{ઉકેલ :} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{-b^2}{(a-x)^2} (-1) - \frac{a^2}{x^2}. \quad \frac{dy}{dx} = 0 \quad \text{લેતાં.}$$

$$\therefore bx = a^2 - ax \quad \text{અથવા} \quad a^2 - ax = -bx \quad (0 < x < a, \quad a, b > 0)$$

$$\therefore x = \frac{a^2}{a+b} \quad (0 < x < a) \quad \text{આથી} \quad a - x = \frac{ab}{a+b}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2a^2}{x^3} + \frac{2b^2}{(a-x)^3} \quad \text{આથી} \quad \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)_{x=\frac{a^2}{a+b}} = \frac{a^2}{a+b} > 0$$

$$\therefore x = \frac{a^2}{a+b} \quad \text{આગળ} \quad y \quad \text{ન્યૂનતમ હોય.}$$

$$\therefore y_{\min} = \frac{b^2(a+b)}{ab} + \frac{a^2(a+b)}{a^2} = (a+b) \left[\frac{b}{a} + 1\right] = \frac{(a+b)^2}{a}$$

જવાબ : (D)

$$(223) \quad \text{ધારો કે } P(x) \text{ એ ચાર ઘાતવાળી બહુપદી છે તથા } \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{P(x)}{x^2}\right) = 2. \quad \text{જો } P(x) \text{ ને } x = 1, 2 \text{ આગળ મહત્તમ}$$

કે ન્યૂનતમ અસ્તિત્વ ધરાવે તો $P(2) = \dots$

$$(A) 0 \quad (B) 1 \quad (C) 2 \quad (D) 3$$

$$\text{ઉકેલ :} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{P(x)}{x^2}\right) = 2. \quad \text{આથી} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{P(x)}{x^2} = 1$$

$$\text{ધારો કે } P(x) = a_0x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{P(x)}{x^2} = 1 \quad \text{હોવાથી, } a_3 = a_4 = 0 \quad \text{તથા} \quad a_2 = 1$$

$$\therefore P(x) = a_0x^4 + a_1x^3 + x^2$$

વળી, $P(x)$ ને $x = 1, 2$ આગળ મહત્તમ કે ન્યૂનતમ મળે છે. આથી $P'(1) = P'(2) = 0$

$$P'(x) = 4a_0x^3 + 3a_1x^2 + 2x$$

$$\therefore 4a_0 + 3a_1 = -2 \text{ અને } 32a_0 + 12a_1 = -4$$

$$\text{આ બંને સમીકરણ ઉકેલતાં } a_0 = \frac{1}{4}, a_1 = -1$$

$$\therefore P(x) = \frac{1}{4}x^4 - x^3 + x^2. \text{ અર્થાત્ } P(2) = \frac{1}{4} 16 - 8 + 4 = 0$$

જવાબ : (A)

(224) ધારો કે $g(x) = 2f\left(\frac{x}{2}\right) + f(1-x)$ અને $0 \leq x \leq 1$ માટે અને $f''(x) < 0$ તો $g(x)$ એ

(A) $\left[0, \frac{2}{3}\right]$ માં ઘટતું વિધેય છે.

(B) $\left(\frac{2}{3}, 1\right)$ માં ઘટતું વિધેય છે.

(C) $\left(0, \frac{2}{3}\right)$ માં વધતું વિધેય છે.

(D) $\left[\frac{2}{3}, 1\right]$ માં વધતું વિધેય છે.

ઉકેલ : આપેલ છે કે $f''(x) < 0$. અર્થાત્ $f'(x)$ એ ઘટતું વિધેય છે.

$$\text{હવે, } g(x) = 2f\left(\frac{x}{2}\right) + f(1-x)$$

$$\therefore g'(x) = f'\left(\frac{x}{2}\right) - f'(1-x)$$

જો $g(x)$ એ વધતું વિધેય હોય તો $g'(x) > 0$

$$\therefore f'\left(\frac{x}{2}\right) > f'(1-x). \text{ અર્થાત્ } \frac{x}{2} < 1-x. \text{ અર્થાત્ } x < \frac{2}{3}$$

જવાબ : (B), (C)

(225) વિધેય $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ માટે $f(x)f(y) - f(xy) = x + y$ અને $f(1) > 0$. વળી,

$h(x) > f(x)f^1(x)$. $h(\sin x + \cos x)$ ચુસ્ત રીતે વધતું હોય તેવા મોટામાં મોટા અંતરાલની લંબાઈ છે.

(A) $\frac{\pi}{4}$

(B) $\frac{\pi}{3}$

(C) $\frac{\pi}{2}$

(D) π

ઉકેલ : $f(x)f(y) - f(xy) = x + y, \forall x, y \in \mathbb{R}$

$$x = 1, y = 1 \text{ લેતાં, } (f(1))^2 - f(1) - 2 = 0 \quad (1)$$

$$\therefore (f(1) - 2)(f(1) + 1) = 0$$

$$\text{વળી, } f(1) > 0. \text{ અર્થાત્ } f(1) = 2$$

$$(1) \text{ માં } y = 1 \text{ મૂકતાં, } f(x) \cdot 2 - f(x) = x + 1$$

$$\therefore f(x) = x + 1 \text{ અર્થાત્ } f^1(x) = x - 1$$

$$\therefore h(x) = f(x)f^1(x) = x^2 - 1$$

$$h(\sin x + \cos x) = (\sin x + \cos x)^2 - 1 = \sin 2x$$

આપણે જાણીએ છીએ કે $\sin x$ ચુસ્ત રીતે વધતું હોય તેવા મોટામાં મોટા અંતરાલની લંબાઈ π છે.

$$\therefore \sin 2x \text{ માટે માંગેલ અંતરાલની લંબાઈ } \frac{\pi}{2} \text{ થાય.}$$

જવાબ : (C)

નિષ્કર્ષ કારક પ્રકારના પ્રશ્નો

(226) વિધાન 1 : $f(x) = \begin{cases} 2x+2, & -4 \leq x < 1 \\ 4x^2 - 16x + 16, & 1 \leq x \leq 4 \end{cases}$ નું મહત્તમ મૂલ્ય 4 છે.


વિધાન 2 : જો વિધેય કોઈ બિંદુ આગળ વિકલનીય ન હોય, તો તે બિંદુ આગળ પણ તેને મહત્તમ કે ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળી શકે.

ઉકેલ : $f(x) = \begin{cases} 2(x+1); & -4 \leq x < 1 \\ 4(x-2)^2; & 1 \leq x \leq 4 \end{cases}$

આકૃતિ પરથી સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે $f(x)$ ને $x = 1$ આગળ સ્થાનીય મહત્તમ મૂલ્ય મળે છે પણ $x = 4$ આગળ તેને વૈશ્વિક મહત્તમ મળશે અને તે 16 છે.

વિધાન 1 : સત્ય નથી.

વિધાન 2 : સત્ય છે. f એ $x = 1$ આગળ વિકલનીય નથી.



આકૃતિ 15.13

(227) **વિધાન 1 :** સમીકરણ $x^3 - 2x^2 - 1 = 0$ નું એક બીજ 2 અને 3 વચ્ચે આવેલ છે.

વિધાન 2 : જો સતત વિધેય f માટે $f(a)$ અને $f(b)$ ભિન્ન ચિહ્નવાળા હોય તો $f(x) = 0$ નું ઓછામાં ઓછું એક બીજ a અને b વચ્ચે મળે.

ઉકેલ : **વિધાન 1 :** $f(x) = x^3 - 2x^2 - 1$, $f(2) = -1 < 0$, $f(3) = 8 > 0$

$\therefore f(2)$ અને $f(3)$ નાં ભિન્ન ચિહ્ન છે.

વળી, $f(x)$ એ સતત વિધેય છે.

$\therefore f$ ને ઓછામાં ઓછું એક બીજ 2 અને 3 વચ્ચે મળે જ.

વિધાન 2 સત્ય છે.

વિધાન 1 એ **વિધાન 2** પર આધારિત છે.

જવાબ : (A)

(228) $f(x) = \begin{cases} 2^x + 1, & -1 \leq x < 0 \\ 2^x, & x = 0 \\ 2^x - 1, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$

વિધાન 1 : વિધેય f સીમિત છે પરંતુ તે મહત્તમ કે ન્યૂનતમ મૂલ્ય ધરાવતું નથી.

વિધાન 2 : f એ $x = 0$ આગળ અસતત છે.

ઉકેલ : અંતરાલ $[-1, 0)$ પર વિધેયનું મૂલ્ય $\frac{3}{2}$ થી 2 સુધી વધે છે. અને $(0, 1]$ પર વિધેયનું મૂલ્ય 0 થી 1 સુધી વધે છે.

વિધેય f એ મૂલ્ય 0 કે 2 ધરાવતું નથી.

વિધેય f એ સીમિત છે પરંતુ તે મહત્તમ કે ન્યૂનતમ મૂલ્ય ધરાવતું નથી.

વિધેય f એ $x = 0$ આગળ અસતત હોવાથી આમ થાય છે.

વિધાન 1 અને **વિધાન 2** સત્ય છે. **વિધાન 1** એ **વિધાન 2** પર આધારિત છે.

જવાબ : (A)

(229) ધારો કે $f(x) = \tan^{-1} x$ અને $g(x) = x - \frac{x^3}{6}$

વિધાન 1 : $f(x) < g(x)$

$(0 < x < 1)$

વિધાન 2 : $h(x) = \tan^{-1} x - x + \frac{x^3}{6}$ એ $[0, 1]$ પર ઘટતું વિધેય છે.

ઉકેલ : ધારો કે $h(x) = \tan^{-1} x - x + \frac{x^3}{6}$

$$\therefore h'(x) = \frac{1}{1+x^2} - 1 + \frac{x^2}{2} = \frac{2-2(1+x^2)+(1+x^2)x^2}{2(1+x^2)} = \frac{x^2(x^2-1)}{2(1+x^2)}$$

જો $x \in [0, 1]$ હોય તો $x^2 - 1 \leq 0$

$$\therefore h'(x) \leq 0$$

$\therefore h$ એ $[0, 1]$ પર ઘટતું વિધેય છે. વિધાન 2 સત્ય છે.

વળી, $0 < x \leq 1$

$$\therefore h(0) > h(x). \quad \text{આથી} \quad h(x) < 0$$

$$\therefore \tan^{-1} x - x + \frac{x^3}{6} < 0. \quad \text{આથી} \quad \tan^{-1} x < x - \frac{x^3}{6}$$

$$\therefore f(x) < g(x)$$

$\therefore$ વિધાન 1 સત્ય છે. વિધાન 1 એ વિધાન 2 પર આધારિત છે.

જવાબ : (A)

(230) વિધાન 1 : $e^\pi > \pi^e$

વિધાન 2 : વિધેય $\frac{1}{x^x}$ ($x > 0$) ને $x = e$ આગળ સ્થાનીય મહત્તમ મૂલ્ય મળે છે.

ઉકેલ : ધારો કે $f(x) = \frac{1}{x^x}$ આથી $\log f(x) = \frac{\log x}{x}$

$$\therefore \frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{x \cdot \frac{1}{x} - \log x}{x^2} = \frac{1 - \log x}{x^2}$$

$$\therefore f'(x) = \frac{1}{x^x} \left(\frac{1 - \log x}{x^2} \right)$$

જો $x > e$ તો $f'(x) < 0$ અને જો $0 < x < e$ તો $f'(x) > 0$

$\therefore f$ ને $x = e$ આગળ સ્થાનીય મહત્તમ મળે.

વિધાન 2 સત્ય છે.

વળી, $\pi > e$ અને f એ (e, ∞) પર ઘટતું વિધેય છે.

$$\therefore f(\pi) < f(e) \Rightarrow \frac{1}{\pi^\pi} < \frac{1}{e^e} \Rightarrow \pi^e < e^\pi$$

$\therefore$ વિધાન 1 સત્ય છે.

વિધાન 1 એ વિધાન 2 પર આધારિત નથી.

જવાબ : (B)

(231) **વિધાન 1 :** $|\tan x - \tan y| < |x - y|, \forall x, y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

વિધાન 2 : જો વિધેય f એ કોઈક વિવૃત્ત અંતરાલ પર વિકલનીય હોય તથા $|f'(x)| \leq M$ તો

$$|f(x) - f(y)| \leq M |x - y|$$

ઉકેલ : વિધેય f માટે અંતરાલ $[x, y]$ પર મધ્યકમાન પ્રમેયનો ઉપયોગ કરતાં કોઈક $c \in (x, y)$ એવો મળે કે જેથી

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(c)$$

$$|f(y) - f(x)| = |f'(c)| |y - x| \leq M |y - x| \quad (|f'(x)| \leq M)$$

વિધાન 2 સત્ય છે.

જો $|f'(x)| \geq M$ હોય તો $|f(y) - f(x)| \geq M |y - x|$

$$\therefore f(x) = \tan x \text{ મૂકતાં, } f'(x) = \sec^2 x. \quad \text{આથી} \quad |f'(x)| \geq 1$$

$$\therefore |\tan x - \tan y| \geq |y - x|$$

$\therefore$ **વિધાન 1** સત્ય નથી.

જવાબ : (D)

•