


- સંકર સંખ્યાનું સ્વરૂપ $z = a + ib$, જ્યાં, $a, b \in \mathbb{R}$

$$a = \operatorname{Re}(z), b = \operatorname{Im}(z) \text{ તથા } i^2 = -1$$

- સંકર સંખ્યા $z = a + ib$ ને (a, b) વડે દર્શાવતાં તેનું ભૌમિતિક નિરૂપણ $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ માં કરી શકાય છે. તેને આર્ગન્ડ આકૃતિ કહે છે.

X-અક્ષને વાસ્તવિક અક્ષ તેમજ Y-અક્ષને કાલ્પનિક અક્ષ કહે છે.



આકૃતિ 2.1

- સંકર સંખ્યાના ગણને $\mathbb{C}$ વડે દર્શાવાય છે.
- સંકર સંખ્યા $z = a + ib$ નો માનક $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ થાય.
- સંકર સંખ્યા $z = a + ib$ નું ધ્રુવીય (ત્રિકોણમિતિય) સ્વરૂપ

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta} \quad \text{જ્યાં } r = \sqrt{a^2 + b^2} = |z| \quad (e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta) \quad (\text{ઓઈલર સ્વરૂપ})$$

- $z = a + ib$ ની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા $\bar{z} = a - ib$ થાય. જો $\theta \in (-\pi, \pi]$ તો θ ને z નો મુખ્ય કોણાંક કહે છે. તેને $\arg(z)$ વડે દર્શાવાય છે.
- જો $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}$ સ્વરૂપમાં હોય, તો $\bar{z} = r(\cos \theta - i \sin \theta) = re^{-i\theta}$ લખી શકાય.

$$|z| = |\bar{z}|$$

$$\arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$$

$$z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z), z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$$

$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$$

$$\arg(\bar{z}) = -\arg(z)$$

$$\arg\left(\frac{z}{z}\right) = 2\arg z$$

$$z \bar{z} = |z|^2$$

$$\arg(z^n) = n \arg(z)$$

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$$

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

$$\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$$

$$|z_1 - z_2| \geq ||z_1| - |z_2||$$

$$\left(\frac{\bar{z}_1}{z_2}\right) = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}, z_2 \neq 0$$

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$$

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, z_2 \neq 0$$

$$\text{જો } z = re^{i\theta} \text{ તો } z^n = r^n e^{in\theta}, n \in \mathbb{Q}$$

(દ-મુર પ્રમેય)

- 1 નાં ઘનમૂળ :

$$1, \omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}, \omega^2 = \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2} \text{ એ } 1 \text{ નાં ઘનમૂળ છે.}$$

$$1 + \omega + \omega^2 = 0, \omega^3 = 1.$$

- આર્ગન્ડ આકૃતિમાં 1 નાં ઘનમૂળ એ સમબાજુ ત્રિકોણનાં શિરોબિંદુ થાય.
- 1 નાં ચતુર્થ મૂળ
1, i , -1 , $-i$ એ 1 નાં ચતુર્થ મૂળ છે.
- $z = a + ib = r (\cos \theta + i \sin \theta)$ નાં n મૂળ $r^{\frac{1}{n}} \left[\cos \left(\frac{2k\pi + \theta}{n} \right) + i \sin \left(\frac{2k\pi + \theta}{n} \right) \right]$ જ્યાં $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$
- સમીકરણ $|z - z_0| = r$ એ z_0 કેન્દ્ર તથા r ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ દર્શાવે છે.
- જો $b^2 - 4ac < 0$, તો દ્વિઘાત સમીકરણ $ax^2 + bx + c = 0$ જ્યાં, $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ નાં બીજ $\frac{-b \pm i\sqrt{4ac-b^2}}{2a}$ છે.
- $|z_1 \pm z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 \pm 2\operatorname{Re}(z_1 \cdot \overline{z_2})$

જો $z = x + iy$ તો,

$$\arg z = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right), \quad x > 0, y \geq 0$$

$$= \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) + \pi, \quad x < 0, y \geq 0$$

$$= \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) - \pi, \quad x < 0, y < 0$$

$$= \frac{\pi}{2}, \quad x = 0, y > 0$$

$$= -\frac{\pi}{2}, \quad x = 0, y < 0$$

જો $x = 0, y = 0$ તો $\arg z$ ન મળે.

જો z_1, z_2 એ આર્ગન્ડ આકૃતિમાં બે નિશ્ચિત બિંદુ હોય તો

- $|z - z_1| = |z - z_2| \Rightarrow z$ એ z_1 અને z_2 ના લંબદ્વિભાજક પરનું બિંદુ છે.
- $|z - z_1| + |z - z_2| = |z_1 - z_2| \Rightarrow z$ નો બિંદુગણ z_1 અને z_2 થી બનતો રેખાખંડ છે.
- $|z - z_1| + |z - z_2| = \text{અચળ} (z_1 \neq z_2) \Rightarrow z$ નો બિંદુગણ ઉપવલય છે.
- $|z - z_1| - |z - z_2| = |z_1 - z_2| \Rightarrow z$ નો બિંદુગણ z_1 અને z_2 થી બનતો રેખાખંડ છે પરંતુ z એ રેખાખંડ પર ન હોય.
- $|z - z_1| - |z - z_2| = \text{અચળ} (z_1 \neq z_2) \Rightarrow z$ નો બિંદુગણ અતિવલય છે.
- $|z - z_1|^2 + |z - z_2|^2 = |z_1 - z_2|^2 \Rightarrow z$ નો બિંદુગણ એ વ્યાસનાં અંત્યબિંદુઓ z_1 અને z_2 હોય તેવું વર્તુળ છે.
- $|z - z_1| = k |z - z_2|, (k \neq 1) \Rightarrow z$ નો બિંદુગણ વર્તુળ છે.
- $\arg \left(\frac{z - z_1}{z - z_2} \right) = \text{અચળ} \Rightarrow z$ નો બિંદુગણ વૃત્તખંડ છે.
- $\arg \left(\frac{z - z_1}{z - z_2} \right) = \pm \frac{\pi}{2} \Rightarrow z$ નો બિંદુગણ એ વ્યાસનાં શિરોબિંદુઓ z_1 અને z_2 હોય તેવું વર્તુળ છે.

- $\arg \left(\frac{z-z_1}{z-z_2} \right) = 0$ અથવા $\pi \Rightarrow z$ નો બિંદુગણ એ z_1 અને z_2 માંથી પસાર થતી રેખા છે.

- જો $\left| z + \frac{1}{z} \right| = a$, તો $|z|$ નું મહત્તમ તથા ન્યૂનતમ મૂલ્ય $\frac{a+\sqrt{a^2+4}}{2}$ તથા $\frac{-a+\sqrt{a^2+4}}{2}$ છે.


ધારો કે z_1, z_2, z_3 એ ΔABC ના ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં આવેલ શિરોબિંદુઓ છે.

$$AB = |z_1 - z_2|, AC = |z_3 - z_1| \text{ અને}$$

$$BC = |z_3 - z_2| = |(z_3 - z_1) - (z_2 - z_1)|$$

$$\text{જો } \arg \left(\frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1} \right) = \alpha \text{ તથા } \left| \frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1} \right| = \frac{AC}{AB} \text{ હોય તો}$$

$$\frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1} = \frac{AC}{AB} (\cos \alpha + i \sin \alpha) \text{ થાય.}$$



જો $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = z_1 z_2 + z_2 z_3 + z_3 z_1$ તો ΔABC એ સમબાજુ ત્રિકોણ થશે.

બહુ વિકલ્પી પ્રશ્નો

- (1) જો ચતુર્થાંત સમીકરણ $x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) નું કોઈપણ બીજ વાસ્તવિક સંખ્યા ન હોય તથા બે બીજનો સરવાળો $3 + 4i$ હોય અને બાકીનાં બે બીજનો ગુણાકાર $13 + i$ હોય, તો $b = \dots$
- (A) 30 (B) 6 (C) 51 (D) 15

ઉકેલ : આપેલ સમીકરણ $x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ છે. (1)

ધારો કે આપેલ સમીકરણનાં બીજ $\alpha \pm i\beta, \gamma \pm i\delta$ છે.

$\therefore$ આપેલ સમીકરણ

$$(x - (\alpha + i\beta))(x - (\alpha - i\beta))(x - (\gamma + i\delta))(x - (\gamma - i\delta)) = 0$$

$$\therefore (x^2 - 2\alpha x + \alpha^2 + \beta^2)(x^2 - 2\gamma x + \gamma^2 + \delta^2) = 0 \quad (2)$$

આપણે b ની કિંમત શોધવી છે. સમીકરણ (1) અને (2) ની સરખામણી કરતાં, x^2 નો સહગુણક b થશે.

$$\therefore b = \alpha^2 + \beta^2 + 4\alpha\gamma + \gamma^2 + \delta^2 \quad (3)$$

આપેલ છે કે $\alpha + i\beta + \gamma + i\delta = 3 + 4i$

$$\therefore \alpha + \gamma = 3 \text{ અને } \beta + \delta = 4$$

$$\therefore \alpha^2 + \gamma^2 + 2\alpha\gamma = 9 \quad (4)$$

$$\text{અને } \beta^2 + \delta^2 + 2\beta\delta = 16$$

$$\therefore \beta^2 + \delta^2 = 16 - 2\beta\delta \quad (5)$$

સમીકરણ (4), (5)ની કિંમતો સમીકરણ (3)માં મૂકતા,

$$b = 9 + 2\alpha\gamma + 16 - 2\beta\delta \quad (6)$$

વળી, $(\alpha - i\beta)(\gamma - i\delta) = 13 + i$. આથી $(\alpha\gamma - \beta\delta) - i(\alpha\delta + \beta\gamma) = 13 + i$

$$\therefore \alpha\gamma - \beta\delta = 13$$

સમીકરણ (6) પરથી, $b = 25 + 2(13) = 51$

જવાબ : (C)

- (2) z_1 અને z_2 ભિન્ન સંકર સંખ્યાઓ છે તથા $|z_1| = |z_2|$. જો z_1 નો વાસ્તવિક ભાગ ધન સંખ્યા હોય તથા z_2 નો

કાલ્પનિક ભાગ ઋણ સંખ્યા હોય, તો $\frac{z_1 + z_2}{z_1 - z_2}$ એ છે. $\left(\frac{z_1 + z_2}{z_1 - z_2} \neq 0 \right)$

- (A) શુદ્ધ કાલ્પનિક સંખ્યા (B) વાસ્તવિક અને ધન (C) વાસ્તવિક અને ઋણ (D) શૂન્ય સંખ્યા

ઉકેલ : ધારો કે $z_1 = a + ib$ અને $z_2 = c - id$ જ્યાં $a > 0, d > 0$

$$|z_1| = |z_2| \Rightarrow a^2 + b^2 = c^2 + d^2 \quad (1)$$

$$\text{હવે, } \frac{z_1 + z_2}{z_1 - z_2} = \frac{(a+ib)+(c-id)}{(a+ib)-(c-id)} = \frac{[(a+c)+i(b-d)]}{[(a-c)+i(b+d)]}$$

$$= \frac{[(a+c)+i(b-d)][(a-c)-i(b+d)]}{[(a-c)+i(b+d)][(a-c)-i(b+d)]}$$

$$= \frac{(a^2 + b^2) - (c^2 + d^2) - 2i(ad + bc)}{a^2 + c^2 - 2ac + b^2 + d^2 + 2bd}$$

$$= \frac{-(ad + bc)i}{a^2 + b^2 - ac + bd}$$

((1)નો ઉપયોગ કરતી)

$$\therefore \frac{z_1 + z_2}{z_1 - z_2} \text{ એ શુદ્ધ કાલ્પનિક સંખ્યા થાય.}$$

જવાબ : (A)

$$(3) \quad \text{જો } |z| = 1 \text{ અને } z^{2n} + 1 \neq 0 \text{ તો } \frac{z^n}{z^{2n} + 1} - \frac{z^{-n}}{\left(\frac{1}{z}\right)^{2n} + 1} = \dots$$

(A) 3

(B) 0

(C) i

(D) 1

ઉકેલ : ધારો કે $z = \cos\theta + i \sin\theta$

$$\therefore \frac{z^n}{z^{2n} + 1} - \frac{z^{-n}}{\left(\frac{1}{z}\right)^{2n} + 1} = \frac{\cos n\theta + i \sin n\theta}{1 + \cos 2n\theta + i \sin 2n\theta} - \frac{\cos n\theta - i \sin n\theta}{1 + \cos 2n\theta - i \sin 2n\theta}$$

$$= \frac{\cos n\theta + i \sin n\theta}{2 \cos n\theta (\cos n\theta + i \sin n\theta)} - \frac{\cos n\theta - i \sin n\theta}{2 \cos n\theta (\cos n\theta - i \sin n\theta)}$$

$$= \frac{1}{2 \cos n\theta} - \frac{1}{2 \cos n\theta} = 0$$

જવાબ : (B)

બીજી રીત : $|z| = 1 \Rightarrow z\bar{z} = 1$

$$\frac{z^n}{z^{2n} + 1} - \frac{z^{-n}}{\left(\frac{1}{z}\right)^{2n} + 1} = \frac{z^n}{z^{2n} + 1} - \frac{z^{-n}}{\left(\frac{1}{z}\right)^{2n} + 1} = \frac{z^n}{z^{2n} + 1} - \frac{z^{2n} \cdot z^{-n}}{1 + z^{2n}} = \frac{z^n}{z^{2n} + 1} - \frac{z^n}{z^{2n} + 1} = 0$$

$$(4) \quad \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{|z-1|+4}{3|z-1|-2} \right) > 1 \quad (\text{જ્યાં } |z-1| \neq \frac{2}{3}) \text{ અસમતાનું પાલન કરતી સંકર સંખ્યાનો બિંદુગણ } \dots$$

(A) વર્તુળ છે.

(B) વર્તુળની અંદરનો ભાગ.

(C) વર્તુળનો બહારનો ભાગ.

(D) રેખા છે.

$$\text{ઉકેલ : } \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{|z-1|+4}{3|z-1|-2} \right) > 1 = \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2} \right)$$

$$\therefore \left(\frac{|z-1|+4}{3|z-1|-2} \right) < \frac{1}{2} \quad (\log_a x \text{ એ } a < 1 \text{ માટે ઘટતું વિધેય છે.})$$

$$\therefore 2|z-1| + 8 < 3|z-1| - 2$$

$$\therefore |z-1| > 10 \text{ વર્તુળની બહારનો ભાગ છે.}$$

જવાબ : (C)

$$(5) \quad \text{જો } \alpha, \beta \text{ એ } x^2 - 2x + 2 = 0 \text{ ની બીજ હોય, તો } \alpha^n + \beta^n = \dots$$

$$(A) 2^{\frac{n}{2}} \cos \frac{n\pi}{4}$$

$$(B) 2^{\frac{n}{2}+1} \cos \frac{n\pi}{4}$$

$$(C) 2^{\frac{n}{2}-1} \cos \frac{n\pi}{4}$$

$$(D) 0$$

$$\text{ઉકેલ : } x^2 - 2x + 2 = 0$$

$$\therefore x = \frac{2 \pm \sqrt{4-8}}{2} = 1 \pm i$$

$$\therefore \text{હારેલ } \alpha = 1 + i, \quad \beta = 1 - i,$$

$$\alpha^n + \beta^n = (1 + i)^n + (1 - i)^n$$

$$= \left[\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \right]^n + \left[\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4} \right) \right]^n$$

$$= 2^{\frac{n}{2}} \left[\cos \left(\frac{n\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{n\pi}{4} \right) + \cos \left(\frac{n\pi}{4} \right) - i \sin \left(\frac{n\pi}{4} \right) \right] = 2^{\frac{n}{2}} \cdot 2 \cos \left(\frac{n\pi}{4} \right) = 2^{\frac{n}{2}+1} \cos \left(\frac{n\pi}{4} \right) \quad \text{જવાબ : (B)}$$

$$(6) \quad \text{જો } x^2 - x\sqrt{3} + 1 = 0, \text{ તો } \sum_{n=1}^{36} \left(x^n - \frac{1}{x^n} \right)^2 = \dots\dots$$

$$(A) 0$$

$$(B) -72$$

$$(C) 72$$

$$(D) 36$$

$$\text{ઉકેલ : } x^2 - x\sqrt{3} + 1 = 0$$

$$x = \frac{\sqrt{3} \pm \sqrt{3-4}}{2} = \frac{\sqrt{3} \pm i}{2}$$

$$\therefore x = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \text{ લેતાં, } x = \cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}$$

$$\therefore x^{2n} = \cos \frac{n\pi}{3} + i \sin \frac{n\pi}{3} \text{ તથા } x^{-2n} = \cos \frac{n\pi}{3} - i \sin \frac{n\pi}{3}$$

$$\therefore \left(x^n - \frac{1}{x^n} \right)^2 = x^{2n} + \frac{1}{x^{2n}} - 2 = x^{2n} + x^{-2n} - 2 = 2 \cos \frac{n\pi}{3} - 2$$

$$\text{હારે, } \sum_{n=1}^{36} \left(x^n - \frac{1}{x^n} \right)^2 = \sum_{n=1}^{36} \left(-2 + 2 \cos \frac{n\pi}{3} \right)$$

$$= -2 \times 36 + 2 \left[\cos \frac{\pi}{3} + \cos \frac{2\pi}{3} + \dots + \cos \frac{36\pi}{3} \right]$$

$$= -72 + 2 \frac{\left[\cos \left(\frac{\pi}{3} + \frac{35\pi}{6} \right) \sin \left(\frac{36\pi}{3 \times 2} \right) \right]}{\sin \frac{\pi}{6}}$$

$$\left(\cos \alpha + \cos (\alpha + \beta) + \dots + \cos n\beta \right) = \frac{\sin \frac{n\beta}{2}}{\sin \frac{\beta}{2}} \cos \left(\alpha + \frac{(n-1)\beta}{2} \right) \quad \text{પદ સુધી}$$

$$= -72 + 0$$

$$= -72$$

$$\text{જવાબ : (B)}$$

$$(7) \quad \text{જો } x^2 + x + 1 = 0 \text{ ની બે બીજ } a \text{ અને } b \text{ હોય, તો જેની બીજ } a^{19} \text{ અને } b^7 \text{ હોય, તેવું સમીકરણ } \dots\dots$$

$$(A) x^2 - x + 1 = 0$$

$$(B) x^2 - x - 1 = 0$$

$$(C) x^2 + x - 1 = 0$$

$$(D) x^2 + x + 1 = 0$$

$$\text{ઉકેલ : } x^2 + x + 1 = 0 \text{ ની બે બીજ } a \text{ અને } b \text{ હોય, તો } a = \omega \text{ તથા } b = \omega^2 \text{ લઈ શકાય, જ્યાં } \omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$$

$$\text{હવે, } a^{19} = \omega^{19} = \omega^{18} \quad \omega = \omega \quad b^7 = (\omega^2)^7 = \omega^{14} = \omega^2$$

$$\text{તથા માંગેલ સમીકરણ } x^2 - (\omega + \omega^2)x + \omega \cdot \omega^2 = 0$$

$$x^2 + x + 1 = 0$$

$$(\omega + \omega^2 = -1, \omega \cdot \omega^2 = \omega^3 = 1) \text{ જવાબ : (D)}$$

- (8) $f(z)$ ને $z - i$ વડે ભાગીએ તો શેષ i મળે છે તથા જો તેને જ $z + i$ વડે ભાગીએ તો શેષ $1 + i$ મળે છે. જો $f(z)$ ને $z^2 + 1$ વડે ભાગીએ તો મળતી શેષ

$$(A) \frac{1}{2}(iz + 1)$$

$$(B) \frac{1}{2}(iz + 1 + 2i)$$

$$(C) iz + 1 + i$$

$$(D) 0$$

ઉકેલ : $f(z)$ ને $z - i$ વડે ભાગીએ તો શેષ i મળે છે.

$$\therefore f(i) = i. \quad (1)$$

$$\text{તે જ રીતે, } f(-i) = 1 + i. \quad (2)$$

$z^2 + 1$ એ દ્વિઘાત પદાવલિ છે. તેથી $f(z)$ ને $z^2 + 1$ વડે ભાગીએ, તો $az + b$ ($a, b \in \mathbb{R}$) પ્રકારની શેષ મળે.

$$\text{ધારો કે } f(z) = g(z)(z^2 + 1) + az + b \quad (3)$$

$$\therefore f(i) = g(i)(i^2 + 1) + ai + b$$

$$\therefore i = ai + b \quad (4)$$

$$\text{તથા } f(-i) = g(-i)((-i)^2 + 1) + a(-i) + b$$

$$1 + i = -ai + b \quad (5)$$

$$(4) \text{ અને } (5) \text{ ને ઉકેલતાં, } b = \frac{1}{2} + i, a = \frac{i}{2}$$

$$\therefore \text{ માંગેલ શેષ } az + b = \frac{1}{2} iz + \frac{1}{2} + i = \frac{1}{2}(iz + 1 + 2i)$$

$$\text{જવાબ : (B)}$$

- (9) ધારો કે $a = e^{\frac{i2\pi}{13}}$. $\alpha = a + a^3 + a^4 + a^{-4} + a^{-3} + a^{-1}$ તથા $\beta = a^2 + a^5 + a^6 + a^{-6} + a^{-5} + a^{-2}$ જેની બીજ હોય તેવું દ્વિઘાત સમીકરણ છે.

$$(A) x^3 - x - 3 = 0$$

$$(B) x^2 - x + 2 = 0$$

$$(C) x^2 + x + 3 = 0$$

$$(D) x^2 + x - 3 = 0$$

ઉકેલ : બીજોનો સરવાળો

$$\alpha + \beta = (a + a^3 + a^4 + a^{-4} + a^{-3} + a^{-1}) + (a^2 + a^5 + a^6 + a^{-6} + a^{-5} + a^{-2})$$

$$= (a + a^3 + a^4 + a^9 + a^{10} + a^{12}) + (a^2 + a^5 + a^6 + a^7 + a^8 + a^{11}) \quad (a^{13} = 1)$$

$$= a + a^2 + a^3 + \dots + a^{12}$$

$$= \frac{a(1 - a^{12})}{1 - a} = \frac{a(1 - a^{13} a^{-1})}{1 - a} = \frac{a(1 - a^{-1})}{1 - a} = -1 \quad (a^{13} = 1)$$

બીજોનો ગુણાકાર

$$\alpha \beta = (a + a^3 + a^4 + a^{-4} + a^{-3} + a^{-1})(a^2 + a^5 + a^6 + a^{-6} + a^{-5} + a^{-2})$$

$$= (a + a^3 + a^4 + a^9 + a^{10} + a^{12})(a^2 + a^5 + a^6 + a^7 + a^8 + a^{11})$$

$$= a^3(1 + a^2 + a^3 + a^8 + a^9 + a^{11})(1 + a^3 + a^4 + a^5 + a^6 + a^9)$$

$$= a^3[1 + a^2 + 2(a^3 + a^5 + a^7 + a^9 + a^{13} + a^{15} + a^{17}) + a^4 + 3(a^6 + a^8 + a^{11} + a^{12} + a^{14}) + (a^2 + a^{25} + a^{18} + a^{20})]$$

$$= 3(a + a^2 + a^3 + \dots + a^{12}) = 3(-1) = -3$$

$$\therefore \text{ માંગેલ દ્વિઘાત સમીકરણ } x^2 - (-1)x - 3 = 0$$

$$x^2 + x - 3 = 0$$

$$\text{જવાબ : (D)}$$

(10) જો $\left| \frac{1-iz}{z-i} \right| = 1$, તો

- (A) z એ શુદ્ધ કાલ્પનિક સંખ્યા હોય.
(C) $P(z)$ એ બીજા ચરણમાં હોય.

- (B) z એ વાસ્તવિક સંખ્યા હોય.
(D) $P(z)$ એ ત્રીજા ચરણમાં હોય.

ઉકેલ : $z = x + iy$ લેતાં,

$$|1 - iz|^2 = |z - i|^2$$

$$\therefore |1 - i(x + iy)|^2 = |x + iy - i|^2$$

$$\therefore |1 - ix + y|^2 = |x + i(y - 1)|^2$$

$$\therefore (1 + y)^2 + x^2 = x^2 + (y - 1)^2$$

$$\therefore y = 0$$

$\therefore z$ એ વાસ્તવિક સંખ્યા થશે.

બીજી રીત : $|z - i| = |1 - iz| = |i + z|$

$\therefore P(z)$ એ $P(i)$ તથા $P(-1)$ ના લંબદુભાજક પર છે

$\therefore P(z)$ X-અક્ષ પર છે.

$\therefore z$ વાસ્તવિક સંખ્યા છે.

જવાબ : (B)

(11) જો $z \neq 0$, તો $|z^i|$ ની મહત્તમ સીમા થશે.

(A) $|z|$

(B) 1

(C) $e^{-\pi}$

(D) e^{π}

ઉકેલ : ધારો કે $z = re^{i\theta}$, $-\pi < \theta \leq \pi$.

$$\therefore z^i = r^i e^{-\theta} = e^{\log r^i} \cdot e^{-\theta}$$

$$= e^{(i \log r - \theta)}$$

$$= (\cos(\log r) + i \sin(\log r)) e^{-\theta}$$

$$\therefore |z^i| = |e^{-\theta}| < e^{\pi} \quad -\pi < \theta \leq \pi, \quad -\pi \leq -\theta < \pi$$

$\therefore |z^i|$ ની મહત્તમ સીમા e^{π} થાય.

જવાબ : (D)

(12) જો z એ સંકર સંખ્યા હોય તથા $|z| \geq 2$ તો $\left| z + \frac{1}{2} \right|$ ની ન્યૂનતમ કિંમત

(A) અંતરાલ $(1, 2)$ માં છે. (B) $\frac{5}{2}$ થી વધુ હોય.

(C) $\frac{3}{2}$ થી વધુ તથા $\frac{5}{2}$ થી ઓછી હોય. (D) $\frac{5}{2}$ હોય.

ઉકેલ : રીત 1

ભૌમિતિક રીતે $|z| = 2$ એ ઊગમબિંદુ કેન્દ્ર તથા 2 ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ છે.

$|z| \geq 2$ એ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ વર્તુળ તેમજ તેની બહારનો પ્રદેશ થશે.

$$\left| z + \frac{1}{2} \right| = \left| z - \left(-\frac{1}{2} \right) \right| \text{ એ } z \text{ તેમજ } \left(-\frac{1}{2}, 0 \right) \text{ વચ્ચેનું અંતર છે. આ અંતર}$$


$(-2, 0)$ આગળ ન્યૂનતમ થશે જે $\frac{3}{2}$ છે.

રીત 2

$$\left| z + \frac{1}{2} \right| = \left| z - \left(-\frac{1}{2} \right) \right| \geq \left| |z| - \left| -\frac{1}{2} \right| \right| = \left| |z| - \frac{1}{2} \right|$$

$|z| \geq 2$ ની ન્યૂનતમ કિંમત જ્યાં $|z| = 2$ હોય ત્યાં થશે.

$$\therefore \left| z + \frac{1}{2} \right|_{\min} = \left| 2 - \frac{1}{2} \right| = \frac{3}{2}$$



આકૃતિ 2.3

જવાબ : (A)

(13) $\bar{z} = z^2$ શરતનું પાલન કરતી કેટલી સંકર સંખ્યાઓ મળે ?

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

ઉકેલ : ધારો કે $z = x + iy$

$$\text{હવે } \bar{z} = z^2$$

$$\therefore x - iy = (x^2 - y^2) + i(2xy)$$

$$\therefore x = x^2 - y^2 \text{ અને } -y = 2xy$$

$$\text{બીજા પરિણામ પરથી, } y = 0 \text{ અથવા } x = -\frac{1}{2}$$

$$\text{ધારો કે } y = 0. \text{ આથી } x = x^2 - y^2 \text{ પરથી } x = x^2$$

$$\therefore x = 0 \text{ અથવા } x = 1$$

$$\therefore z = 0 \text{ અથવા } z = 1$$

$$\text{હવે જો } x = -\frac{1}{2} \text{ તો } -\frac{1}{2} = \frac{1}{4} - y^2. \text{ આથી } y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{આમ, } z = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ અથવા } z = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

આપેલ શરતનું પાલન કરતી કુલ ચાર સંકર સંખ્યાઓ મળે.

જવાબ : (D)

(14) શૂન્યેતર ભિન્ન સંકર સંખ્યાઓ z અને w માટે જો $|z|^2 w - |w|^2 z = z - w$ તો

(A) $z = -w$

(B) $z = \bar{w}$

(C) $z \bar{w} = 1$

(D) $zw = 1$

ઉકેલ : $|z|^2 w - |w|^2 z = z - w$ ની પુનઃગોઠવણી કરતાં,

$$\frac{z}{w} = \frac{1 + |z|^2}{1 + |w|^2} \quad (1)$$

$$\therefore \frac{z}{w} \text{ એ વાસ્તવિક સંખ્યા થશે. ધારો કે } \frac{z}{w} = k \text{ જ્યાં } k \in \mathbb{R}$$

$$\therefore \frac{kw}{w} = \frac{1 + k^2 |w|^2}{1 + |w|^2} \quad ((1) \text{ પરથી})$$

$$\therefore k + k|w|^2 = 1 + k^2 |w|^2$$

$$\therefore k - 1 = k |w|^2 (k - 1)$$

$$\therefore (k|w|^2 - 1)(k - 1) = 0$$

$$\therefore k = 1 \text{ અથવા } k = \frac{1}{|w|^2}$$

$$\therefore \frac{z}{w} = 1 \text{ અથવા } \frac{z}{w} = \frac{1}{|w|^2} = \frac{1}{w\bar{w}} \quad (z \neq w, w \neq 0)$$

$$z\bar{w} = 1$$

જવાબ : (C)

(15) જો $\left|z - \frac{4}{z}\right| = 2$ હોય, તો $|z|$ નાં મહત્તમ તથા ન્યૂનતમ મૂલ્યો વચ્ચેનો તફાવત છે. ($z \neq 0$)

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

$$\text{ઉકેલ : } \left|z - \frac{4}{z}\right| \geq \left||z| - \frac{4}{|z|}\right|$$

$$\therefore \left||z| - \frac{4}{|z|}\right| \leq \left|z - \frac{4}{z}\right|$$

$$\therefore \left| \left| z \right| - \frac{4}{\left| z \right|} \right| \leq 2$$

$$\therefore -2 \leq \left| z \right| - \frac{4}{\left| z \right|} \leq 2$$

$$\therefore \left| z \right|^2 + 2\left| z \right| - 4 \geq 0 \text{ અને } \left| z \right|^2 - 2\left| z \right| - 4 \leq 0$$

$$(\left| z \right| + 1)^2 \geq 5 \text{ તથા } (\left| z \right| - 1)^2 \leq 5$$

$$\left| \left| z \right| + 1 \right| \geq \sqrt{5} \text{ તથા } \left| \left| z \right| - 1 \right| \leq \sqrt{5}$$

$$\therefore \left| z \right| + 1 \geq \sqrt{5} \text{ તથા } -\sqrt{5} \leq \left| z \right| - 1 \leq \sqrt{5}$$

$$\therefore \left| z \right| \geq \sqrt{5} - 1 \text{ તથા } 1 - \sqrt{5} \leq \left| z \right| \leq \sqrt{5} + 1$$

$$\sqrt{5} - 1 \leq \left| z \right| \leq \sqrt{5} + 1$$

$$\therefore \text{ મહત્તમ } \left| z \right| - \text{ ન્યૂનતમ } \left| z \right| = (\sqrt{5} + 1) - (\sqrt{5} - 1) = 2$$

$$\therefore \left| z \right| \text{ નાં મહત્તમ તથા ન્યૂનતમ મૂલ્યો વચ્ચેનો તફાવત 2 થશે.}$$

જવાબ : (B)

(16) જો z એ વાસ્તવિક ન હોય તેવી સંકર સંખ્યા વર્તુળ $\left| z \right| = 1$ પર આવેલ છે, તો $z = \dots\dots$

$$(A) \frac{1 - i \tan\left(\frac{\arg z}{2}\right)}{1 + i \tan\left(\frac{\arg z}{2}\right)} \quad (B) \frac{1 + i \tan\left(\frac{\arg z}{2}\right)}{1 - i \tan\left(\frac{\arg z}{2}\right)} \quad (C) \frac{1 - i \tan(\arg z)}{1 + i \tan(\arg z)} \quad (D) \frac{1 + i \tan(\arg z)}{1 - i \tan(\arg z)}$$

ઉકેલ : $\left| z \right| = 1$ હોવાથી $z = \cos \alpha + i \sin \alpha$ આથી $\arg(z) = \alpha$

$$\begin{aligned} \therefore z &= \frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} + i \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} \\ &= \frac{\left(1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}\right) + i 2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} \\ &= \frac{\left(1 + i \tan \frac{\alpha}{2}\right)^2}{\left(1 + i \tan \frac{\alpha}{2}\right)\left(1 - i \tan \frac{\alpha}{2}\right)} = \frac{1 + i \tan \frac{\alpha}{2}}{1 - i \tan \frac{\alpha}{2}} \\ &= \frac{1 + i \tan\left(\frac{\arg z}{2}\right)}{1 - i \tan\left(\frac{\arg z}{2}\right)} \end{aligned}$$

જવાબ : (B)

(17) $\cos y \sin y + \cos^2 y \sin 2y + \cos^3 y \sin 3y + \dots n$ પદ $\dots\dots$

$$(A) \tan y (1 - \sin^n y \sin ny) \quad (B) \tan y (1 - \cos^n y \cos ny) \\ (C) \cot y (1 - \sin^n y \sin ny) \quad (D) \cot y (1 - \cos^n y \cos ny)$$

ઉકેલ : ધારો કે $\cos y = a$

$$S = a \sin y + a^2 \sin 2y + a^3 \sin 3y + \dots n \text{ પદ}$$

$$C = a \cos y + a^2 \cos 2y + a^3 \cos 3y + \dots n \text{ પદ}$$

$$\therefore C + iS = ae^{iy} + a^2 e^{i2y} + a^3 e^{i3y} + \dots n \text{ પદ}$$

$$= \frac{ae^{iy} [1 - a^n e^{iny}]}{1 - a e^{iy}}$$

$$= \frac{ae^{iy} [1 - a^n e^{iny}] [1 - ae^{-iy}]}{1 - a(e^{iy} + e^{-iy}) + a^2 e^{iy} e^{-iy}}$$

$$= \frac{(ae^{iy} - a^2) [1 - a^n e^{iny}]}{1 - a(2 \cos y) + a^2}$$

$$\therefore C + iS = [\cos y (\cos y + i \sin y) - \cos^2 y] \cdot \frac{[1 - \cos^n y (\cos ny + i \sin ny)]}{1 - 2 \cos^2 y + \cos^2 y}$$

$$(a = \cos y, \text{ તથા } e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta)$$

$$= \frac{i \sin y \cos y}{\sin^2 y} [1 - \cos^n y \cos ny - i \cos^n y \sin ny]$$

S = કાલ્પનિક ભાગ

$$= \cot y (1 - \cos^n y \cos ny)$$

જવાબ : (D)

- (18) $\left| \frac{z-12}{z-8i} \right| = \frac{5}{3}$ અને $\left| \frac{z-4}{z-8} \right| = 1$ બંને શરતનું પાલન કરતી બધી સંકર સંખ્યાઓના કાલ્પનિક ભાગનો સરવાળો

(A) 25

(B) 28

(C) 32

(D) 35

ઉકેલ : સહેલાઈથી જોઈ શકાય છે કે પ્રથમ સમીકરણ વર્તુળ દર્શાવે છે.

બીજું સમીકરણ એ (4, 0) તથા (8, 0)ને જોડતા રેખાખંડનો લંબદ્વિભાજક દર્શાવે છે.

$\therefore z$ નું સ્વરૂપ $6 + yi$ પ્રકારનું હોય.

$$\left| \frac{z-12}{z-8i} \right| = \frac{5}{3}$$

$$\therefore \left| \frac{-6+yi}{6+(y-8)i} \right| = \frac{5}{3}$$

$$\therefore 9(6^2 + y^2) = 25(6^2 + (y-8)^2)$$

$$\therefore 16y^2 - 400y + 2176 = 0$$

$$\therefore y^2 - 25y + 136 = 0$$

$$\therefore y = 8 \text{ અથવા } y = 17$$

$$\therefore z = 6+8i \text{ અથવા } 6 + 17i$$

$$\therefore \text{માંગેલ સરવાળો} = 8+17 = 25$$

જવાબ : (A)

- (19) વાસ્તવિક સહગુણકવાળી બહુપદી $f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$ માટે $f(2i) = f(2+i) = 0$ હોય તો $a + b + c + d = \dots\dots$

(A) 1

(B) 4

(C) 9

(D) 10

ઉકેલ : આપણે જાણીએ છીએ કે જો $z = a + ib$ કોઈ વાસ્તવિક સહગુણકોવાળા બહુપદીય સમીકરણનું એક બીજ હોય, તો $a - ib$ પણ તે બહુપદીય સમીકરણનું અન્ય બીજ થશે.

$\therefore$ આપેલ બહુપદી સમીકરણ $f(x)$ નાં બીજ $2i, -2i, 2 + i, 2 - i$ થશે.

$$\therefore f(x) = (x + 2i)(x - 2i)(x - 2 - i)(x - 2 + i)$$

$$f(1) = (1 + 2i)(1 - 2i)(1 - 2 - i)(1 - 2 + i) = 5 \times 2 = 10$$

$$\therefore 1 + a + b + c + d = 10$$

$$\therefore a + b + c + d = 9$$

જવાબ : (C)

(20) જો ω એ 1 નું ઘનમૂળ હોય તો $2(1 + \omega)(1 + \omega^2) + 3(2\omega + 1)(2\omega^2 + 1) + \dots + (n+1)(n\omega + 1)(n\omega^2 + 1)$
 $= \dots (\omega \neq 1)$

(A) $\frac{n^2(n+1)^2}{4}$ (B) $\frac{n^2(n+1)^2}{4} + n$ (C) $\frac{n^2(n+1)^2}{4} - n$ (D) $\frac{n^2(n+1)}{2} + n$

ઉકેલ : $z = \sum_{r=1}^n (r+1)(1+r\omega)(1+r\omega^2)$

$$= \sum_{r=1}^n (r+1) [1 + r(\omega + \omega^2) + r^2 \omega^3]$$

$$= \sum_{r=1}^n (r+1) (1 - r + r^2) \quad (\omega^3 = 1, 1 + \omega + \omega^2 = 0)$$

$$= \sum_{r=1}^n (r^3 + 1) = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + n$$

જવાબ : (B)

(21) જો સંકર સંખ્યા z ($z \neq 2$) એ સમીકરણ $z^2 = 4z + |z|^2 + \frac{16}{|z|^3}$ નું સમાધાન કરે તો $|z|^4$ ની કિંમત થાય.

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

ઉકેલ : ધારો કે $z = re^{i\theta}$. આથી $r = |z|$. આથી $\frac{1}{z} = \frac{1}{r} e^{-i\theta}$.

આપેલ સમીકરણમાં z તથા $\frac{1}{z}$ ની કિંમત મૂકતાં,

$$r^2 e^{2i\theta} = 4re^{i\theta} + r^2 + \frac{16}{r^3}$$

વાસ્તવિક ભાગ અને કાલ્પનિક ભાગ સરખાવતાં,

$$r^2 \cos 2\theta = 4r \cos \theta + r^2 + \frac{16}{r^3} \quad (1)$$

$$r^2 \sin 2\theta = 4r \sin \theta \quad (2)$$

$$\therefore 2r^2 \sin \theta \cos \theta - 4r \sin \theta = 0$$

$$\therefore r \sin \theta = 0 \text{ અથવા } r \cos \theta = 2$$

વિકલ્પ 1 : $r \sin \theta = 0$. આથી $\sin \theta = 0$ ($r \neq 0$)

$$\therefore \cos \theta = \pm 1$$

$\cos \theta = 1$ સમીકરણ (1) માં મૂકતાં,

$$r^2 (2\cos^2 \theta - 1) = 4r \cos \theta + r^2 + \frac{16}{r^3}$$

$$r^2 = 4r + r^2 + \frac{16}{r^3}$$

$$\therefore 4r + \frac{16}{r^3} = 0$$

$$\therefore 4r = \frac{-16}{r^3}$$

$$\therefore r^4 = -4 \text{ શક્ય નથી.}$$

વિકલ્પ 2 : $\cos \theta = -1$ સમીકરણ (1)માં મૂકતાં,

$$r^4 = 4$$

$$\text{આથી } |z|^4 = 4$$

વિકલ્પ 3 : $r \cos \theta = 2$

સમીકરણ (1) પરથી, $r^5 = -8$ જે શક્ય નથી, કારણ કે $r = |z|$

$$\therefore r^4 = 4$$

$$\therefore |z|^4 = 4$$

જવાબ : (D)

(22) જો $|u| < 1, |v| < 1$ અને $z = \frac{u-v}{1-uv}$ તો $|z|$ ની ન્યૂનતમ કિંમત થાય.

(A) $\frac{|u|-|v|}{1+|u||v|}$

(B) $\frac{|u|+|v|}{1-|u||v|}$

(C) $\frac{\|u\|-\|v\|}{1-|u||v|}$

(D) $\frac{|u|+|v|}{1-|u||v|}$

ઉકેલ : $z = \frac{u-v}{1-uv}$

$$|u-v| > ||u| - |v|| \quad (1)$$

$$\text{ધારો કે } u = r e^{i\theta}, v = \rho e^{i\phi};$$

$$\therefore |u| = r, |v| = \rho \text{ તથા } r, \rho < 1$$

$$\begin{aligned} |1-uv|^2 &= |1-r\rho e^{i(\theta+\phi)}|^2 = |1-r\rho \cos(\theta+\phi) - i r \rho \sin(\theta+\phi)|^2 \\ &= 1 + r^2 \rho^2 \cos^2(\theta+\phi) + r^2 \rho^2 \sin^2(\theta+\phi) - 2r\rho \cos(\theta+\phi) \\ &\leq 1 + r^2 \rho^2 + 2r\rho \\ &\leq (1+r\rho)^2 = (1+|u||v|)^2 \quad (\cos(\theta+\phi) \geq -1) \end{aligned}$$

$$\therefore |1-uv| \leq (1+|u||v|) \quad (2)$$

(1) અને (2) પરથી

$$|z| = \left| \frac{u-v}{1-uv} \right| \geq \frac{\|u\| - \|v\|}{1+|u||v|}$$

નોંધ : $\theta = \phi = 0$ માટે ન્યૂનતમ કિંમત મળે.

બીજી રીત : $|u-v| \geq ||u| - |v||$

$$\therefore |1-uv| = |1+(-uv)| \leq |1| + |-uv| = 1 + |u||v|$$

$$\therefore \frac{1}{|1-uv|} \geq \frac{1}{1+|u||v|}$$

$$\therefore |z| = \left| \frac{u-v}{1-uv} \right| \geq \frac{\|u\| - \|v\|}{1+|u||v|}$$

જવાબ : (A)

(23) જો $\frac{z-1}{e^{i\theta}} + \frac{e^{i\theta}}{z-1}$ નો કાલ્પનિક ભાગ શૂન્ય હોય, તથા $\frac{z-1}{e^{i\theta}}$ વાસ્તવિક ન હોય તો z એ

(A) રેખા પર હોય.

(B) પરવલય પર હોય.

(C) વર્તુળ પર હોય.

(D) ઉપવલય પર હોય.

ઉકેલ : આપેલ છે કે $u + \frac{1}{u}$ નો કાલ્પનિક ભાગ શૂન્ય છે, જ્યાં $u = \frac{z-1}{e^{i\theta}}$

હવે, જો સંકર સંખ્યા z નો કાલ્પનિક ભાગ શૂન્ય હોય, તો $z - \bar{z} = 2iy = 0$

$$\therefore \left(u + \frac{1}{u}\right) - \overline{\left(u + \frac{1}{u}\right)} = 0$$

$$\therefore \left(u + \frac{1}{u}\right) - \left(\bar{u} + \frac{1}{\bar{u}}\right) = 0$$

$$\therefore \left(u - \bar{u}\right) + \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{\bar{u}}\right) = 0$$

$$\therefore (u - \bar{u}) - \left(\frac{u - \bar{u}}{u\bar{u}} \right) = 0$$

$$\therefore (u - \bar{u}) \left(1 - \frac{1}{|u|^2} \right) = 0 \quad (|u|^2 = u\bar{u})$$

$$\therefore |u|^2 = 1 \quad (u \neq \bar{u})$$

$$\therefore \left| \frac{z-1}{e^{i\theta}} \right|^2 = 1$$

$$\therefore |z-1|^2 = 1 \quad (|e^{i\theta}| = 1)$$

$$\therefore |z-1| = 1$$

$\therefore z$ એ વર્તુળ પર આવેલ બિંદુ છે.

જવાબ : (C)

(24) સમીકરણ $z^n = (z+1)^n$ નાં બીજ
 (A) $\frac{1}{2}$ ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળ પર આવેલ છે. (B) $2x+1=0$ રેખા પર આવેલ છે.
 (C) n બાજુવાળા નિયમિત બહુકોણ પર આવેલ છે. (D) $2n$ બાજુવાળા નિયમિત બહુકોણ પર આવેલ છે.

ઉકેલ : $z^n = (z+1)^n$

$$\therefore \left(1 + \frac{1}{z} \right)^n = 1$$

$$\therefore 1 + \frac{1}{z} = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

$$\therefore k = 0 \text{ માટે } \frac{1}{z} = 0 \text{ શક્ય નથી.}$$

$$\therefore z = \frac{1}{-1 + \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}}, \quad k = 1, 2, \dots, n-1$$

$$= \frac{-1 + \cos \frac{2k\pi}{n} - i \sin \frac{2k\pi}{n}}{\left(-1 + \cos \frac{2k\pi}{n} \right)^2 + \sin^2 \frac{2k\pi}{n}}$$

$$= \frac{-\left(1 - \cos \frac{2k\pi}{n} \right) - i \sin \frac{2k\pi}{n}}{2 \left(1 - \cos \frac{2k\pi}{n} \right)} = \frac{-1}{2} - \frac{i \sin \frac{2k\pi}{n}}{2 \left(1 - \cos \frac{2k\pi}{n} \right)} = \frac{-1}{2} - \left(\frac{-1}{2} \cot \frac{k\pi}{n} \right)$$

$$\therefore \operatorname{Re}(z) = \frac{-1}{2}. \quad \text{આથી } x = \frac{-1}{2}$$

સમીકરણ $z^n = (z+1)^n$ નાં બીજ રેખા $2x+1=0$ પર આવેલ છે.

જવાબ : (B)

(25) z_1 અને z_2 એવી સંકર સંખ્યાઓ છે. જ્યાં $\left| \frac{z_1 - 2z_2}{2 - z_1 z_2} \right| = 1$ તથા $|z_2| \neq 1$. બિંદુ z_1 એ (JEE 2015)

(A) 2 ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળ પર હોય.

(B) $\sqrt{2}$ ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળ પર હોય.

(C) X-અક્ષને સમાંતર રેખા પર હોય.

(D) Y-અક્ષને સમાંતર રેખા પર હોય.

ઉકેલ : આપણે એક પરિણામ સાબિત કરીએ :

$$\text{જો } \left| \frac{\alpha - \beta}{1 - \alpha\bar{\beta}} \right| = 1, |\beta| \neq 1, \text{ તો } |\alpha| = 1$$

$$|\alpha - \beta| = |1 - \alpha\bar{\beta}|$$

$$\therefore |\alpha - \beta|^2 = |1 - \alpha\bar{\beta}|^2$$

$$\therefore |\alpha|^2 + |\beta|^2 - 2\operatorname{Re}(\alpha\bar{\beta}) = 1 + |\alpha|^2 |\beta|^2 - 2\operatorname{Re}(\alpha\bar{\beta})$$

$$\therefore 1 - |\alpha|^2 - |\beta|^2 + |\alpha|^2 |\beta|^2 = 0$$

$$\therefore (1 - |\alpha|^2)(1 - |\beta|^2) = 0$$

$$\text{પરંતુ } |\beta| \neq 1. \quad \text{આથી } |\alpha| = 1$$

$$\text{અહીં, } \alpha = \frac{z_1}{2} \text{ અને } \beta = z_2 \text{ લેતાં, } \left| \frac{z_1 - 2z_2}{2 - z_1 z_2} \right| = 1. \quad \text{આથી } \frac{z_1}{2} = 1, |z_1| = 2.$$

$\therefore z_1$ એ 2 ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળ પર છે.

જવાબ : (A)

(26) સંકર સંખ્યા $z_1 = x_1 + iy_1$ અને $z_2 = x_2 + iy_2$ માટે જો $x_1 \leq x_2$ અને $y_1 \leq y_2$ પ્રદેશને આપણે $z_1 \cap z_2$ વડે દર્શાવીએ.

ધારો કે z એ સંકર સંખ્યા છે જ્યાં $1 \cap z$, તો

$$(A) \frac{1-z}{1+z} \cap -i \quad (B) 1 \cap \frac{1-z}{1+z} \quad (C) \frac{1-z}{1+z} \cap 0 \quad (D) \frac{1+z}{1-z} \cap 0$$

ઉકેલ : ધારો કે $z = x + iy$. $1 \cap z$ હોવાથી $1 \leq x$ અને $0 \leq y$.

$$\begin{aligned} \text{હવે, } \frac{1-z}{1+z} &= \frac{(1-x)-iy}{(1+x)+iy} = \frac{[(1-x)-iy][(1+x)-iy]}{(1+x)^2 + y^2} \\ &= \frac{1-(x^2+y^2)-2iy}{(1+x)^2 + y^2} \end{aligned}$$

$$x \geq 1 \text{ અને } y \geq 0 \text{ હોવાથી, } \frac{1-(x^2+y^2)}{(1+x)^2 + y^2} \leq 0 \text{ અને } \frac{-2y}{(1+x)^2 + y^2} \leq 0$$

$$\therefore \frac{1-z}{1+z} \cap 0$$

જવાબ : (C)

(27) $|z - i| + |z + i| \leq 4$ એ આર્ગાન્ડ સમતલમાં કયો પ્રદેશ દર્શાવશે ?

- (A) ઉપવલયની અંદરનો ભાગ
- (B) વર્તુળની બહારનો ભાગ
- (C) ઉપવલય ઉપર તથા તેની અંદરનો ભાગ
- (D) વર્તુળ ઉપર તથા તેની અંદરનો ભાગ


ઉકેલ : ધારો કે A અને B અનુક્રમે $0 + i$ તથા $0 - i$ બિંદુ દર્શાવે છે.

ધારો કે P(z) સમતલનું કોઈ પણ બિંદુ છે.

$$|z - i| + |z + i| \leq 4 \Rightarrow PA + PB \leq 4$$

આમ, P એ A અને B નાભિવાળા ઉપવલય ઉપર

અથવા ઉપવલયની અંદરનું બિંદુ હોઈ શકે.



આકૃતિ 2.4

જવાબ : (C)

(28) જો $(1 + x)^n$ ના દ્વિપદી વિસ્તરણના સહગુણકો $c_0, c_1, c_2, \dots, c_n$ હોય, તો નીચે આપેલ વિકલ્પમાંથી કયો વિકલ્પ સત્ય ના બને ?

(A) $c_0 - c_2 + c_4 - c_6 + \dots = \frac{n}{2^2} \cos \frac{n\pi}{4}$

(B) $c_1 - c_3 + c_5 - \dots = \frac{n}{2^2} \sin \frac{n\pi}{4}$

(C) $c_1 + c_5 + c_9 + c_{13} + \dots = \frac{1}{2} \left(2^{n-1} + 2^{\frac{n}{2}} \sin \frac{n\pi}{4} \right)$

(D) $c_1 + c_5 + c_9 + c_{13} + \dots = \left(2^{n-1} + 2^{\frac{n}{2}} \sin \frac{n\pi}{4} \right)$

ઉકેલ : $(1 + x)^n = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3 + \dots \quad (n+1) \text{ પદ} \quad (1)$

(1) માં $x = i$ મૂકતાં,

$(1 + i)^n = c_0 + c_1i - c_2 - c_3i + c_4 + \dots \quad (n+1) \text{ પદ} \quad (2)$

સમીકરણ (1)માં $x = -i$ મૂકતાં,

$(1 - i)^n = c_0 - c_1i - c_2 + c_3i + c_4 + \dots \quad (n+1) \text{ પદ} \quad (3)$

(2) અને (3)નો સરવાળો કરતાં,

$2(c_0 - c_2 + c_4 - c_6 + \dots) = (1 + i)^n + (1 - i)^n$

$$\begin{aligned} \therefore c_0 - c_2 + c_4 - c_6 + \dots &= \frac{(1+i)^n + (1-i)^n}{2} \\ &= \frac{n}{2^2} \left(\frac{\left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)^n + \left(\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4} \right)^n}{2} \right) \\ &= \frac{n}{2^2} \left(\frac{\cos \frac{n\pi}{4} + i \sin \frac{n\pi}{4} + \cos \frac{n\pi}{4} - i \sin \frac{n\pi}{4}}{2} \right) \end{aligned}$$

$\therefore c_0 - c_2 + c_4 - c_6 + \dots = \frac{n}{2^2} \cos \frac{n\pi}{4} \quad (A) \text{ સત્ય છે.} \quad (4)$

તે જ રીતે (2) અને (3)ની બાદબાકી કરતાં,

$2i(c_1 - c_3 + c_5 - \dots) = (1 + i)^n - (1 - i)^n$

$c_1 - c_3 + c_5 - \dots = \frac{n}{2^2} \sin \frac{n\pi}{4} \quad (B) \text{ સત્ય છે.} \quad (5)$

આપણે જાણીએ છીએ કે $c_1 + c_3 + c_5 + \dots = 2^{n-1} \quad (6)$

સમીકરણ (5) અને (6)નો સરવાળો કરતાં,

$2(c_1 + c_5 + c_9 + \dots) = 2^{n-1} + \frac{n}{2^2} \sin \frac{n\pi}{4} \quad \text{આથી (C) સત્ય છે.}$

$\therefore c_1 + c_5 + c_9 + \dots = \frac{1}{2} \left(2^{n-1} + 2^{\frac{n}{2}} \sin \frac{n\pi}{4} \right) \quad \text{આથી (D) અસત્ય છે.} \quad \text{જવાબ : (D)}$

(29) જો $|z^2 - 1| = |z|^2 + 1$, તો z એ

(A) ઉપવલય પર હોય. (B) વર્તુળ પર હોય. (C) કાલ્પનિક અક્ષ પર હોય. (D) વાસ્તવિક અક્ષ પર હોય.

ઉકેલ : ધારો કે $z = x + iy$

$|z^2 - 1| = |z|^2 + 1$

$\therefore |(x + iy)^2 - 1| = x^2 + y^2 + 1$

$$\therefore \sqrt{(x^2 - y^2 - 1)^2 + (2xy)^2} = x^2 + y^2 + 1$$

$$\therefore (x^2 - y^2 - 1)^2 + 4x^2y^2 = (x^2 + y^2 + 1)^2$$

$$\therefore -2x^2y^2 + 2y^2 - 2x^2 + 4x^2y^2 = 2x^2y^2 + 2y^2 + 2x^2$$

$$\therefore 4x^2 = 0. \quad \text{આથી } x = 0$$

$$\therefore z \text{ એ કાલ્પનિક અક્ષ પર હોય.}$$

જવાબ : (C)

$$(30) \quad \text{જો } x = \cos \theta + i \sin \theta \text{ અને } y = \cos \phi + i \sin \phi \text{ તો } x^m y^n + \frac{1}{x^m y^n} = \dots$$

$$(A) \cos (m\theta + n\phi) \quad (B) \cos (m\theta - n\phi) \quad (C) 2\cos (m\theta + n\phi) \quad (D) 2\cos (m\theta - n\phi)$$

$$\text{ઉકેલ : } x = e^{i\theta}, y = e^{i\phi}$$

$$\therefore x^m y^n + \frac{1}{x^m y^n} = e^{im\theta} e^{in\phi} + e^{-im\theta} e^{-in\phi}$$

$$= e^{i(m\theta + n\phi)} + e^{-i(m\theta + n\phi)}$$

$$= \cos (m\theta + n\phi) + i \sin (m\theta + n\phi) + \cos (m\theta + n\phi) - i \sin (m\theta + n\phi)$$

$$= 2 \cos (m\theta + n\phi)$$

જવાબ : (C)

$$(31) \quad \text{જો } (1 + x + x^2)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{2n}x^{2n}, \text{ તો } a_0 + a_3 + a_6 + \dots = \dots$$

$$(A) 1 \quad (B) 2^n \quad (C) 2^{n-1} \quad (D) 3^{n-1}$$

$$\text{ઉકેલ : } \text{અહીં, } (1 + x + x^2)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{2n}x^{2n} \quad (1)$$

સમીકરણ (1)માં $x = 1$ લેતાં,

$$(1 + 1 + 1)^n = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{2n} \quad (2)$$

સમીકરણ (1)માં $x = \omega$ લેતાં,

$$(1 + \omega + \omega^2)^n = a_0 + a_1\omega + a_2\omega^2 + a_3\omega^3 + \dots + a_{2n}\omega^{2n} \quad (3)$$

સમીકરણ (1)માં $x = \omega^2$ લેતાં,

$$(1 + \omega^2 + \omega^4)^n = a_0 + a_1\omega^2 + a_2\omega^4 + a_3\omega^6 + \dots + a_{2n}\omega^{4n} \quad (4)$$

સમીકરણ (2), (3), (4)નો સરવાળો કરતાં,

$$3^n = 3 (a_0 + a_3 + a_6 + \dots)$$

$$\therefore a_0 + a_3 + a_6 + \dots = 3^{n-1}$$

$$(1 + \omega + \omega^2 = 0), (\omega^3 = 1)$$

જવાબ : (D)

$$(32) \quad \text{સમીકરણ } az^2 + z + 1 = 0 \text{ નાં બીજ શુદ્ધ કાલ્પનિક સંખ્યા છે, જ્યાં } a = \cos \theta + i \sin \theta. \text{ નીચેનામાંથી કયું વિધાન } f(x) = x^3 - 3x^2 + 3(1 + \cos \theta)x + 5 \text{ માટે સત્ય છે ?}$$

$$(A) f(x) = 0 \text{ ને ત્રણ વાસ્તવિક બીજ મળે.}$$

$$(B) f(x) = 0 \text{ ને એક ધન વાસ્તવિક બીજ મળે.}$$

$$(C) f(x) = 0 \text{ ને એક ઋણ વાસ્તવિક બીજ મળે.}$$

$$(D) f(x) = 0 \text{ ને ત્રણ બીજ મળે છે પણ બધા જ ભિન્ન ન હોય.}$$

$$\text{ઉકેલ : } az^2 + z + 1 = 0 \text{ જ્યાં, } a = \cos \theta + i \sin \theta$$

ધારો કે શુદ્ધ કાલ્પનિક સંખ્યા z_1 અને z_2 એ આ સમીકરણનાં બીજ છે.

$$\therefore z_1 = -\overline{z_1} \text{ અને } z_2 = -\overline{z_2}$$

$$\text{બંને બીજનો સરવાળો } z_1 + z_2 = -\frac{1}{a} \quad (1)$$

$$\therefore \overline{z_1} + \overline{z_2} = \frac{1}{a}$$

$$\therefore \overline{z_1} + \overline{z_2} = -\frac{1}{a}$$

$$\therefore -\frac{1}{a} = \frac{1}{a} \quad \text{આથી} \quad \frac{1}{a} + \frac{1}{a} = 0$$

$$\therefore \cos \theta = 0$$

$$(a = \cos \theta + i \sin \theta)$$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{હવે } f(x) = 0$$

$$\therefore x^3 - 3x^2 + 3 \left(1 + \cos \frac{\pi}{2}\right) x + 5 = 0$$

$$\therefore x^3 - 3x^2 + 3x + 5 = 0$$

$$\therefore (x-1)^3 + 6 = 0. \quad \text{આથી } x = 1 + (-6)^{\frac{1}{3}}$$

$\therefore f(x) = 0$ ને એક ઋણ વાસ્તવિક બીજ મળે.

જવાબ : (C)

(33) જો $z_1 = 24 + 7i$ અને $|z_2| = 6$ તો $|z_1 + z_2|$ નું મહત્તમ તથા ન્યૂનતમ મૂલ્ય અનુક્રમે થાય.

(A) 31, 19

(B) 25, 19

(C) 31, 25

(D) 24, 7

ઉકેલ : $|z_2| = 6$ એ વર્તુળ દર્શાવે છે.

$|z_1 + z_2| = |z_2 - (-24 - 7i)|$ એ આપેલ વર્તુળ પરના

કોઈ બિંદુ તથા $(-24, -7)$ વચ્ચેનું અંતર દર્શાવે છે.

આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે BC મહત્તમ અંતર તથા


AC એ ન્યૂનતમ અંતર થશે.

$$OC = \sqrt{24^2 + 7^2} = 25$$

$$OA = 6, OB = 6$$

$$AC = OC - OA = 25 - 6 = 19$$

$$BC = OC + OB = 25 + 6 = 31$$



જવાબ : (A)

બીજી રીત : $|z_2| = 6 \Rightarrow z_2 = 6e^{i\theta}$ જ્યાં $\theta \in \mathbb{R}$

$$|z_1 + z_2|^2 = |24 + 7i + 6 \cos \theta + i 6 \sin \theta|^2$$

$$= (24 + 6 \cos \theta)^2 + (7 + 6 \sin \theta)^2$$

$$= 576 + 36 \cos^2 \theta + 288 \cos \theta + 49 + 36 \sin^2 \theta + 84 \sin \theta$$

$$= 661 + 12 (24 \cos \theta + 7 \sin \theta)$$

$$= 661 + 12 (25) \sin (\theta + \alpha) \quad (\text{જ્યાં } 7 = 25 \cos \alpha, 24 = 25 \sin \alpha)$$

$$|z_1 + z_2|^2 = 661 + 300 \sin (\theta + \alpha)$$

$\therefore |z_1 + z_2|^2$ નું મહત્તમ મૂલ્ય 961 તથા ન્યૂનતમ મૂલ્ય 361 થાય.

$\therefore |z_1 + z_2|$ નું મહત્તમ મૂલ્ય 31 તથા ન્યૂનતમ મૂલ્ય 19 થાય.

જવાબ : (A)

(34) સંકર સંખ્યા a માટે $|a| = 1$ છે. જો $az^2 + z + 1 = 0$ ને એક શુદ્ધ કાલ્પનિક બીજ હોય, તો a તથા $\arg a$ ની કિંમત

$$(A) a = \cos \theta + i \sin \theta, \theta = \cos^{-1} \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2} \right) \quad (B) a = \sin \theta + i \cos \theta, \theta = \cos^{-1} \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2} \right)$$

$$(C) a = \cos \theta + i \sin \theta, \theta = \cos^{-1} \left(\frac{\sqrt{5}-1}{4} \right) \quad (D) a = \sin \theta + i \cos \theta, \theta = \cos^{-1} \left(\frac{\sqrt{5}-1}{4} \right)$$

ઉકેલ : $az^2 + z + 1 = 0$

ધારો કે z_1 એ આ સમીકરણનું શુદ્ધ કાલ્પનિક બીજ છે.

$$\therefore az_1^2 + z_1 + 1 = 0 \quad (1)$$

$$\therefore \bar{a} (\bar{z}_1)^2 + \bar{z}_1 + 1 = 0$$

$$\therefore \bar{a} z_1^2 - z_1 + 1 = 0 \quad (\bar{z}_1 = -z_1) \quad (2)$$

સમીકરણ (1) અને (2)માંથી (z_1) નો લોપ કરતાં,

$$\therefore \frac{z_1^2}{2} = \frac{-z_1}{a - \bar{a}} = \frac{1}{-(a + \bar{a})}$$

$$\therefore z_1^2 = \left(\frac{a - \bar{a}}{a + \bar{a}} \right)^2 = \frac{-2}{a + \bar{a}}$$

$$\therefore (\bar{a} - a)^2 + 2(a + \bar{a}) = 0$$

ધારો કે $a = \cos \theta + i \sin \theta$ ($|a| = 1$)

$$\therefore (-2i \sin \theta)^2 + 2(2 \cos \theta) = 0$$

$$\therefore -4(1 - \cos^2 \theta) + 4 \cos \theta = 0$$

$$\therefore \cos^2 \theta + \cos \theta - 1 = 0$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$\cos \theta$ ની કિંમત $\frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$ ન હોઈ શકે.

$$\therefore \cos \theta = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$$

$$\therefore \theta = \cos^{-1} \left(\frac{\sqrt{5} - 1}{2} \right)$$

જવાબ : (A)

(35) જો $\cos(1 - i) = a + ib$ જ્યાં $a, b \in \mathbb{R}$ તો $a = \dots\dots b = \dots\dots$

(A) $\frac{1}{2} \left(e - \frac{1}{e} \right) \cos 1, \frac{1}{2} \left(e + \frac{1}{e} \right) \sin 1$

(B) $\frac{1}{2} \left(e + \frac{1}{e} \right) \cos 1, \frac{1}{2} \left(e - \frac{1}{e} \right) \sin 1$

(C) $\frac{1}{2} \left(e + \frac{1}{e} \right) \cos 1, \frac{1}{2} \left(e + \frac{1}{e} \right) \sin 1$

(D) $\frac{1}{2} \left(e - \frac{1}{e} \right) \cos 1, \frac{1}{2} \left(e - \frac{1}{e} \right) \sin 1$

ઉકેલ : $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$

$$\therefore \cos(1 - i) = \frac{e^{i(1-i)} + e^{-i(1-i)}}{2}$$

$$= \frac{e^{1+i} + e^{-1-i}}{2}$$

$$= \frac{e \cdot e^i + \frac{e^{-i}}{e}}{2} = \frac{1}{2e} [e^2 (\cos 1 + i \sin 1) + \cos 1 - i \sin 1]$$

$$\therefore \cos(1 - i) = \frac{1}{2e} (e^2 \cos 1 + \cos 1 + i e^2 \sin 1 - i \sin 1)$$

$$\therefore a = \frac{1}{2e} (e^2 \cos 1 + \cos 1), b = \frac{1}{2e} (e^2 \sin 1 - \sin 1)$$

$$a = \frac{1}{2} \left(e + \frac{1}{e} \right) \cos 1, \quad b = \frac{1}{2} \left(e - \frac{1}{e} \right) \sin 1 \quad \text{જવાબ : (B)}$$

$$(36) \text{ જો } z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}, \quad \sum z_1 \operatorname{Im} (\overline{z_2} z_3) = \dots$$

$$(A) z_1 + z_2 + z_3 \quad (B) 0 \quad (C) \frac{1}{2i} (z_1 + z_2 + z_3) \quad (D) z_1 z_2 z_3$$

$$\text{ઉકેલ :} \quad \text{ધારો કે } z_1 = r_1 e^{i\theta_1}; z_2 = r_2 e^{i\theta_2}; z_3 = r_3 e^{i\theta_3}$$

$$\operatorname{Im} (\overline{z_2} z_3) = \operatorname{Im} (r_2 r_3 e^{i(\theta_3 - \theta_2)}) = r_2 r_3 \sin (\theta_3 - \theta_2)$$

$$\therefore z_1 \operatorname{Im} (\overline{z_2} z_3) = r_1 r_2 r_3 e^{i\theta_1} \sin (\theta_3 - \theta_2)$$

$$\therefore \sum z_1 \operatorname{Im} (\overline{z_2} z_3) = r_1 r_2 r_3 \{ e^{i\theta_1} \sin (\theta_3 - \theta_2) + e^{i\theta_2} \sin (\theta_1 - \theta_3) + e^{i\theta_3} \sin (\theta_2 - \theta_1) \}$$

$$\text{હવે, } \sin (\alpha - \beta) \text{ ની સૂત્રનો ઉપયોગ કરતાં તથા } e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \text{ પરથી,}$$

$$\sum z_1 \operatorname{Im} (\overline{z_2} z_3) = 0 \quad \text{જવાબ : (B)}$$

$$(37) \quad e^{i(2k \cot^{-1} m)} \left(\frac{mi+1}{mi-1} \right)^k = \dots \quad \text{જ્યાં } k \in \mathbb{Z}, m > 0$$

$$(A) 0 \quad (B) 1 \quad (C) -1 \quad (D) 2$$

$$\text{ઉકેલ :} \quad e^{i(2k \cot^{-1} m)} \left(\frac{mi+1}{mi-1} \right)^k$$

$$= [\cos (2k \cot^{-1} m) + i \sin (2k \cot^{-1} m)] \left(\frac{mi+1}{mi-1} \right)^k$$

$$= e^{i 2k\theta} \left[\frac{(mi+1)^2}{m^2+1} \right]^k \quad \text{જ્યાં } \cot^{-1} m = \theta$$

$$= e^{i 2k\theta} \left[\frac{m-i}{\sqrt{m^2+1}} \right]^{2k} = e^{i 2k\theta} [\cos \theta - i \sin \theta]^{2k} = e^{i 2k\theta} e^{-i 2k\theta} = 1$$

$$\text{જવાબ : (B)}$$

$$(38) \text{ જો } (1 + ir)^3 = s(1 + i) \text{ જ્યાં } r, s \in \mathbb{R} \text{ તો } r \text{ ની શક્ય કિંમતોનો સરવાળો } \dots \text{ થાય.}$$

$$(A) 1 \quad (B) -3 \quad (C) 3 \quad (D) 0$$

$$\text{ઉકેલ :} \quad \text{જો } \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{1+r^2}} \text{ અને } \sin \theta = \frac{r}{\sqrt{1+r^2}} \text{ લઈએ તો,}$$

$$\text{આપેલ સમીકરણ પરથી} \quad \left[\sqrt{1+r^2} (\cos \theta + i \sin \theta) \right]^3 = s(1 + i)$$

$$\therefore \left(\sqrt{1+r^2} \right)^3 (\cos 3\theta + i \sin 3\theta) = s(1 + i)$$

$$(1+r^2)^{\frac{3}{2}} \cos 3\theta = s, (1+r^2)^{\frac{3}{2}} \sin 3\theta = s$$

$$\therefore \cos 3\theta = \sin 3\theta$$

$$\therefore 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta$$

$$\therefore \frac{4}{(\sqrt{1+r^2})^3} - \frac{3}{\sqrt{1+r^2}} = \frac{3r}{\sqrt{1+r^2}} - \frac{4r^3}{(\sqrt{1+r^2})^3}$$

$$\therefore 4 - 3(1+r^2) = 3r(1+r^2) - 4r^3$$

$$\therefore r^3 - 3r^2 - 3r + 1 = 0$$

$$\therefore r \text{ ની શક્ય કિંમતનો સરવાળો} = \text{ઉપરના સમીકરણનાં બીજનો સરવાળો} = 3 \quad \text{જવાબ : (C)}$$

(39) જો સમીકરણ $8x^2 - 10x + 3 = 0$ નાં બીજ α અને β^2 (જ્યાં, $\beta^2 > \frac{1}{2}$) હોય, તો જેનાં બીજ $(\alpha + i\beta)^{100}$

અને $(\alpha - i\beta)^{100}$ હોય તેવું સમીકરણ

$$(A) x^2 - x + 1 = 0 \quad (B) x^2 + x + 1 = 0 \quad (C) x^2 - x - 1 = 0 \quad (D) x^2 + x - 1 = 0$$

$$\text{ઉકેલ : } 8x^2 - 10x + 3 = 0$$

$$\therefore (4x - 3)(2x - 1) = 0$$

$$\therefore x = \frac{3}{4} \text{ અથવા } x = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \alpha = \frac{1}{2} \text{ અને } \beta = \frac{\pm\sqrt{3}}{2} \quad (\beta^2 > \frac{1}{2})$$

$$\therefore \alpha + i\beta = \frac{1+i\sqrt{3}}{2} = e^{\frac{i\pi}{3}} \quad \text{અથવા} \quad \frac{1-i\sqrt{3}}{2} = e^{\frac{-i}{3}}$$

$$\therefore \left(\frac{1+i\sqrt{3}}{2}\right)^{100} + \left(\frac{1-i\sqrt{3}}{2}\right)^{100} = e^{\frac{i100\pi}{3}} + e^{\frac{-i100\pi}{3}} = 2\cos \frac{100\pi}{3} = 2\left(\frac{-1}{2}\right) = -1$$

$$\text{વળી, } \left(\frac{1+i\sqrt{3}}{2}\right)^{100} \left(\frac{1-i\sqrt{3}}{2}\right)^{100} = e^{\frac{i100\pi}{3}} \cdot e^{\frac{-i100\pi}{3}} = 1$$

$$\text{મંગેલ સમીકરણ } x^2 + x + 1 = 0 \quad \text{જવાબ : (B)}$$

(40) $w (I_m(w) \neq 0)$ એ સંકર સંખ્યા છે. સમીકરણ $w - \bar{w}z = k(1-z)$, $k \in \mathbb{R}$ ના બિંદુગણનું સ્વરૂપ થશે.

$$(A) \{z \mid |z| = 1\} \quad (B) \{z \mid z = \bar{z}\} \quad (C) \{z \mid z \neq 1\} \quad (D) \{z \mid |z| = 1, z \neq 1\}$$

$$\text{ઉકેલ : } \text{ધારો કે } w = a + ib, b \neq 0 \text{ તથા } z = x + iy,$$

$$w - \bar{w}z = k(1-z)$$

$$\therefore a + ib - (a - ib)(x + iy) = k(1 - x - iy)$$

$$\therefore a + ib - (ax + ayi - bxi + by) = k(1 - x) - iky$$

$$\therefore (a - ax - by) + i(b - ay + bx) = k(1 - x) - kyi$$

વાસ્તવિક અને કાલ્પનિક ભાગને સરખાવતાં,

$$k = \frac{a-ax-by}{1-x}, \quad k = \frac{ay-bx-b}{y}$$

$$\therefore ay - axy - by^2 = ay - bx - b - ayx + bx^2 + bx$$

$$\therefore -by^2 = bx^2 - b \quad (b \neq 0)$$

$$\therefore x^2 + y^2 = 1 \quad \text{આ પણ શક્ય છે.}$$

$$\text{આથી } |z| = 1, \quad z \neq 1 \quad \text{પરંતુ } z = 1 \quad \text{તો } b = 0$$

જવાબ : (D)

$$(41) \quad \text{જો } (\cos \theta + i \sin \theta) (\cos 2\theta + i \sin 2\theta) \dots (\cos n \theta + i \sin n \theta) = 1 \quad \text{તો } \theta = \dots$$

$$(A) \frac{2k\pi}{n(n+1)}, k \in Z \quad (B) \frac{k\pi}{n(n+1)}, k \in Z \quad (C) \frac{4k\pi}{n(n+1)}, n \in Z \quad (D) \frac{k\pi}{2n(n+1)}, k \in Z$$

$$\text{ઉકેલ : } (\cos \theta + i \sin \theta) (\cos 2\theta + i \sin 2\theta) \dots (\cos n \theta + i \sin n \theta) = 1$$

$$\therefore (\cos (\theta + 2\theta + \dots + n\theta) + i \sin (\theta + 2\theta + \dots + n\theta)) = 1$$

$$\therefore \cos \left\{ \frac{1}{2} n(n+1)\theta \right\} + i \sin \left\{ \frac{1}{2} n(n+1)\theta \right\} = 1$$

$$\therefore \frac{1}{2} n(n+1)\theta = 2k\pi, k \in Z$$

$$\therefore \theta = \frac{4k\pi}{n(n+1)}, k \in Z$$

જવાબ : (C)

$$(42) \quad \text{જો } \alpha, \beta \text{ એ } u^2 - 2u + 2 = 0 \text{ ની બીજા હોય તથા } \cot \theta = x + 1 \text{ હોય, તો } \frac{(x+\alpha)^n - (x+\beta)^n}{\alpha - \beta} = \dots$$

$$(A) \frac{\cos n\theta}{\cos^n \theta} \quad (B) \frac{\sin n\theta}{n \sin \theta} \quad (C) \frac{\sin n\theta}{\cos^n \theta} \quad (D) \frac{\sin n\theta}{\sin^n \theta}$$

$$\text{ઉકેલ : } u^2 - 2u + 2 = 0. \quad \text{આથી } u = 1 \pm i, \quad \text{ધારો કે } \alpha = 1 + i, \beta = 1 - i$$

$$\frac{(x+\alpha)^n - (x+\beta)^n}{\alpha - \beta} = \frac{[\cot \theta - 1 + i]^n - [\cot \theta - 1 - i]^n}{2i}$$

$$= \frac{(\cos \theta + i \sin \theta)^n - (\cos \theta - i \sin \theta)^n}{\sin^n \theta \cdot 2i}$$

$$= \frac{2i \sin n\theta}{2i \sin^n \theta} = \frac{\sin n\theta}{\sin^n \theta}$$

જવાબ : (D)

$$(43) \quad a, b, c, a_1, b_1, c_1 \text{ એ શૂન્યેતર સંકર સંખ્યાઓ છે, જ્યાં } \frac{a}{a_1} + \frac{b}{b_1} + \frac{c}{c_1} = 1 + i \text{ અને } \frac{a_1}{a} + \frac{b_1}{b} + \frac{c_1}{c} = 0,$$

$$\text{તો } \frac{a^2}{a_1^2} + \frac{b^2}{b_1^2} + \frac{c^2}{c_1^2} = \dots$$

$$(A) 2i$$

$$(B) 2 + 2i$$

$$(C) 2$$

$$(D) 1 + 2i$$

ઉકેલ : ધારો કે $\frac{a}{a_1} = x$; $\frac{b}{b_1} = y$; $\frac{c}{c_1} = z$ છે.

આપેલ સમીકરણ $x + y + z = 1 + i$ અને $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$

$$\therefore (x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 \quad (xy + yz + zx = 0)$$

$$\therefore x^2 + y^2 + z^2 = (1 + i)^2 = 2i$$

જવાબ : (A)

(44) $\operatorname{Re}(z)^2 = 0$ અને $|z| = a\sqrt{2}$ ($a > 0$) સમીકરણને કેટલા ઉકેલ મળે ?

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

ઉકેલ : ધારો કે $z = re^{i\theta}$

$$|z| = r = a\sqrt{2} \text{ અને } z^2 = 2a^2 e^{2i\theta}$$

$$\text{હવે, } \operatorname{Re}(z)^2 = 2a^2 \cos 2\theta = 0$$

$$\therefore 2\theta = n\pi \pm \frac{\pi}{2}; n \in \mathbb{Z}$$

$$\therefore \theta = \frac{n\pi}{2} \pm \frac{\pi}{4}; n \in \mathbb{Z}$$

$$\theta = \pm \frac{\pi}{4}, \pm \frac{3\pi}{4}$$

$$\therefore z = \sqrt{2}ae^{\frac{i\pi}{4}}, \sqrt{2}ae^{-\frac{i\pi}{4}}, \sqrt{2}ae^{\frac{i3\pi}{4}}, \sqrt{2}ae^{-\frac{i3\pi}{4}}$$

એમ ચાર ઉકેલ શક્ય બને.

જવાબ : (D)

(45) વર્તુળ $|z| = 2$ માં અંતર્ગત સમબાજુ ત્રિકોણનાં શિરોબિંદુઓ z_1, z_2, z_3 છે. જો $z_1 = 1 + \sqrt{3}i$ તો z_2, z_3 અનુક્રમે થાય.

- (A) $-2, 1 - \sqrt{3}i$ (B) $-1 + \sqrt{3}i, -2$ (C) $-2, -1 + \sqrt{3}i$ (D) $-2, 2 + \sqrt{3}i$

ઉકેલ : $z_1 = 1 + \sqrt{3}i = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$


$$m\angle z_1 O z_2 = \frac{2\pi}{3} \text{ અને } m\angle z_2 O z_3 = \frac{2\pi}{3}$$

$$\therefore z_2 = z_1 e^{\frac{2\pi i}{3}}, z_3 = z_2 e^{\frac{2\pi i}{3}}$$

$$\text{આથી } z_2 = 2e^{i\pi} = -2 \text{ અને } z_3 = -2e^{\frac{2\pi i}{3}}$$

$$\therefore z_3 = -2 \left[\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) \right]$$

$$= -2 \left(\frac{-1}{2} + \frac{\sqrt{3}i}{2} \right) = 1 - \sqrt{3}i$$



આકૃતિ 2.6

જવાબ : (A)

46) જો $|z| = 1$ અને $w = \frac{z-1}{z+1}$ ($z \neq -1$) તો $\operatorname{Re}(w) = \dots\dots\dots$

(IIT 2003)

- (A) 0 (B) $\frac{1}{|z+1|^2}$ (C) $\left| \frac{1}{z+1} \right| \frac{1}{|z+1|^2}$ (D) $\frac{\sqrt{2}}{|z+1|^2}$

ઉકેલ : $w = \frac{z-1}{z+1}$ ($z \neq -1$)

$$\begin{aligned}\therefore wz + w &= z - 1 \\ \therefore w + 1 &= z(1 - w) \\ \therefore z &= \frac{w+1}{1-w} \\ \therefore |z| &= \left| \frac{w+1}{1-w} \right|\end{aligned}$$

બીજી રીત :

$$\begin{aligned}|w - 1| &= |w + 1| \\ \text{ધારો કે } w &= u + iv \\ \therefore |u + iv - 1| &= |u + iv + 1| \\ \therefore (u - 1)^2 + v^2 &= (u + 1)^2 + v^2 \\ \therefore u &= 0 \\ \therefore \operatorname{Re}(w) &= 0\end{aligned}$$

$$\therefore \left| \frac{w+1}{1-w} \right| = 1 \quad (|z| = 1)$$

$$\therefore |w + 1| = |w - 1|$$

$\therefore w$ એ $(1, 0)$ તથા $(-1, 0)$ થી સમાન અંતરે આવેલ છે.

$\therefore w$ એ $(1, 0)$ તથા $(-1, 0)$ ના લંબદ્વિભાજક પર આવેલ છે.

$\therefore w$ એ કાલ્પનિક અક્ષ પર આવેલ બિંદુ છે.

$$\therefore \operatorname{Re}(w) = 0$$

જવાબ : (A)

(47) જો શૂન્યેતર સંકર સંખ્યાઓ z_1, z_2 માટે $\frac{z_1}{z_2} + \frac{z_2}{z_1} = 1$ તો $O(0), P(z_1)$ તથા $Q(z_2)$ એ

(A) રેખા પરનાં બિંદુઓ છે.

(B) કાટકોણ ત્રિકોણનાં શિરોબિંદુઓ છે.

(C) સમબાજુ ત્રિકોણ બનાવે.

(D) એકમ વર્તુળ પર આવેલ છે.

ઉકેલ : ધારો કે $z = \frac{z_1}{z_2}$

$$\therefore z + \frac{1}{z} = 1. \quad \text{અર્થાત્ } z^2 - z + 1 = 0$$

$$\therefore z = \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}. \quad \text{અર્થાત્ } \frac{z_1}{z_2} = \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

$$\therefore \frac{OP}{OQ} = \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \left| \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2} \right| = 1$$

$$\therefore OP = OQ$$

$$\text{વળી, } \frac{PQ}{OQ} = \frac{|z_2 - z_1|}{|z_2|} = \left| 1 - \frac{z_1}{z_2} \right| = \left| 1 - \left(\frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2} \right) \right| = \left| \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2} \right| = 1$$

$$\therefore PQ = OQ$$

$$\therefore OP = OQ = PQ$$

$\therefore \Delta OPQ$ સમબાજુ ત્રિકોણ થશે

જવાબ : (C)

(48) જો z_1, z_2 અને z_3 એ ઘડિયાળની વિરુદ્ધ દિશામાં દર્શાવેલ ΔABC નાં શિરોબિંદુઓ છે. જો z_0 એ ΔABC નું

$$\text{પરિકેન્દ્ર હોય, તો } \left(\frac{z_0 - z_1}{z_0 - z_2} \right) \frac{\sin 2A}{\sin 2B} + \left(\frac{z_0 - z_3}{z_0 - z_2} \right) \frac{\sin 2C}{\sin 2B} = \dots\dots$$

(A) 0

(B) 1

(C) -1

(D) 2

ઉકેલ : ધારો કે $O(z_0)$ એ ΔABC નું પરિકેન્દ્ર હોવાથી $OA = OB = OC$ થાય.

$m\angle AOB = 2C$, $m\angle BOC = 2A$ તથા $m\angle AOC = 2B$.

$$\frac{z_0 - z_1}{z_0 - z_2} = \cos 2C - i \sin 2C$$

$$\text{તથા } \frac{z_0 - z_3}{z_0 - z_2} = \cos 2A + i \sin 2A$$


$$\text{હવે, } \left(\frac{z_0 - z_1}{z_0 - z_2} \right) \frac{\sin 2A}{\sin 2B} + \left(\frac{z_0 - z_3}{z_0 - z_2} \right) \frac{\sin 2C}{\sin 2B}$$

$$= \frac{\sin 2A \cos 2C - i \sin 2A \sin 2C + \cos 2A \sin 2C + i \sin 2A \sin 2C}{\sin 2B}$$

$$= \frac{\sin(2A + 2C)}{\sin 2B} = -1$$

$$(A + B + C = \pi)$$

જવાબ : (C)



આકૃતિ 2.7

$$(49) \quad \text{જો } e^{\log 2 \frac{|z|^2 - |z| + 4}{|z|^2 + 1}} = \log_{\sqrt{2}}(16) \text{ તો } |z| = \dots$$

$$(A) \frac{1}{3}$$

$$(B) \frac{1}{4}$$

$$(C) 1$$

$$(D) \frac{1}{2}$$

ઉકેલ : ધારો કે $|z| = r$

$$e^{\log 2 \frac{|z|^2 - |z| + 4}{|z|^2 + 1}} = \log_{\sqrt{2}} 16$$

$$\therefore \frac{r^2 - r + 4}{r^2 + 1} = 8 \log_{\sqrt{2}} \sqrt{2} = 8 = 2^3$$

$$\therefore \frac{r^2 - r + 4}{r^2 + 1} = 3$$

$$\therefore r^2 - r + 4 = 3(r^2 + 1)$$

$$\therefore 2r^2 + r - 1 = 0$$

$$\therefore (2r - 1)(r + 1) = 0$$

$$\therefore r = \frac{1}{2} \quad \text{અથવા} \quad r = -1 \quad \text{પરંતુ} \quad r > 0$$

$$\therefore r = |z| = \frac{1}{2}$$

જવાબ : (D)

(50) ધારો કે $z = x + iy$ જ્યાં $x, y \in \mathbb{Z}$, સમીકરણ $z\bar{z}^3 + \bar{z}z^3 = 350$ નાં બીજથી રચાતા લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ

$$(A) 175$$

$$(B) 350$$

$$(C) 48$$

$$(D) 68$$

ઉકેલ : આપેલ સમીકરણ $z\bar{z}^3 + \bar{z}z^3 = 350$ એ ચાર ઘાતવાળું છે. આથી તેને ચાર બીજ મળે.

$$z\bar{z}^3 + \bar{z}z^3 = 350$$

$$\therefore |z|^2 \bar{z}^2 + |z|^2 z^2 = 350 \quad (z\bar{z} = |z|^2)$$

$$\therefore |z|^2 (\bar{z}^2 + z^2) = 350$$

$$\therefore (x^2 + y^2) [(x - iy)^2 + (x + iy)^2] = 350$$

$$\therefore (x^2 + y^2) (2x^2 - 2y^2) = 350$$

$$\therefore (x^2 + y^2) (x^2 - y^2) = 175$$

x અને y પૂર્ણાંક સંખ્યા હોવાથી $x^2 + y^2$ અને $x^2 - y^2$ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા થશે.

$$175 = 25 \times 7 = (4^2 + 3^2) (4^2 - 3^2) \text{ લખી શકાય.}$$

$$\therefore x^2 = 16, y^2 = 9$$

$$\therefore x = \pm 4, y = \pm 3$$

$\therefore$ લંબચોરસનાં ચાર શિરોબિંદુ $(4, 3), (-4, 3), (4, -3), (-4, -3)$ થશે.

$$\text{તેનું ક્ષેત્રફળ} = 8 \times 6 = 48 \text{ થાય.}$$

જવાબ : (C)

(51) જો $|z| = 1$ અને $\arg(z) = \theta$ તો $\arg\left(\frac{1+z}{1+\bar{z}}\right) = \dots\dots$

(A) $-\theta$

(B) $\frac{\pi}{2} - \theta$

(C) θ

(D) $\pi - \theta$

ઉકેલ : $z\bar{z} = |z|^2$
 $z\bar{z} = 1$

$(|z| = 1)$

$$\therefore \bar{z} = \frac{1}{z}$$

$$\arg\left(\frac{1+z}{1+\bar{z}}\right) = \arg\left(\frac{1+z}{1+\frac{1}{z}}\right) = \arg(z) = \theta$$

જવાબ : (C)

(52) જો $|z| = 1$ અને $z \neq \pm 1$ તો કોઈ પણ સંકર સંખ્યા z માટે $\frac{z}{1-z^2}$ એ $= \dots\dots$

(IIT : 2007)

(A) ઊગમબિંદુમાંથી પસાર ન થતી રેખા પર હોય.

(B) $|z| = \sqrt{2}$

(C) X-અક્ષ પર હોય.

(D) Y-અક્ષ પર હોય.

ઉકેલ : $|z| = 1$

$$\frac{z}{1-z^2} = \frac{z}{z\bar{z}-z^2} = \frac{z}{z(\bar{z}-z)} = \frac{1}{\bar{z}-z}$$

$(z\bar{z} = |z|^2 = 1)$

$z - \bar{z}$ એ શુદ્ધ કાલ્પનિક સંખ્યા છે.

$$\therefore \frac{1}{\bar{z}-z} \text{ એ શુદ્ધ કાલ્પનિક સંખ્યા છે.}$$

$$\therefore \frac{z}{1-z^2} \text{ એ Y-અક્ષ પર હોય.}$$

જવાબ : (D)

(53) $\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma = 0 = \cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma$ જ્યાં $-\pi < \alpha, \beta, \gamma \leq \pi$.

જો $\sin^n \alpha + \sin^n \beta + \sin^n \gamma = \frac{3}{2}$ તથા $\sum \cos(\alpha + \beta) = \lambda$ તો $(n, \lambda) = \dots\dots$

(A) (2, 0)

(B) (0, 3)

(C) (2, 3)

(D) (3, 2)

ઉકેલ : $\sum \cos \alpha = 0 = \sum \sin \alpha$, જ્યાં $-\pi < \alpha, \beta, \gamma \leq \pi$

ધારો કે $A = e^{i\alpha}$, $B = e^{i\beta}$, $C = e^{i\gamma}$ તો

$$A + B + C = 0 \text{ અને } \frac{1}{A} + \frac{1}{B} + \frac{1}{C} = 0$$

$$\therefore A + B + C = 0 \text{ અને } AB + BC + CA = 0$$

$$\therefore A^2 + B^2 + C^2 = 0 \text{ અને } AB + BC + CA = 0$$

$$\therefore e^{i2\alpha} + e^{i2\beta} + e^{i2\gamma} = 0 \text{ અને } e^{i(\alpha+\beta)} + e^{i(\beta+\gamma)} + e^{i(\gamma+\alpha)} = 0$$

$$\therefore \cos 2\alpha + \cos 2\beta + \cos 2\gamma = 0 \text{ અને } \cos(\alpha + \beta) + \cos(\beta + \gamma) + \cos(\gamma + \alpha) = 0$$

(વાસ્તવિક ભાગ સરખાવતાં)

$$\therefore 1 - 2 \sin^2 \alpha + 1 - 2 \sin^2 \beta + 1 - 2 \sin^2 \gamma = 0$$

$$\therefore \sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma = \frac{3}{2} \text{ તથા } \Sigma \cos(\alpha + \beta) = 0$$

$$\therefore n = 2, \lambda = 0. \text{ આથી } (n, \lambda) = (2, 0)$$

જવાબ : (A)

$$(54) \text{ જો } \alpha = \cos\left(\frac{8\pi}{11}\right) + i \sin\left(\frac{8\pi}{11}\right), \text{ તો } \operatorname{Re}(\alpha + \alpha^2 + \alpha^3 + \alpha^4 + \alpha^5) = \dots$$

$$(A) \frac{1}{2}$$

$$(B) -\frac{1}{2}$$

$$(C) 0$$

$$(D) 1$$

$$\text{ઉકેલ : } \operatorname{Re}(\alpha + \alpha^2 + \alpha^3 + \alpha^4 + \alpha^5)$$

$$= \cos\left(\frac{8\pi}{11}\right) + \cos\left(\frac{16\pi}{11}\right) + \cos\left(\frac{24\pi}{11}\right) + \cos\left(\frac{32\pi}{11}\right) + \cos\left(\frac{40\pi}{11}\right)$$

$$= \cos\left(\frac{8\pi}{11}\right) + \cos\left(\frac{16\pi}{11}\right) + \cos\left(\frac{2\pi}{11}\right) + \cos\left(\frac{10\pi}{11}\right) + \cos\left(\frac{18\pi}{11}\right) \quad (1)$$

$$= \cos\left(\frac{14\pi}{11}\right) + \cos\left(\frac{6\pi}{11}\right) + \cos\left(\frac{20\pi}{11}\right) + \cos\left(\frac{12\pi}{11}\right) + \cos\left(\frac{4\pi}{11}\right) \quad (2)$$

(1) અને (2)નો સરવાળો કરતાં,

$$2 \operatorname{Re}(\alpha + \alpha^2 + \alpha^3 + \alpha^4 + \alpha^5) = \sum_{m=1}^{10} \cos\left(\frac{2m\pi}{11}\right)$$

$$\text{આપણે જાણીએ છીએ કે } \sum_{m=0}^{10} \cos\left(\frac{2m\pi}{11}\right) = 0 \quad (1 \text{ ના } 11 \text{ માં મૂળના વાસ્તવિક ભાગનો સરવાળો)}$$

$$\therefore \operatorname{Re}(\alpha + \alpha^2 + \alpha^3 + \alpha^4 + \alpha^5) = \frac{1}{2}(-1) = -\frac{1}{2}$$

જવાબ : (B)

$$(55) \text{ જો } f(z) = z^4 - 8z^3 + 4z^2 + 4z + 39 \text{ અને } f(3 + 2i) = a + ib, \text{ તો } a : b = \dots$$

$$(A) 1 : 8$$

$$(B) -1 : 8$$

$$(C) 1 : 4$$

$$(D) -1 : 4$$

$$\text{ઉકેલ : } \text{ધારો કે } z = 3 + 2i$$

$$\therefore (z - 3)^2 = 4i^2 \quad \text{આથી} \quad z^2 - 6z + 13 = 0 \quad (1)$$

હવે, $f(z)$ ને $z^2 - 6z + 13$ વડે ભાગતાં,

$$\therefore z^4 - 8z^3 + 4z^2 + 4z + 39 = (z^2 - 6z + 13)(z^2 - 2z + 21) - 96z + 312$$

$$\therefore f(3 + 2i) = 0(z^2 - 2z + 21) - 96(3 + 2i) + 312 = 24 - 192i = a + ib$$

$$\therefore a = 24, b = -192$$

$$\therefore \frac{a}{b} = -\frac{1}{8}$$

જવાબ : (B)

(56) જો સંકર સંખ્યા α ($\alpha \neq 1$) એ સમીકરણ $z^{p+q} - z^p - z^q + 1 = 0$, જ્યાં p, q ભિન્ન અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, નું બીજ હોય તો

(A) $1 + \alpha + \alpha^2 + \dots + \alpha^p = 0$

(B) $1 + \alpha + \alpha^2 + \dots + \alpha^q = 0$ અને $1 + \alpha + \alpha^2 + \dots + \alpha^{q-1} = 0$

(C) $1 + \alpha + \alpha^2 + \dots + \alpha^{p-1} = 0$ અને $1 + \alpha + \alpha^2 + \dots + \alpha^{q-1} = 0$

(D) વિકલ્પ (C)ના બંને સમીકરણ એક સાથે ન ઉદ્ભવે.

ઉકેલ : $z^{p+q} - z^p - z^q + 1 = 0$

$\therefore (z^p - 1)(z^q - 1) = 0$

α આપેલ સમીકરણનું બીજ હોવાથી,

$\alpha^p = 1$ અથવા $\alpha^q = 1$

$\therefore \alpha$ એ 1 નું p મૂળ છે અથવા α એ 1 નું q મૂળ છે તથા ($\alpha \neq 1$)

$\therefore 1 + \alpha + \alpha^2 + \dots + \alpha^{p-1} = 0$ અથવા $1 + \alpha + \alpha^2 + \dots + \alpha^{q-1} = 0$ (1 નાં બધાં જ n મૂળનો સરવાળો શૂન્ય થાય.)

ધારો કે α એ 1 નું p મૂળ છે અથવા α એ 1 નું q મૂળ પણ છે.

$\therefore \alpha = e^{\frac{2m\pi i}{p}} = e^{\frac{2n\pi i}{q}}$, જ્યાં $1 \leq m < p, 1 \leq n < q$

$\therefore$ કોઈક ધન પૂર્ણાંક m, n માટે $\frac{m}{p} = \frac{n}{q}$ જે શક્ય નથી. (p, q અવિભાજ્ય સંખ્યા છે.) જવાબ : (D)

(57) જો સંકર સંખ્યા z માટે $|z - 3 - 2i| \leq 2$, તો $|2z - 6 + 5i|$ નું મહત્તમ મૂલ્ય છે. (IIT : 2011)

(A) 11

(B) 12

(C) 13

(D) 14

ઉકેલ : $|2z - 6 + 5i| = 2 \left| z - 3 + \frac{5}{2}i \right|$

$= 2 \left| z - 3 - 2i + \frac{9}{2}i \right| \leq 2 \left(|z - 3 - 2i| + \frac{9}{2} \right) = 2 \left(2 + \frac{9}{2} \right) = 13$

જો $z = 3 + 4i$ હોય તો $|z - 3 - 2i| = 2$ હોય તથા $|2z - 6 + 5i| = 13$

$\therefore |2z - 6 + 5i|$ નું મહત્તમ મૂલ્ય 13 થશે જવાબ : (C)


બીજી રીત : $|z - 3 - 2i| \leq 2$ એ $(3, 2)$ કેન્દ્રવાળા તથા 2 ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળ પરનો તથા વર્તુળની અંદરનો પ્રદેશ દર્શાવે છે.

$|2z - 6 - 5i| = 2 \left| z - 3 + \frac{5}{2}i \right|$

$\therefore \left| z - 3 + \frac{5}{2}i \right|$ એ z થી બિંદુ $\left(3, \frac{-5}{2} \right)$ નું અંતર છે.

P મહત્તમ અંતર $PA = 2.5 + 4 = 6.5$

$\therefore$ માંગેલ મહત્તમ મૂલ્ય $= 2(6.5) = 13$



જવાબ : (C)

(58) z અને w એ શૂન્યેતર સંકર સંખ્યાઓ છે. જો $|zw| = 1$ અને $\arg z - \arg w = \frac{\pi}{2}$ તો $\bar{z}w = \dots\dots$

- (A) 1 (B) -1 (C) i (D) $-i$

ઉકેલ : $|zw| = 1$ અર્થાત્ $|z| |w| = 1$ અર્થાત્ $|w| = \frac{1}{|z|}$ (1)

ધારો કે $z = re^{i\theta}$ અર્થાત્ $\bar{z} = re^{-i\theta}$

$$\arg w = \arg z - \frac{\pi}{2} = \theta - \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore w = \frac{1}{r} e^{i(\theta - \frac{\pi}{2})} \quad (1) \text{ પરથી}$$

$$\therefore \bar{z}w = re^{-i\theta} \cdot \frac{1}{r} e^{i(\theta - \frac{\pi}{2})} = e^{-\frac{i\pi}{2}} = \cos \frac{\pi}{2} - i \sin \frac{\pi}{2} = -i \quad \text{જવાબ : (D)}$$

(59) z અને w એ સંકર સંખ્યાઓ છે. જો $\bar{z} + i\bar{w} = 0$ અને $\arg(zw) = \pi$ તો $\arg z = \dots\dots$

- (A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{2}$ (C) $\frac{-\pi}{4}$ (D) $\frac{5\pi}{4}$

ઉકેલ : ધારો કે $z = re^{i\theta}$

$\arg(zw) = \pi$. અર્થાત્ $\arg z + \arg w = \pi$. અર્થાત્ $\arg w = \pi - \theta$

$$\therefore w = r_1 e^{i(\pi - \theta)} \quad \text{જ્યાં } r_1 = |w|$$

$$\text{હવે, } \bar{z} + i\bar{w} = 0$$

$$\therefore re^{-i\theta} + ir_1 e^{i(\theta - \pi)} = 0$$

$$r(\cos \theta - i \sin \theta) + ir_1 [\cos(\pi - \theta) - i \sin(\pi - \theta)] = 0$$

$$\therefore r(\cos \theta - i \sin \theta) + r_1 [-i \cos \theta + \sin \theta] = 0$$

વાસ્તવિક ભાગ તથા કાલ્પનિક ભાગ સરખાવતાં,

$$r \cos \theta + r_1 \sin \theta = 0, -r \sin \theta - r_1 \cos \theta = 0$$

$$\therefore \frac{r}{r_1} = -\tan \theta = \frac{r_1}{r}. \quad \text{અર્થાત્ } r^2 = r_1^2 \quad \text{અર્થાત્ } r = r_1$$

$$\therefore \tan \theta = -1. \quad \text{અર્થાત્ } \arg z = \frac{-\pi}{4} \quad \text{જવાબ : (C)}$$

$$(60) \sum_{k=1}^6 \left(\sin\left(\frac{2k\pi}{7}\right) + i \cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right) \right) = \dots\dots$$

- (A) -1 (B) 0 (C) $-i$ (D) 1

$$\text{ઉકેલ : } z = \sum_{k=1}^6 \left(\sin\left(\frac{2k\pi}{7}\right) + i \cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right) \right) = i \sum_{k=1}^6 \left(\cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right) - i \sin\left(\frac{2k\pi}{7}\right) \right)$$

$$\text{ધારો કે } \theta = \frac{2\pi}{7}$$

$$\therefore z = i \sum_{k=1}^6 e^{-ik\theta}$$

$$= i [e^{-i\theta} + e^{-i2\theta} + \dots + e^{-i6\theta}]$$

$$= ie^{-i\theta} \left(\frac{e^{-i6\theta} - 1}{e^{-i\theta} - 1} \right) = ie^{-i\theta} \left(\frac{\cos 6\theta - i \sin 6\theta - 1}{\cos \theta - i \sin \theta - 1} \right) = ie^{-i\theta} \left(\frac{1 - \cos 6\theta + i \sin 6\theta}{1 - \cos \theta + i \sin \theta} \right)$$

$$= ie^{-i\theta} \frac{\sin 3\theta}{\sin \frac{\theta}{2}} \left(\frac{\sin 3\theta + i \cos 3\theta}{\sin \frac{\theta}{2} + i \cos \frac{\theta}{2}} \right)$$

$$= ie^{-i\theta} \frac{\sin 3\theta}{\sin \frac{\theta}{2}} \left(\frac{\cos 3\theta - i \sin 3\theta}{\cos \frac{\theta}{2} - i \sin \frac{\theta}{2}} \right)$$

$$= ie^{-i\theta} \frac{\sin 3\theta}{\sin \frac{\theta}{2}} e^{-3i\theta} e^{\frac{i\theta}{2}} = ie^{\frac{-7i\theta}{2}} \frac{\sin 3\theta}{\sin \frac{\theta}{2}}$$

$$= ie^{-i\pi} \frac{\sin \frac{6\pi}{7}}{\sin \frac{\pi}{7}}$$

$$\left(\theta = \frac{2\pi}{7} \right)$$

$$= i (\cos \pi - i \sin \pi) \frac{\sin \left(\pi - \frac{\pi}{7} \right)}{\sin \frac{\pi}{7}} = -i$$

જવાબ : (C)

(61) જો સંકર સંખ્યા z માટે $\arg \left(\frac{z-2}{z+2} \right) = \frac{\pi}{4}$ તો $|z-2i|$ ની કિંમત =

(A) $2\sqrt{2}$

(B) $3\sqrt{2}$

(C) $4\sqrt{2}$

(D) $5\sqrt{2}$

ઉકેલ : ધારો કે $z = x + iy$ અને $\arg (z-2) = \theta_1$ તથા $\arg (z+2) = \theta_2$

$$\arg \left(\frac{z-2}{z+2} \right) = \arg (z-2) - \arg (z+2) = \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore \theta_1 - \theta_2 = \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore \tan^{-1} \left(\frac{y}{x-2} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{y}{x+2} \right) = \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore \tan^{-1} \frac{\frac{y}{x-2} - \frac{y}{x+2}}{1 + \frac{y^2}{x^2-4}} = \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore \frac{y(x+2) - y(x-2)}{x^2 - 4 + y^2} = 1$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y = 4$$

$$\therefore (x-0)^2 + (y-2)^2 = 8$$

$$\therefore |x + i(y-2)|^2 = 8$$

$$\therefore |z-2i| = 2\sqrt{2}$$

જવાબ : (A)

$$(62) \sum_{p=1}^{32} (3p+2) \left(\sum_{q=1}^{10} \left(\sin \frac{2q\pi}{11} - i \cos \frac{2q\pi}{11} \right) \right)^p = \dots\dots$$

(A) $24(1+i)$

(B) $24(1-i)$

(C) $48(1+i)$

(D) $48(1-i)$

$$\begin{aligned}\text{ઉકેલ : } \sin \frac{2q\pi}{11} - i \cos \frac{2q\pi}{11} &= -i \left(\cos \frac{2q\pi}{11} + i \sin \frac{2q\pi}{11} \right) \\ &= -i e^{\frac{i2q\pi}{11}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \sum_{q=1}^{10} \left(\sin \frac{2q\pi}{11} - i \cos \frac{2q\pi}{11} \right) &= -i \sum_{q=1}^{10} e^{\frac{i2q\pi}{11}} \\ &= -i \left[e^{\frac{i2\pi}{11}} + e^{\frac{i4\pi}{11}} + \dots + e^{\frac{i20\pi}{11}} \right] = -i(-1) = i\end{aligned}$$

$$(z'' - 1 = 0 \text{ ની બીજી } \cos \frac{2k\pi}{11} + i \sin \frac{2k\pi}{11} \text{ (} i = 0, 1, 2, 3, \dots, 10) \text{ છે.}$$

$$\begin{aligned}\therefore \sum_{p=1}^{32} (3p+2) \left(\sum_{q=1}^{10} \left(\sin \frac{2q\pi}{11} - i \cos \frac{2q\pi}{11} \right) \right)^p \\ = \sum_{p=1}^{32} (3p+2) i^p = 3 \sum_{p=1}^{32} p i^p + 2 \sum_{p=1}^{32} i^p = 3 S_1 + 2 S_2\end{aligned}$$

$$\text{જ્યાં } S_1 = \sum_{p=1}^{32} p i^p, S_2 = \sum_{p=1}^{32} i^p$$

$$S_1 = i + 2i^2 + 3i^3 + \dots + 32i^{32}$$

$$i S_1 = i^2 + 2i^3 + 3i^4 + \dots + 32i^{33}$$

$$S_1 (1 - i) = i + i^2 + i^3 + \dots + i^{32} - 32 i^{33} = 8(i + i^2 + i^3 + i^4) - 32 i \cdot i^{32}$$

$$S_1 = \frac{-32i}{1-i} = 16(1-i) \quad [(1-i)^2 = -2i]$$

$$S_2 = 0 \quad (i + i^2 + \dots + i^{32} = 0, i^{33} = i)$$

$$\therefore \text{ માંગેલ કિંમત } = 3 \times 16(1-i) + 0 = 48(1-i)$$

જવાબ : (D)

એક કરતાં વધુ સાચા જવાબવાળા પ્રશ્નો

(63) જો z_1, z_2 બે શૂન્યેતર સંકર સંખ્યાઓ હોય છે, જ્યાં $|2z_1 - 3z_2|^2 = |2z_1|^2 + |3z_2|^2$, તો

$$(A) z_1 \bar{z}_2 + z_2 \bar{z}_1 = 0 \quad (B) \frac{z_2}{z_1} \text{ એ શુદ્ધ કાલ્પનિક સંખ્યા છે.}$$

$$(C) \frac{z_2}{z_1} \text{ એ વાસ્તવિક સંખ્યા હોય.} \quad (D) \arg \left(\frac{z_2}{z_1} \right) = \pm \frac{\pi}{2}$$

$$\text{ઉકેલ : } |2z_1 - 3z_2|^2 = |2z_1|^2 + |3z_2|^2$$

$$\therefore (2z_1 - 3z_2)(2\bar{z}_1 - 3\bar{z}_2) = |2z_1|^2 + |3z_2|^2$$

$$\therefore 4z_1 \bar{z}_1 - 6\bar{z}_1 z_2 - 6z_2 \bar{z}_1 + 9z_2 \bar{z}_2 = 4z_1 \bar{z}_1 + 9z_2 \bar{z}_2$$

$$\therefore \bar{z}_1 z_2 + z_1 \bar{z}_2 = 0$$

$$\therefore \bar{z}_1 z_2 = -z_1 \bar{z}_2$$

$$\therefore \frac{z_2}{z_1} = -\left(\overline{\frac{z_2}{z_1}}\right)$$

$$\therefore \frac{z_2}{z_1} \text{ એ શુદ્ધ કાલ્પનિક સંખ્યા છે.}$$

$$\therefore \arg\left(\frac{z_2}{z_1}\right) = \pm \frac{\pi}{2}$$

જવાબ : (A), (B), (D)

(64) જો $z_1, z_2, \dots, z_n$ એ વર્તુળ $|z| = r$ પર આવેલ હોય તથા $\operatorname{Re}\left(\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{z_j}{z_k}\right) = 0$ હોય તો

$$(A) \sum_{j=1}^n z_j = 0 \quad (B) \left|\sum_{j=1}^n z_j\right| = 0 \quad (C) \sum_{j=1}^n \bar{z}_j = 0 \quad (D) \sum_{j=1}^n z_j = n$$

ઉકેલ : $z_1, z_2, \dots, z_n$ એ $|z| = r$ પર આવેલ હોવાથી $z_i = r(\cos \theta_i + i \sin \theta_i)$

$$\text{હવે } \operatorname{Re}\left(\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{z_j}{z_k}\right) = 0$$

$$\therefore \operatorname{Re}\left[\left(z_1 + z_2 + \dots + z_n\right)\left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \dots + \frac{1}{z_n}\right)\right] = 0$$

$$\therefore \operatorname{Re}\left[\{(\cos \theta_1 + \dots + \cos \theta_n) + i(\sin \theta_1 + \dots + \sin \theta_n)\} \{(\cos \theta_1 + \dots + \cos \theta_n) - i(\sin \theta_1 + \dots + \sin \theta_n)\}\right] = 0$$

$$\therefore (\cos \theta_1 + \dots + \cos \theta_n)^2 + (\sin \theta_1 + \dots + \sin \theta_n)^2 = 0$$

$$\therefore \cos \theta_1 + \dots + \cos \theta_n = 0 = \sin \theta_1 + \dots + \sin \theta_n \quad \text{જવાબ : (A), (B),}$$

(C)

(65) $P(x)$ અને $Q(x)$ એ બહુપદી છે. ધારો કે $x^2 + x + 1$ એ $f(x) = P(x^3) + xQ(x^3)$ નો અવયવ છે, તો

(A) $(x-1)$ એ $P(x)$ નો અવયવ હોય પરંતુ $Q(x)$ નો અવયવ ન હોય.

(B) $(x-1)$ એ $Q(x)$ નો અવયવ હોય પરંતુ $P(x)$ નો અવયવ ન હોય.

(C) $(x-1)$ એ $P(x)$ તથા $Q(x)$ બંનેનો અવયવ હોય.

(D) $(x-1)$ એ $f(x)$ નો અવયવ હોય.

ઉકેલ : $f(x) = P(x^3) + xQ(x^3)$ (1)

$1 + x + x^2$ ના અવયવ પણ સમીકરણ (1) ની બંને બાજુ અવયવ થશે.

$$1 + x + x^2 \text{ ની બીજ } \omega, \omega^2 \text{ છે. જ્યાં } \omega = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}, \quad \omega^2 = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$$

$$f(\omega) = 0$$

$$\therefore P(\omega^3) + \omega Q(\omega^3) = 0$$

$$\therefore P(1) + \omega Q(1) = 0 \quad (2)$$

$$\text{વળી, } f(\omega^2) = 0$$

$$\therefore P(\omega^6) + \omega^2 Q(\omega^6) = 0$$

$$\therefore P(1) + \omega^2 Q(1) = 0 \quad (3)$$

(2) અને (3) પરથી,

$$P(1) = 0 \text{ અને } Q(1) = 0$$

$\therefore (x-1)$ એ $P(x)$ અને $Q(x)$ ની અવયવ થશે.

$$\therefore f(1) = P(1) + Q(1) = 0$$

$$\therefore f(1) = 0$$

$\therefore (x-1)$ એ $f(x)$ નો અવયવ હોય.

જવાબ : (C), (D)

જોડકાં જોડવાના પ્રશ્નો

$$(66) \quad \text{ધારો કે } z_k = \cos\left(\frac{2k\pi}{10}\right) + i \sin\left(\frac{2k\pi}{10}\right), k = 1, 2, \dots, 9$$

(P) દરેક z_k માટે z_j એવો મળે કે $z_k z_j = 1$ થાય.	(1) સત્ય છે.
(Q) $k \in \{1, 2, \dots, 9\}$ એવો મળે કે $z_1 \cdot z = z_k$ ને સંકર સંખ્યા ગણમાં કોઈ ઉકેલ નથી.	(2) મિથ્યા છે.
(R) $\frac{ 1-z_1 1-z_2 \dots 1-z_9 }{10}$	(3) 1
(S) $1 - \sum_{k=1}^9 \cos\left(\frac{2k\pi}{10}\right)$	(4) 2

$$(A) (P) \rightarrow (1), (Q) \rightarrow (2), (R) \rightarrow (4), (S) \rightarrow (3)$$

$$(B) (P) \rightarrow (2), (Q) \rightarrow (1), (R) \rightarrow (3), (S) \rightarrow (4)$$

$$(C) (P) \rightarrow (1), (Q) \rightarrow (2), (R) \rightarrow (3), (S) \rightarrow (4)$$

$$(D) (P) \rightarrow (2), (Q) \rightarrow (1), (R) \rightarrow (4), (S) \rightarrow (3)$$

ઉકેલ : (P) z_k એ 1 નું 10 મૂળ છે.

$\therefore \bar{z}_k$ એ પણ 1 નું 10 મૂળ થશે.

જો $z_j = \bar{z}_k$ હોય તો વિધાન (P) સત્ય થશે. (P) $\rightarrow$ (1)

(Q) $z_1 \neq 0$. જો આપણે $z = \frac{z_k}{z_1}$ હોય તો વિધાન (Q) મિથ્યા થશે. (Q) $\rightarrow$ (2)

$$(R) \quad z^{10} - 1 = (z - 1)(z - z_1) \dots (z - z_9)$$

$$\therefore \frac{z^{10} - 1}{z - 1} = (z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_9) = 1 + z + z^2 + \dots + z^9$$

$$(1 - z_1)(1 - z_2) \dots (1 - z_9) = 10$$

$$\therefore \frac{|1-z_1| |1-z_2| \dots |1-z_9|}{10} = 1 \quad (R) \rightarrow (3)$$

(S) માટે હવે જરૂર નથી. પરંતુ આપણે સમજી લઈએ.

$$1 + z_1 + z_2 + \dots + z_9 = 0$$

$$\therefore \operatorname{Re}(1) + \operatorname{Re}(z_1) + \dots + \operatorname{Re}(z_9) = 0$$

$$\therefore \operatorname{Re}(z_1) + \dots + \operatorname{Re}(z_9) = -1$$

$$\therefore 1 - \sum_{k=1}^9 \cos\left(\frac{2k\pi}{10}\right) = 2$$

જવાબ : (C)

નોંધ : જવાબ માટે $P \rightarrow (1)$, $(R) \rightarrow (3)$ પૂરતું છે.

(67)	(P) $\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^n$ એ શુદ્ધ કાલ્પનિક સંખ્યા હોય તથા તેનો કાલ્પનિક ભાગ ધન સંખ્યા હોય તેવી n ની ન્યૂનતમ કિંમત	(i) 2
	(Q) $\left(\sum_{m=1}^{2n+1} i^{2m}\right)$	(ii) -1
	(R) ΔABC માટે $1 + e^{iA} \cdot e^{iB} \cdot e^{iC} =$	(iii) 3
	(S) $z \in \mathbb{C}$ અને $\arg(z) = \theta$	(iv) 0
	$\left \frac{z}{ z } - 1\right $ નું મહત્તમ મૂલ્ય	

	(P)	(Q)	(R)	(S)
(A)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(B)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)
(C)	(iii)	(ii)	(iv)	(i)
(D)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)

ઉકેલ : (P) $\frac{1-i}{1+i} = -i$

$$\therefore \left(\frac{1-i}{1+i}\right)^n = (-i)^n \quad n = 1, 3, 5, \dots \text{ શુદ્ધ કાલ્પનિક સંખ્યા મળે.}$$

$$n = 3 \text{ માટે } \left(\frac{1-i}{1+i}\right)^n \text{ નો શુદ્ધ કાલ્પનિક ભાગ ધન સંખ્યા મળે. આથી } (P) \rightarrow (iii)$$

(અહીં (P) $\rightarrow (iii)$ વાળો એક જ વિકલ્પ (C) હોવાથી જવાબ (C) નક્કી થઈ જાય.)

$$(Q) \left(\sum_{m=1}^{2n+1} i^{2m}\right)$$

$$= \{(-1) + (-1)^2 + (-1)^3 + \dots + (-1)^{2n+1}\} = (-1)$$

(Q) $\rightarrow (ii)$

$$(R) \quad 1 + e^{iA} e^{iB} e^{iC}$$

$$= 1 + \cos(A+B+C) + i \sin(A+B+C)$$

$$= 1 + \cos \pi + i \sin \pi = 0$$

(R) $\rightarrow (iv)$

$$(S) \quad \text{ધારો કે } z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$\frac{z}{|z|} = (\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$\begin{aligned}
\therefore \left| \frac{z}{|z|} - 1 \right| &= |(\cos \theta - 1 + i \sin \theta)| \\
&= \left| -2\sin^2 \frac{\theta}{2} + 2i \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} \right| \\
&= 2 \left| \sin \frac{\theta}{2} \right|
\end{aligned}$$

$$\therefore \left| \frac{z}{|z|} - 1 \right| \text{ નું મહત્તમ મૂલ્ય 2 થાય.}$$

$$(S) \rightarrow (i)$$

$$\text{જવાબ : (C)}$$

(68)	(P) જો $\left z + \frac{1}{z} \right = 2$ તો $\frac{ z }{\tan \frac{\pi}{8}}$ ની ક્રિમત ન્યૂનતમ	
	હોય તેવી n ની ન્યૂનતમ ક્રિમત	(i) 0
	(Q) જો $ z = 1$ અને $z^{2n} + 1 \neq 0$ તો	(ii) 3
	$\frac{z^n}{z^{2n} + 1} - \frac{z^{-n}}{\left(\frac{1}{z}\right)^{2n} + 1} = \dots\dots$	(iii) 11
	(R) જો $8iz^3 + 12z^2 - 18z + 27i = 0$ તો $2 z = \dots\dots$	(iv) 1
	(S) જો z_1, z_2, z_3, z_4 એ સમીકરણ $z^4 + z^3 + z^2 + z + 1 = 0$ ની બીજ હોય તો $\prod_{i=1}^{i=4} (z_i + 2) = \dots\dots$	

	(P)	(Q)	(R)	(S)
(A)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(B)	(ii)	(ii)	(iv)	(iii)
(C)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(D)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)

$$\text{ઉકેલ : (P) } \left| |z| - \frac{1}{|z|} \right| \leq \left| z + \frac{1}{z} \right| = 2$$

$$\therefore -2 \leq |z| - \frac{1}{|z|} \leq 2$$

$$\therefore |z|^2 + 2|z| - 1 \geq 0 \text{ અને } |z|^2 - 2|z| - 1 \leq 0$$

$$\therefore (|z| + 1)^2 \geq 2, (|z| - 1)^2 \leq 2 \quad (-\sqrt{2} \leq |z| - 1 \leq \sqrt{2})$$

$$|z| \geq \sqrt{2} - 1, |z| \leq \sqrt{2} + 1$$

$$\therefore |z| \text{ ની ન્યૂનતમ ક્રિમત } \sqrt{2} - 1 \text{ થાય.}$$

$$\therefore \frac{|z|}{\tan \frac{\pi}{8}} \text{ ની ન્યૂનતમ ક્રિમત } \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}-1} = 1$$

$$(P) \rightarrow (iv)$$

(Q) ધારો કે $z = \cos \theta + i \sin \theta$

$$\begin{aligned} \frac{z^n}{z^{2n} + 1} - \frac{z^{-n}}{\left(\frac{1}{z}\right)^{2n} + 1} &= \frac{\cos n\theta + i \sin n\theta}{1 + \cos 2n\theta + i \sin 2n\theta} - \frac{\cos n\theta - i \sin n\theta}{1 + \cos 2n\theta - i \sin 2n\theta} \\ &= \frac{\cos n\theta + i \sin n\theta}{2 \cos n\theta (\cos n\theta + i \sin n\theta)} - \frac{\cos n\theta - i \sin n\theta}{2 \cos n\theta (\cos n\theta - i \sin n\theta)} \\ &= \frac{1}{2 \cos n\theta} - \frac{1}{2 \cos n\theta} = 0 \end{aligned} \quad (Q) \rightarrow (i)$$

(R) $8iz^3 + 12z^2 - 18z + 27i = 0$

$\therefore (2iz + 3)(4z^2 + 9i) = 0$

$\therefore z = \frac{3}{2}i, z^2 = \frac{-9}{4}i$

$\therefore 2|z| = 3$

(R) $\rightarrow$ (ii)

(S) $z^4 + z^3 + z^2 + z + 1$

$= (z - z_1)(z - z_2)(z - z_3)(z - z_4)$

$z = -2$ લેતાં,

$$\prod_{i=1}^4 (z_i + 2) = (-2)^4 + (-2)^3 + (-2)^2 + (-2) + 1 = 11$$

(S) $\rightarrow$ (iii)

જવાબ : (D)

નોંધ : સૌ પ્રથમ R અને S ગણવા સરળ છે. (R) $\rightarrow$ (ii), (S) $\rightarrow$ (iii) પરથી જવાબ (D) મળી જાય.

(69)

(P)	ત્રિઘાત સમીકરણ $(z + \alpha\beta)^3 = \alpha^3, (\alpha \neq 0)$ નાં બીજથી બનતા ત્રિકોણાનું ક્ષેત્રફળ	(i) $ \tan \alpha $
(Q)	વર્તુળ $\left \frac{z-\alpha}{z-\bar{\alpha}} \right = 2, \alpha \in \mathbb{C}$ ની ત્રિજ્યા	(ii) $\frac{3\sqrt{3}}{4} \alpha ^2$
(R)	જો $\arg z = \alpha$ અને $ z - 1 = 1$ તો $\left \frac{z-2}{z} \right = \dots\dots$	(iii) $\frac{2}{3} \alpha - \bar{\alpha} $
(S)	$z^2 + pz + q = 0$ નાં બીજ z_1 તથા z_2 ને આર્ગન્ટ આકૃતિમાં $A(z_1), B(z_2)$ વડે દર્શાવ્યા છે. જો $m\angle AOB = \alpha \neq 0$ તથા $OA = OB$ હોય તો $\frac{p^2}{q} = \dots\dots$	(iv) $4 \cos^2 \frac{\alpha}{2}$

	(P)	(Q)	(R)	(S)
(A)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(B)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(C)	(ii)	(iii)	(i)	(iv)
(D)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)

ઉકેલ : (P) $(z + \alpha\beta)^3 = \alpha^3 \Rightarrow z + \alpha\beta = \alpha, \omega\alpha, \omega^2\alpha$ જ્યાં $\omega = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$

આથી $z = \alpha - \alpha\beta, \omega\alpha - \alpha\beta, \omega^2\alpha - \alpha\beta$

ધારો કે $z_1 = \alpha - \alpha\beta, z_2 = \omega\alpha - \alpha\beta, z_3 = \omega^2\alpha - \alpha\beta$

હવે, $|z_1 - z_2| = |z_2 - z_3| = |z_3 - z_1| = \sqrt{3} |\alpha|$

$\therefore z_1, z_2, z_3$ એ સમબાજુ ત્રિકોણનાં શિરોબિંદુઓ છે.

$$\text{તેનું ક્ષેત્રફળ} = \frac{\sqrt{3}}{4} |z_1 - z_2|^2 = \frac{3\sqrt{3}}{4} |\alpha|^2 \quad (P) \rightarrow (ii)$$

$$(Q) |z - \alpha|^2 = 4|z - \bar{\alpha}|^2$$

$$\therefore (z - \alpha)(\bar{z} - \bar{\alpha}) = 4(z - \bar{\alpha})(\bar{z} - \alpha)$$

$$\therefore z\bar{z} - \alpha\bar{z} - \bar{\alpha}z + \alpha\bar{\alpha} = 4(z\bar{z} - \alpha\bar{z} - \bar{\alpha}z + \alpha\bar{\alpha})$$

$$\therefore 3z\bar{z} + (\alpha - 4\bar{\alpha})\bar{z} + (\bar{\alpha} - 4\alpha)z + 3\alpha\bar{\alpha} = 0$$

$$\therefore z\bar{z} + \frac{\alpha - 4\bar{\alpha}}{3}\bar{z} + \frac{\bar{\alpha} - 4\alpha}{3}z + \alpha\bar{\alpha} = 0 \quad (1)$$

આપણે જાણીએ છીએ કે જેનું કેન્દ્ર a તથા ત્રિજ્યા $\sqrt{|a|^2 - b}$ તેવા વર્તુળનું સામાન્ય સમીકરણ

$$z\bar{z} - a\bar{z} - \bar{a}z + b = 0 \quad (a \in \mathbb{C}, b \in \mathbb{R}) \text{ છે.}$$

વર્તુળ (1) ની ત્રિજ્યા

$$\sqrt{\left|\frac{\alpha - 4\bar{\alpha}}{3}\right|^2 - \alpha\bar{\alpha}} = \sqrt{-\frac{4}{9}(\alpha - \bar{\alpha})^2} = \frac{2}{3} |\alpha - \bar{\alpha}| \quad (Q) \rightarrow (iii)$$


(R) બિંદુ $P(z)$ એ $(1, 0)$ કેન્દ્રવાળા તથા 1 ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળ પર આવેલ છે.

$$m\angle OPA = \pm \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \frac{2 - z}{0 - z} = \left| \frac{2 - z}{z} \right| e^{\pm \frac{i\pi}{2}}$$

$$\therefore \frac{z - 2}{z} = \frac{AP}{OP} (\pm i) = \pm i \tan \alpha$$

$$\therefore \left| \frac{z - 2}{z} \right| = |\tan \alpha|$$




(R) $\rightarrow$ (i) આકૃતિ 2.9

(S) આપણે જાણીએ છીએ કે $A(z_1), B(z_2), C(z_3)$ શિરોબિંદુવાળા ત્રિકોણમાં જો $m\angle BAC = \alpha$ હોય, તો

$$\frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1} = \frac{AC}{AB} (\cos \alpha + i \sin \alpha)$$

$$\text{અહીં } z_1 + z_2 = -p \quad \text{અને } z_1 z_2 = q$$

$$\text{વળી, } \frac{z_2}{z_1} = \frac{OA}{OB} (\cos \alpha + i \sin \alpha) = \cos \alpha + i \sin \alpha$$



આકૃતિ 2.10

$$\therefore \frac{z_2 - z_1 \cos \alpha}{z_1} = i \sin \alpha. \quad \text{અર્થાત્ } z_2^2 - 2z_1 z_2 \cos \alpha + z_1^2 \cos^2 \alpha = -z_1^2 \sin^2 \alpha$$

$$\therefore z_1^2 + z_2^2 = 2z_1 z_2 \cos \alpha$$

$$\therefore (z_1 + z_2)^2 = 2z_1 z_2 (1 + \cos \alpha)$$

$$\therefore \frac{P^2}{q} = 4 \cos^2 \frac{\alpha}{2} \quad (S) \rightarrow (iv)$$

નોંધ : $\mathbb{R}$ ની વિકલ્પ બધે જ જુદા છે. તે ગણતરી $\mathbb{R} \rightarrow (i)$ મળે છે.

જવાબ : (C)

(70) સંકર સંખ્યા z માટે $4 \arg(z - 5i) = 2 \arg(z + 3) = \cos^{-1}(-1)$ ની

(A) $\bar{z} = 2i + 3$

(B) z એ $x + y + 1 = 0$ પર છે.

(C) $|z|$ એ $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 8 = 0$ ની ત્રિજ્યા છે.

(D) $z + \bar{z} < 0$

ઉકેલ : $4 \arg(z - 5i) = 2 \arg(z + 3) = \cos^{-1}(-1) = \pi$

$$\therefore \tan^{-1} \left(\frac{y-5}{x} \right) = \frac{\pi}{4}, \quad \tan^{-1} \left(\frac{y}{x+3} \right) = \frac{\pi}{2} \quad (z = x + iy)$$

$$\therefore y - 5 = x, \quad x + 3 = 0 \quad \text{પરથી } x = -3, y = 2$$

$$\therefore z = -3 + 2i \quad \text{અર્થાત્ } \bar{z} = -3 - 2i$$

બિંદુ $(-3, 2)$ એ $x + y + 1 = 0$ પર આવેલ છે.

$$\therefore z \text{ એ } x + y + 1 = 0 \text{ પર આવેલ છે.} \quad (B)$$

$$\text{વર્તુળ } x^2 + y^2 + 2x - 4y - 8 = 0 \text{ ની ત્રિજ્યા } \sqrt{1+4+8} = \sqrt{13} = |z|$$

$$\therefore |z| \text{ એ વર્તુળ } x^2 + y^2 + 2x - 4y - 8 = 0 \text{ ની ત્રિજ્યા છે.} \quad (C)$$

$$\text{વળી, } z + \bar{z} = -6 < 0 \quad (D)$$

જવાબ : (B), (C), (D)

(71) જો $f(x) = ax^2 + bx$ જ્યાં $f(1) = 2, f(i^2) = 0$ અને $f(z + z^{-1}) = 0$ ને $|z| = \dots$

(A) 0

(B) $\frac{1}{2}$

(C) 2

(D) 1

ઉકેલ : $f(x) = ax^2 + bx$

$$f(1) = 2. \quad \text{અર્થાત્ } a + b = 2 \quad (1)$$

$$f(i^2) = f(-1) = 0. \quad \text{અર્થાત્ } a - b = 0 \quad (2)$$

$$(1) \text{ અને } (2) \text{ પરથી, } a = 1, b = 1$$

$$\therefore f(x) = x^2 + x$$

$$f(z + z^{-1}) = 0. \quad \text{અર્થાત્ } \left(z + \frac{1}{z}\right)^2 + \left(z + \frac{1}{z}\right) = 0$$

$$\therefore z^4 + z^3 + 2z^2 + z + 1 = 0$$

$$\therefore (z^2 + 1)(z^2 + z + 1) = 0$$

$$\therefore z = \pm i, \omega, \omega^2$$

$$\therefore |z| = 1$$

જવાબ : (D)

(72) નીચેના ડાબી બાજુના સમીકરણને જમણી બાજુ દર્શાવતા વક્ર સાથે જોડો.

(P)	$ z - 3 + z - i = 1$	(i) વર્તુળ
(Q)	$\left \frac{2z-3}{z-i} \right = 2$	(ii) અતિવલય
(R)	$z^2 + \bar{z}^2 = 5$	(iii) રેખા
(S)	$\left \frac{z-6}{z-2i} \right = 3$	(iv) ઉપવલય
		(v) પરવલય

	(P)	(Q)	(R)	(S)
(A)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(B)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)
(C)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)
(D)	(i)	(iv)	(ii)	(iii)

ઉકેલ : આપણે જાણીએ છીએ કે $|z - z_1| + |z - z_2| = \lambda$ એ z_1, z_2 નાભિવાળા તથા પ્રધાન અક્ષની લંબાઈ λ હોય તેવા ઉપવલયનું સમીકરણ છે. ($\lambda > |z_1 - z_2|$)

$\therefore$ સમીકરણ $|z - 3| + |z - i| = 10$ એ ઉપવલય છે. $\lambda = 10 > |z_1 - z_2| = \sqrt{10}$ (P) $\rightarrow$ (iv)

$$(Q) \quad \left| \frac{2z-3}{z-i} \right| = 2. \quad \text{આથી} \quad \left| \frac{z-\frac{3}{2}}{z-i} \right| = 1 \quad \Rightarrow \quad \left| z - \frac{3}{2} \right| = |z - i|$$

$\therefore z$ એ $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$ અને $(0, 1)$ ને જોડતા લંબદ્વિબાજક પર આવેલ છે. (Q) $\rightarrow$ (iii)

(R) ધારો કે $z = x + iy$

$$\therefore z^2 + \bar{z}^2 = 5. \quad \text{આથી} \quad (x + iy)^2 + (x - iy)^2 = 5$$

$$\text{આથી} \quad x^2 - y^2 + x^2 - y^2 = 5$$

$$\text{આથી} \quad x^2 - y^2 = \frac{5}{2} \text{ અતિવલય દર્શાવે છે.} \quad (R) \rightarrow (ii)$$

$$(S) \quad \left| \frac{z-6}{z-2i} \right| = 3 \text{ એ વર્તુળનું સમીકરણ છે.} \quad (S) \rightarrow (i)$$

નોંધ : (S) $\rightarrow$ (i), (R) $\rightarrow$ (ii) ગણવા સરળ છે. તરત જ જવાબ (A) મળે.

જવાબ : (A)

(73) (P) વર્તુળ $ z - 2 ^2 + z - 4i ^2 = 20$ નું કેન્દ્ર	(i) $1 - i$
(Q) વર્તુળ $\left \frac{z-1}{z+1} \right = \frac{1}{2}$ નું કેન્દ્ર	(ii) $\frac{5}{3} + 0i$
(R) વર્તુળ $z\bar{z} - (1+i)z - (1+i)\bar{z} + 7 = 0$ નું કેન્દ્ર	(iii) $-4 - i$
(S) વર્તુળ $\arg \left(\frac{z+3+4i}{z+5-2i} \right) = \frac{\pi}{2}$ નું કેન્દ્ર	(iv) $1 + 2i$

	(P)	(Q)	(R)	(S)
(A)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(B)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)
(C)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)
(D)	(i)	(iv)	(ii)	(iii)

ઉકેલ : આપણે જાણીએ છીએ કે જો $k > \frac{1}{2} |z_1 - z_2|^2$ હોય તો z_1 અને z_2 વ્યાસાંત બિંદુવાળા વર્તુળનું સમીકરણ $|z - z_1|^2 + |z - z_2|^2 = k$ હોય.

$$\therefore |z - 2|^2 + |z - 4i|^2 = 20 \text{ વર્તુળનું કેન્દ્ર } \frac{2+4i}{2} = 1 + 2i \text{ છે. (P) } \rightarrow \text{(iv)}$$

$$(Q) \quad 4|z - 1|^2 = |z + 1|^2$$

$$\therefore 4(z\bar{z} - z - \bar{z} + 1) = z\bar{z} + z + \bar{z} + 1$$

$$\therefore 3z\bar{z} - 5z - 5\bar{z} + 3 = 0$$

$$\therefore z\bar{z} - \frac{5}{3}z - \frac{5}{3}\bar{z} + 1 = 0$$

આપણે જાણીએ છીએ કે વર્તુળ $z\bar{z} + \bar{a}z + a\bar{z} + b = 0$ નું કેન્દ્ર $-a$ છે.

$$\therefore \text{આપેલ વર્તુળનું } \frac{5}{3} + 0i \text{ કેન્દ્ર છે. (Q) } \rightarrow \text{(ii)}$$

$$(R) \quad \text{વર્તુળ } z\bar{z} - (1+i)z - (1-i)\bar{z} + 7 = 0 \text{ નું કેન્દ્ર } 1 - i \text{ છે. (R) } \rightarrow \text{(i)}$$

$$(S) \quad \text{આપણે જાણીએ છીએ કે } \arg \left(\frac{z - z_1}{z - z_2} \right) = \frac{\pi}{2} \text{ એ } z_1 \text{ તથા } z_2 \text{ વ્યાસાંત બિંદુવાળા વર્તુળનું સમીકરણ છે.}$$

$$\therefore \text{આપેલ વર્તુળનું કેન્દ્ર } \frac{-3-4i+(-5+2i)}{2} = -4 - i \text{ છે. (S) } \rightarrow \text{(iii)}$$

જવાબ : (B)

નોંધ : (S) $\rightarrow$ (iii) મળે. આ માત્ર વિકલ્પ (B) માં શક્ય છે.

નિષ્કર્ષ-કારક પ્રશ્નો

$$(74) \quad \text{સંકર સંખ્યા માટે } \arg \left(\frac{z-1}{z-2} \right) = \frac{\pi}{4}$$

વિધાન 1 : z નો બિંદુગણ વર્તુળ છે.

વિધાન 2 : સમતલમાં નિશ્ચિત બિંદુથી નિશ્ચિત અંતરે આપેલ તમામ બિંદુઓનો ગણ એ વર્તુળ રચે છે.

$$\text{ઉકેલ : } \arg \left(\frac{z-1}{z-2} \right) = \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore \arg \left(\frac{(x-1)+iy}{(x-2)+iy} \right) = \frac{\pi}{4} \quad (z = x + iy)$$

$$\therefore \tan^{-1} \left(\frac{y}{x-1} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{y}{x-2} \right) = \frac{\pi}{4} \quad \left(\arg \left(\frac{z_1}{z_2} \right) = \arg z_1 - \arg z_2 \right)$$

$$\therefore \tan^{-1} \left\{ \frac{\frac{y}{x-1} - \frac{y}{x-2}}{\frac{(x-1)(x-2)+y^2}{(x-1)(y-2)}} \right\} = \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore \frac{y(x-2)-y(x-1)}{(x-1)(x-2)+y^2} = 1$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 3x + y + 2 = 0 \text{ વર્તુળ દર્શાવે છે.}$$

વિધાન 2 સત્ય છે પરંતુ વિધાન 1 ની પર્યાપ્ત સમજૂતી નથી.

જવાબ : (B)

(75) જો $|z| = 1$ અને $z \neq \pm 1$, તો $\arg(z) - \arg(z+1) - \arg(z-1)$ ની શક્ય કિંમત થાય.

(A) $-\frac{\pi}{6}$

(B) $\frac{\pi}{3}$

(C) $-\frac{\pi}{2}$

(D) $\frac{\pi}{4}$

ઉકેલ : $\arg(z) - \arg(z+1) - \arg(z-1) = \arg\left(\frac{z}{z^2-1}\right)$

$$= \arg\left(\frac{z}{z^2 - z\bar{z}}\right)$$

$$(\because |z| = 1, z\bar{z} = |z|^2)$$

$$= \arg\left(\frac{1}{z-\bar{z}}\right)$$

$$= \arg\left(\frac{1}{2iy}\right) \quad (z = x + iy)$$

$$= \arg(\text{શુદ્ધ કાલ્પનિક સંખ્યા})$$

$$\therefore \text{વિકલ્પ (C) શક્ય છે.}$$

જવાબ : (C)

(76) સંકર સંખ્યા c માટે $|c| = 1$. જો સમીકરણ $cz^2 + z + 1 = 0$ ને ફક્ત શુદ્ધ કાલ્પનિક સંખ્યા બીજ હોય, તો $\tan(\arg c)$

(A) $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

(B) $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

(C) $\sqrt{\frac{\sqrt{5}+1}{2}}$

(D) $\sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{3-\sqrt{5}}}$

ઉકેલ : ધારો કે આપેલ સમીકરણનું બીજ $z = iy$ છે. ધારો કે $c = \cos \alpha + i \sin \alpha$

$$\therefore cz^2 + z + 1 = 0$$

$$\therefore -(\cos \alpha + i \sin \alpha)y^2 + iy + 1 = 0$$

$$\therefore (\cos \alpha \cdot y^2 - 1) + (\sin \alpha \cdot y^2 - y)i = 0$$

$$\therefore y^2 \cos \alpha = 1, y \sin \alpha = 1, \quad (y \neq 0)$$

$$\therefore y^2 \cos \alpha - y^2 \sin^2 \alpha = 0 \Rightarrow y^2 (\sin^2 \alpha - \cos \alpha) = 0$$

$$\therefore 1 - \cos^2 \alpha - \cos \alpha = 0$$

$$\therefore \cos^2 \alpha + \cos \alpha - 1 = 0$$

$$\therefore \cos \alpha = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$\therefore \cos \alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

$$\left(\cos \alpha \neq \frac{-\sqrt{5}-1}{2} \right)$$

$$\therefore \sec^2 \alpha = \frac{4}{6-2\sqrt{5}} = \frac{2}{3-\sqrt{5}}$$

$$\therefore \tan^2 \alpha = \frac{2}{3-\sqrt{5}} - 1 = \frac{\sqrt{5}-1}{3-\sqrt{5}}$$

$$\therefore \tan \alpha = \sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{3-\sqrt{5}}} = \sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{3-\sqrt{5}} \times \frac{3+\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}}} = \sqrt{\frac{2\sqrt{5}+2}{4}} = \sqrt{\frac{\sqrt{5}+1}{2}}$$

જવાબ : (C), (D)

●